

## Clemastina



**Mecanismo de acción:** Antihistamínico, impermeabilizante capilar, antiexudativo.

**Indicaciones terapéuticas:** Alergias respiratorias: rinitis, poliposis, rinoconjuntivitis, rinosinusitis.

### **Modo de administración:**

#### **Vía oral (por boca):**

Tome la dosis de clemastina según las indicaciones del médico o las instrucciones del producto específico.

Las tabletas se deben tragar enteras con agua. No las rompa ni las mastique a menos que se indique lo contrario.

El jarabe se puede medir con una cuchara dosificadora que se proporciona con el producto. Siga las instrucciones precisas de dosificación y agite bien el frasco antes de usarlo.

#### **Dosis:**

**Para adultos y adolescentes:** Dosis típica: 1 mg a 2 mg dos veces al día.

**Para niños:** La dosis en niños debe ser determinada por el médico, ya que varía según la edad y el peso del niño. El médico determinará la dosis adecuada según la indicación médica específica.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad, discrasia sanguínea, prematuros y recién nacidos, embarazo y lactancia.

**Advertencias y precauciones:** Riesgo de somnolencia. No recomendado con úlcera péptica, obstrucción piloroduodenal, enf. cardiovascular, HTA grave, hipertiroidismo, glaucoma.

**Interacciones:** Aumenta acción de: alcohol, barbitúricos, sedantes.  
Aumenta la toxicidad de: anticolinérgicos, antidepresivos.

**Lactancia:** evitar.

**Afecta la capacidad de conducir.**