

Dipirona



Mecanismo de acción: Pirazolona analgésica no ácida, no narcótica, con efectos analgésicos, antipiréticos y espasmolíticos.

Indicaciones terapéuticas: Dolor (posoperatorio o postraumático, tipo cólico o de origen tumoral) y fiebre graves y resistentes.

Dosis:

Dolor leve a moderado, incluyendo dolores de cabeza, dolores musculares y dolores menstruales: La dosis oral típica de dipirona es de 500-1000 mg cada 4-6 horas según sea necesario.

La dosis máxima diaria recomendada es de 4000 mg.

Fiebre: La dosis oral típica de dipirona para la reducción de la fiebre es de 500-1000 mg cada 4-6 horas según sea necesario.

La dosis máxima diaria recomendada es de 4000 mg.

Modo de administración: Las gotas orales en solución se administran con un poco de agua.

Contraindicaciones: hipersensibilidad o agranulocitosis previa a pirazolonas; función de la médula ósea deteriorada o trastornos sistema hematopoyético; broncoespasmo o reacciones anafilácticas (p. ej. urticaria, rinitis, angioedema) por analgésicos; porfiria aguda intermitente; deficiencia congénita de G6PDH; niños < 3 meses o peso < 5 kg; 3^{er} trimestre de embarazo y lactancia.

Advertencias y precauciones: Induce agranulocitosis de origen inmune alérgico raramente grave e incluso mortal. En caso de agranulocitosis o neutropenia

interrumpir y controlar y monitorizar el recuento hematológico. Mayor riesgo de reacciones anafilácticas: pacientes con asma bronquial, especialmente con rinosinusitis poliposa; urticaria crónica; intolerancia al alcohol y a colorantes y/o conservantes. Riesgo de hipotensión en pacientes con: hipotensión preexistente (< 100 mm Hg), hipovolemia, deshidratación, inestabilidad o insuf. circulatoria, fiebre alta, enf. cardíaca coronaria o estenosis de vasos sanguíneos cerebrales; vigilar a estos pacientes. I.H. o I.R.

Insuficiencia hepática:Precaución. Evitar dosis elevadas.

Insuficiencia renal:Precaución. Evitar dosis elevadas.

Interacciones:Disminuye nivel plasmático de: ciclosporina.
Efecto sinérgico con: alcohol.

Embarazo:Contraindicado.

Lactancia: evitar.

Afecta a la capacidad de conducir.