

Loratadina



Mecanismo de acción: Antihistamínico tricíclico con actividad selectiva sobre receptores H_1 periféricos.

Indicaciones terapéuticas: Alivio sintomático y temporal de procesos alérgicos por polen, animales domésticos, polvo u otros agentes. Tto. sintomático de rinitis alérgica y urticaria idiopática crónica.

Modo de administración: Se puede tomar con independencia de las comidas.

Dosis:

Para el alivio de los síntomas de las alergias: Para adultos y niños mayores de 12 años: La dosis típica es de 10 mg por vía oral una vez al día.

Para el alivio de los síntomas de la urticaria:

Para adultos y niños mayores de 12 años: La dosis típica es de 10 mg por vía oral una vez al día.

Para niños: La dosis en niños debe ser determinada por el médico, ya que varía según la edad y el peso del niño. El médico determinará la dosis adecuada según la indicación médica específica.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad.

Advertencias y precauciones: I.H. grave. Evaluar situación clínica si los síntomas persisten o empeoran tras 7 días de tto. Sólo administrar en niños < 6

años bajo supervisión médica. Niños < 2 años seguridad/eficacia no establecidas.

Insuficiencia hepática:Precaución en I.H. grave, dosis inicial más baja (la indicada, en días alternos).

Interacciones:

- Posible nivel aumentado con incremento de reacciones adversas con inhibidores de CYP3A4 o CYP2D6.
- Lab: falso - en pruebas cutáneas por impedir o disminuir la reacción dérmica (suspender mín. 48 h antes).

Embarazo:Precaución.

Lactancia: evitar.