

## Ketotifeno



**Mecanismo de acción:**Antiasmático no broncodilatador con actividad anti anafiláctica y bloqueante de receptores  $H_1$  . Inhibe: broncoconstricción aguda, hiperreactividad y acumulación de eosinófilos en vías aéreas inducidas por PAF, y liberación de mediadores químicos; antagonista de broncoconstricción aguda por SRS-A.

**Indicaciones terapéuticas:** Profilaxis de asma bronquial especialmente asociado a síntomas atópicos. Profilaxis y tto. de rinitis y afección cutánea alérgica, así como de manifestaciones alérgicas múltiples.

### **Modo de administración:**

**Vía oral (por boca):** Tome la dosis de ketotifeno según las indicaciones del médico o las instrucciones del producto específico.

Las tabletas se deben tragar enteras con agua. No las rompa ni las mastique a menos que se indique lo contrario.

El jarabe se puede medir con una cuchara dosificadora que se proporciona con el producto. Siga las instrucciones precisas de dosificación y agite bien el frasco antes de usarlo.

El ketotifeno generalmente se toma una o dos veces al día, según lo prescrito por el médico.

### **Dosis:**

**Para adultos y adolescentes:** Dosis típica: 1 mg a 2 mg dos veces al día.

**Para niños:** La dosis en niños debe ser determinada por el médico, ya que varía según la edad y el peso del niño. El médico determinará la dosis adecuada según la indicación médica específica.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad.

**Advertencias y precauciones:** No indicado para remitir crisis asmática instaurada. Si precisa retirada, hacerlo progresivamente en 2-4 sem por riesgo de recurrencia de síntomas asmáticos. No interrumpir bruscamente otros antibióticos profilácticos y sintomáticos, en especial corticosteroides sistémicos y ACTH por riesgo de insuf. corticosuprarrenal. Recomendable recuento de plaquetas periódico en concomitancia con antidiabéticos orales, en raras ocasiones se ha observado trombocitopenia. Historial de epilepsia.

**Interacciones:** Potencia efecto de: depresores del SNC, antihistamínicos y alcohol.

**Embarazo:** Contraindicado.

**Lactancia:** evitar.

**Afecta la capacidad de conducir.**