

## Cetirizina



**Mecanismo de acción:** Antagonista  $H_1$  selectivo. Inhibe la fase inicial de la reacción alérgica, y reduce la migración de células inflamatorias y la liberación de mediadores asociados a respuesta tardía.

**Indicaciones terapéuticas:** Alivia síntomas nasales y oculares de rinitis alérgica estacional y perenne, y síntomas de urticaria crónica idiopática, en ads. y niños > 2 años.

**Modo de administración:** Gotas orales en solución: se pueden tomar tal cual o diluir en agua. Si se diluyen deben tomarse inmediatamente.

### Dosis:

**Para el alivio de los síntomas de las alergias:** Para adultos y adolescentes (mayores de 12 años): La dosis típica es de 10 mg por vía oral una vez al día.

**Para el alivio de los síntomas de la urticaria:** Para adultos y adolescentes (mayores de 12 años): La dosis típica es de 10 mg por vía oral una vez al día.

**Para niños:** La dosis en niños debe ser determinada por el médico, ya que varía según la edad y el peso del niño. El médico determinará la dosis adecuada según la indicación médica específica.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a cetirizina, hidroxizina u otro derivado piperazínico. Enf. renal terminal ( $Cl_{cr} < 10$  ml/min).

**Advertencias y precauciones:** I.R. moderada y grave, ajustar dosis. Riesgo de convulsión, epilepsia. Concomitancia con: alcohol, depresores del SNC. No

recomendado en niños < 2 años. Inhibe prueba cutánea de alergia, espaciar 3 días. Pacientes con factores de predisposición a la retención urinaria.

**Insuficiencia renal:** Contraindicado con enf. renal terminal (Clcr < 10 ml/min). Precaución con I.R. moderada y grave, ajustar dosis. Ads., Clcr 30-49 ml/min: 5 mg 1 vez/día; Clcr < 30: 5 mg/48 h. Niños: ajuste individual según Clcr, edad y peso.

**Interacciones:** Véase Advertencias y precauciones

**Embarazo:** Precaución.

**Lactancia:** evitar.