

Voltaren



Mecanismo de acción: Disminuye la permeabilidad capilar de tejidos inflamados, inhibe la hialuronidasa producida por gérmenes, la síntesis de prostaglandinas y la agregación plaquetaria.

Modo de administración:

Tabletas y cápsulas, gel tópico, supositorios y solución inyectable.

Dosis:

Voltaren oral (tabletas o cápsulas):

Dolor leve a moderado: La dosis típica es de 50 mg dos o tres veces al día. En algunos casos, se puede iniciar con una dosis de carga de 100 mg seguida de 50 mg cada 8 horas.

Artritis reumatoide y osteoartritis: La dosis típica es de 100-150 mg al día, dividida en dos o tres dosis.

Voltaren en gel tópico:

Dolor localizado en articulaciones (como la rodilla o el hombro): Aplica 2-4 gramos de gel en la zona afectada, de 3 a 4 veces al día.

Dolor localizado en manos, muñecas o codos: Aplica 1-2 gramos de gel en la zona afectada, de 3 a 4 veces al día.

Voltaren supositorios:

Dolor leve a moderado: La dosis típica es de 50-100 mg cada 8-12 horas, según sea necesario.

Voltaren solución inyectable:

La dosis y la forma de administración de la solución inyectable deben ser determinadas por un profesional de la salud, ya que generalmente se administra en un entorno clínico o hospitalario.

Indicaciones terapéuticas: Alivio local del dolor y la inflamación leves, pequeñas contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras contracturas, lumbalgias y esguinces leves (torcedura).

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a diclofenaco, a otros AINE (incluyendo AAS); asma, rinitis, angioedema, urticaria producidas por AAS u otros AINE. Además los apósitos adhesivos medicamentosos, en úlcera péptica activa, heridas abiertas, quemaduras, infecciones en la piel o eccema; 3^{er} trimestre del embarazo.

Advertencias y precauciones:

No aplicar sobre ojos, mucosas, heridas abiertas, áreas extensas, ni vendaje oclusivo. Uso simultáneo de otras preparaciones tópicas. Evitar exposición al sol. No utilizar niños < 12 años (emulsión), < 6 años (gel) y < 18 años (apósito adhesivo medicamentoso). Los apósitos adhesivos medicamentosos además se deben usar con precaución en I.R., insuf. cardíaca, I.H., historia de úlcera péptica, inflamación intestinal, diátesis hemorrágica y ancianos. Riesgo de broncoespasmo en pacientes con asma bronquial o alergias.

Insuficiencia hepática: Precaución. Aunque los efectos sistémicos son mínimos, los apósitos adhesivos medicamentosos deben usarse con precaución.

Insuficiencia renal: Precaución. Aunque los efectos sistémicos son mínimos, los apósitos adhesivos medicamentosos deben usarse con precaución.

Embarazo: Contraindicado.

Lactancia: precaución.

Produce reacciones de fotosensibilidad. El paciente evitará exponerse a la luz solar.