

## Ciproheptadina



**Mecanismo de acción:** Antihistamínico y antiserotoninico con efectos anticolinérgicos y sedantes.

**Indicaciones terapéuticas:** Alergia, prurito agudo y crónico, anogenital y varicela, reacción anafiláctica con epinefrina tras controlar reacciones agudas, cefalea vascular, migraña, cefalalgia histamínica.

### **Modo de administración:**

#### **Vía oral (por boca):**

Tome la dosis de ciproheptadina según las indicaciones del médico o las instrucciones del producto específico.

Las tabletas se deben tragar enteras con agua. No las rompa ni las mastique a menos que se indique lo contrario.

La solución líquida generalmente se mide con una cuchara o una jeringa dosificadora que se proporciona con el producto. Siga las instrucciones precisas de dosificación y agite bien el frasco antes de usarlo.

La ciproheptadina generalmente se toma una o dos veces al día, dependiendo de la indicación médica específica.

### **Dosis:**

**Para adultos y adolescentes:** Dosis típica: 4 mg a 20 mg al día, divididos en varias dosis.

Dosis máxima diaria: No exceder los 20 mg al día.

**Para niños:**

La dosis en niños debe ser determinada por el médico, ya que varía según la edad y el peso del niño. El médico determinará la dosis adecuada según la indicación médica específica.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad; ataque asmático agudo, glaucoma de ángulo cerrado, úlcera péptica estenosante, hipertrofia prostática sintomática, obstrucción de cuello vesical o piloroduodenal; ancianos debilitados, recién nacidos y prematuros; lactancia.

**Advertencias y precauciones:** Asma bronquial, PIO elevado, hipertiroidismo, enf. cardiovascular, HTA. No está recomendado en niños < 2 años. Riesgo de mareo y sedación. Raramente, discrasia hemática en tto. prolongado.

**Interacciones:** Efectos anticolinérgicos aumentados por: IMAO. Efectos aditivos sobre el SNC con: alcohol, hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, ansiolíticos.

**Embarazo:** Contraindicado.

**Lactancia:** evitar.

**Produce reacciones de fotosensibilidad. El paciente evitará exponerse a la luz solar.**

**Afecta la capacidad de conducir.**