

## Dihidrocodeína



**Mecanismo de acción:** Acción antitusígena y analgésica central.

**Indicaciones terapéuticas:** Tto. sintomático de la tos improductiva.

**Modo de administración:** Vía oral. Las gotas pueden tomarse directamente o bien diluidas en un poco de agua.

### **Dosis:**

#### **Dolor leve a moderado:**

- Dosis típica para adultos: 15-30 mg cada 4-6 horas, según sea necesario. No exceder 120 mg en 24 horas.
- Dosis típica para niños: La dosis varía según el peso y la edad del niño. Consulta con un médico para determinar la dosis adecuada.

#### **Supresión de la tos:**

**Dosis típica para adultos:** 10-20 mg cada 4-6 horas, según sea necesario. No exceder 120 mg en 24 horas.

**Dosis típica para niños:** La dosis varía según el peso y la edad del niño. Consulta con un médico para determinar la dosis adecuada.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a dihidrocodeína o a sus sales; asma bronquial, enfisema pulmonar, insuf. o depresión respiratoria; coma; estados convulsivos; 3<sup>er</sup> trimestre embarazo; lactancia; niños < 2 años.

**Advertencias y precauciones:**

No recomendado en: I.H., trastornos respiratorios o de la conciencia, estados de presión intracraneal alta, 1<sup>os</sup> 4 meses de embarazo, estreñimiento crónico, íleo paralítico o en riesgo, distensión abdominal, diarrea asociada a colitis pseudomembranosa (causada por antibióticos de amplio espectro), diarrea causada por intoxicación hasta que se haya eliminado el material tóxico del tracto gastrointestinal, dependencia a opiáceos; prolongar intervalo de dosificación en I.R. grave, dializados y ancianos; precaución en: pacientes con antecedentes de epilepsia, lesiones en la cabeza (traumatismo craneoencefálico), hipertrofia prostática, estenosis uretral y afecciones de la vesícula biliar (incluyendo pancreatitis aguda), historial previo de drogodependencia; en uso prolongado puede producir dependencia física y tolerancia; valorar beneficio/riesgo en tos productiva; puede producir falsos + en las pruebas de control de opiáceos.

**Insuficiencia hepática:** No recomendado.

**Insuficiencia renal:** Precaución. En I.R. grave y diálisis prolongar intervalo de dosificación.

**Interacciones:**

- Aumento de excitabilidad con: IMAO (en concomitancia y 14 días tras finalización de tto. con IMAO).
- Acción sedante y depresión respiratoria potenciada por: inhibidores del SNC.
- Capacidad psicomotriz reducida con: alcohol.
- Depresión respiratoria potenciada por: antidepresivos tricíclicos. Potencia efecto de: analgésicos.
- Posibilidad de acción potenciada por: cimetidina, quinidina, fluoxetina.

**Embarazo:** Contraindicado.

**Lactancia:** evitar.

**Afecta la capacidad de conducir.**

