

Desloratadina



Mecanismo de acción: Antagonista selectivo de receptores de histamina H_1 periféricos, de acción prolongada, no sedante, antialérgico.

Indicaciones terapéuticas: Alivio de síntomas asociados a rinitis alérgica y a urticaria.

Modo de administración: Administrar con o sin alimentos.

Dosis:

Para el alivio de los síntomas de las alergias: Para adultos y niños mayores de 12 años: La dosis típica es de 5 mg una vez al día por vía oral.

Para el alivio de los síntomas de la urticaria crónica idiopática:

Para adultos y adolescentes (mayores de 12 años): La dosis típica es de 5 mg una vez al día por vía oral.

Para niños: La dosis en niños debe ser determinada por el médico, ya que varía según la edad y el peso del niño. El médico determinará la dosis adecuada según la indicación médica específica.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad, incluida la loratadina.

Advertencias y precauciones: I.R. severa; niños < 2 años: considerar la ausencia de infección en tracto respiratorio superior o de anomalías estructurales, historial, exámenes físicos y pruebas de laboratorio y cutáneas; seguridad y eficacia no establecida en niños < 1 año; experiencia clínica de eficacia limitada en niños de 6 -11 años y adolescentes 12-17 años; precaución en pacientes con antecedentes personales o familiares de crisis convulsivas (sobre todo niños pequeños al ser más susceptibles de desarrollar nuevas crisis), suspender el tto. si se experimenta una crisis durante el tto.

Insuficiencia renal:Precaución en I.R severa.

Interacciones:Precaución en tto. concomitante con: alcohol.

Embarazo:Contraindicado.

Lactancia: evitar.