

Codeína



Mecanismo de acción: Se basa en la interacción con los receptores opioides muy presentes en el cerebro y en otros tejidos del cuerpo.

Cuando la codeína se une a los receptores opioides mu, produce varios efectos, incluyendo la disminución de la percepción del dolor y la modulación de la respuesta analgésica. Además, la codeína también puede tener efectos antitusígenos (supresión de la tos) y efectos sedantes.

Indicaciones terapéuticas: Dolor de intensidad moderada.

Modo de administración: Comprimidos: tomar entero o fraccionado, con agua, leche o zumo de frutas.

- Solución oral: diluir en agua, leche o zumo de frutas.
- Sobres y comprimidos efervescentes: disolver el contenido del sobre en un vaso de agua.
- Cápsulas: tomar con la ayuda de algún líquido.

Dosis:

Dolor leve a moderado:

- Dosis típica para adultos: 15-60 mg cada 4-6 horas, según sea necesario. No exceder 360 mg en 24 horas.
- Dosis típica para niños: La dosis varía según el peso y la edad del niño. Consulta con un médico para determinar la dosis adecuada.

Supresión de la tos:

- Dosis típica para adultos: 10-20 mg cada 4-6 horas, según sea necesario. No exceder 120 mg en 24 horas.

- Dosis típica para niños: La dosis varía según el peso y la edad del niño. Consulta con un médico para determinar la dosis adecuada.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a paracetamol, codeína, depresión respiratoria aguda, asma aguda, EPOC, íleo paralítico o riesgo, enf. hepáticas, hepatitis viral, presión intracraneal aumentada, menores de 18 años que vayan a ser intervenidos de amigdalectomía/adenoidectomía por síndrome de apnea obstructiva del sueño; pacientes que se sabe son metabolizadores ultrarrápidos para la enzima CYP2D6, lactancia.

Advertencias y precauciones:

Véase paracetamol. Además: con deterioro de la función cardíaca, hepática o renal, hipertrofia prostática, estenosis uretral, enf. de Addison, trastornos intestinales obstructivos o inflamatorios, colitis ulcerosa crónica, afecciones de la vesícula biliar (incluyendo pancreatitis aguda), hipotiroidismo, esclerosis múltiple, enf. que cursen con disminución de la capacidad respiratoria. Ancianos. Riesgo de dependencia y tolerancia. Niños < 12 años.

Insuficiencia hepática: Contraindicado en enf. hepáticas.

Insuficiencia renal: Precaución. En I.R. grave reducir dosis al 50 %, e intervalo mín. 8 h.

Interacciones: Véase paracetamol y codeína.

Embarazo: Contraindicado.

Lactancia: evitar.

Produce reacciones de fotosensibilidad. El paciente evitará exponerse a la luz solar.