

Epinastina



Mecanismo de acción: Antihistamínico no sedante con una elevada afinidad por los receptores H_1 , antagonizando de esta forma los efectos de histamina; adicionalmente, se le han encontrado propiedades como antagonista de la serotonina, así como efectos β -adrenolíticos (tipo 1 y 2) al ser administrado en dosis altas, sin que dé lugar a manifestaciones de actividad a nivel central. Adicionalmente presenta un efecto inhibitorio en la liberación de histamina y SRS-A y un efecto antagonista de otros mediadores bioquímicos como leucotrieno, Ca, PAF y serotonina.

Indicaciones terapéuticas: Profilaxis y tto. de trastornos alérgicos. Urticaria aguda y crónica. Dermatitis atópica. Angioedema. Rinitis. Conjuntivitis alérgica. Hay fiebre. Reacciones alérgicas debido a alimentos o medicamentos.

Modo de administración:

Vía oral (por boca): La epinastina generalmente se administra en forma de tabletas o cápsulas.

Sigue las indicaciones precisas del médico o las instrucciones del producto en cuanto a la dosis y la frecuencia de administración.

Las tabletas o cápsulas se deben tragar enteras con agua.

Solución oftálmica (gotas para los ojos):

La epinastina también está disponible en forma de gotas para los ojos.

Lava tus manos antes de usar las gotas.

Inclina la cabeza hacia atrás y tira suavemente del párpado inferior hacia abajo para formar una bolsa.

Sujeta el frasco de las gotas cerca del ojo sin tocarlo y aplica la cantidad de gotas indicada por el médico.

Parpadea varias veces para asegurar la distribución adecuada del medicamento.

Dosis:

Para el tratamiento de la rinitis alérgica: Para adultos y adolescentes (mayores de 12 años): La dosis típica es de 10 mg una vez al día por vía oral.

Para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica (uso tópico en gotas para los ojos): Para adultos y niños mayores de 12 años: La dosis típica es de 1 gota en cada ojo afectado dos veces al día.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula o a los medicamentos de estructura química similar. No administrarse durante el embarazo, lactancia o en casos de I.R. o I.H.

Advertencias y precauciones: Por carecer de experiencia clínica en < 6 años, no deberá ser administrado en este grupo de edad.

Insuficiencia hepática: Contraindicado.

Insuficiencia renal: Contraindicado.

Interacciones: No deberá tomarse conjuntamente con otros antihistamínicos, con medicamentos depresores del SNC ni con bebidas alcohólicas.

Embarazo: Contraindicado.

Lactancia: evitar.