

Foglio 5

Daniele Falanga

Esercizio 1

Dati gli eventi:

- A pernice colpita da Alice
- B pernice colpito da Bob
- E pernice colpito da entrambi
- F pernice colpito da una freccia

1. Non dando il numero di tentativi posso utilizzare la proprietà delle variabili indipendenti:

$$P(E) = P(A) \cdot P(B) = 1/3 \cdot 1/2 = \frac{1}{12}$$

2. Posso usare il complemento:

$$P(F) = 1 - [P(A^c) \cdot P(B^c)] =$$

$$P(F) = 1 - \left[\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \right] =$$

$$P(F) = \frac{1}{2}$$

3. Uso la formula di Bayes:

$$\left\{ \begin{array}{l} P(A|F) = \frac{P(A) \cdot P(F|A)}{P(F)} = \frac{4}{9} \\ P(F|A) = \frac{P(F) \cap P(A)}{P(F)} = \frac{2}{3} \end{array} \right.$$

Esercizio 2

Esercizio 3

Il problema può essere modellato come una serie di Bernoulliane di probabilità di successo p . Considerando ogni esperimento come una variabile aleatoria a se stante X_1, X_2, \dots, X_n .

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se la prova } i\text{-esima ha successo} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

In maniera compatta la singola distribuzione assume la forma:

$$P(X_i = k) = p^k(1-p)^{1-k} \quad k = 0, 1$$

Sfruttando l'indipendenza, la distribuzione assume la forma:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n | p) &= P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) \\ &= p^{x_1}(1-p)^{1-x_1} \dots p^{x_n}(1-p)^{1-x_n} \\ &= p^{\sum_i x_i} (1-p)^{n-\sum_i x_i} \end{aligned}$$

Per determinare p che massimizzi si prendono i logaritmi:

$$\log f(x_1, x_2, \dots, x_n | p) = \sum_{i=1}^n x_i \log p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \log(1-p)$$

Derivando rispetto a p ed uguagliando a 0 l'espressione si ottiene:

$$\frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{1-p} \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

da cui

$$p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Stimatore di massima verosimiglianza cercato}$$

Esercizio 4

1. La distribuzione di X :

$$P(X) = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6}$$

2. Il valore atteso:

$$E[X] = \sum_{i=1}^6 i \frac{1}{6}$$

3. Data la seguente formula di Varianza:

$$\begin{aligned}Var(X) &= E[(X - E[X])^2] \\Var(X) &= 2.91\end{aligned}$$

Esercizio 5

1. La distribuzione di X:

$$\begin{aligned}P(X = 1) &= \frac{11}{36} \\P(X = 2) &= \frac{9}{36} \\P(X = 3) &= \frac{7}{36} \\P(X = 4) &= \frac{5}{36} \\P(X = 5) &= \frac{3}{36} \\P(X = 6) &= \frac{1}{36}\end{aligned}$$

2. Il valore atteso:

$$E[X] = 2.36$$

Esercizio 6

1. Ogni domanda è una prova ripetuta. Le prove sono 10, per passare il test con 18 bisogna rispondere bene a 7 domande (7 successi) e rispondere male a 3 (3 fallimenti), quindi, si usa la variabile binomiale:

$$P(X = 18) = \binom{10}{7} \left(\frac{1}{4}\right)^7 \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 0.30$$

2. Il valore atteso:

$$E[X] = np = 10 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) = 0.25\%$$

3. La varianza:

$$Var[X] = np(1 - p) = 0.25\% \cdot \frac{3}{4}$$