

# Типовой расчет по линейной алгебре по теме «Матрицы и определители. Векторные пространства»

## Оглавление

Задание 1. Матрицы .....	2
Задание 2. Системы линейных уравнений .....	5
Задание 3. Определение линейного пространства .....	9
Задание 4. Базис, координаты вектора в базисе .....	11
Задание 5. Матрица перехода от одного базиса к другому. ....	13
Задание 6. Сумма и пересечение подпространств .....	15
Использованная литература .....	18

## Задание 1. Матрицы

### Пример выполнения задания 1

Задача. Даны две квадратные матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Вычислить  $A \cdot B$ ,  $B \cdot A$ . Являются ли матрицы  $A$  и  $B$  коммутирующими?
2. Найти матрицу  $A^{-1}$  с помощью элементарных преобразований строк. Проверить, что  $A \cdot A^{-1} = E$ ;
3. Найти матрицу  $B^{-1}$  методом присоединенной (союзной) матрицы. Проверить, что  $B^{-1} \cdot B = E$ ;
4. Найти значение полинома  $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$  от матрицы  $A$ .

Решение. 1) Вычислим произведения матриц:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 & 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 5 \\ -2 \cdot 1 + 3 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 & -2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 & -2 \cdot (-5) + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 5 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 3 & 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -1 & -8 \\ -3 & 8 & 33 \\ -3 & 5 & 2 \end{pmatrix} \\ B \cdot A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + (-5) \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + (-5) \cdot 2 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 4 + (-5) \cdot 1 \\ -3 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 & -3 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2 & -3 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) + 5 \cdot 1 & 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 2 & 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 1 & 23 & 15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Сравнивая полученные результаты, делаем вывод, что  $A \cdot B \neq B \cdot A$ . Значит, матрицы  $A$  и  $B$  не коммутируют.

2. Найдем матрицу  $A^{-1}$  с помощью элементарных преобразований строк.

Припишем к исходной матрице справа единичную матрицу.

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

С помощью элементарных преобразований над строками добьемся того, чтобы слева оказалась единичная матрица. Получим

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{14} & -\frac{2}{7} & \frac{11}{14} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

Таким образом:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{14} & -\frac{2}{7} & \frac{11}{14} \\ \frac{3}{7} & \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Нетрудно проверить, что  $AA^{-1} = E$  (при выполнении типового расчета проверка обязательна).

3) Найдем матрицу  $B^{-1}$  методом присоединенной (союзной) матрицы.

Напомним, что матрица  $\tilde{B}$  является союзной к матрице  $B$ , если ее элементы являются алгебраическими дополнениями соответствующих элементов матрицы  $B$ . Для вычисления обратной матрицы воспользуемся свойством  $B^{-1} = \frac{1}{\det B} \tilde{B}^T$ . Проверим сначала, что матрица  $B$  обратима.

Действительно,  $\det B = 76 \neq 0$ . Далее вычислим алгебраические дополнения элементов матрицы  $B$ :

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -3; B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 17; B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -9;$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -25; B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 15; B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1;$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2; B_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 14; B_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 6$$

Таким образом,  $\tilde{B} = \begin{pmatrix} -3 & 17 & -9 \\ -25 & 15 & 1 \\ 2 & 14 & 6 \end{pmatrix}$ .

Отсюда

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{76} & -\frac{25}{76} & \frac{1}{38} \\ \frac{17}{76} & \frac{15}{76} & \frac{7}{38} \\ -\frac{9}{76} & \frac{1}{76} & \frac{3}{38} \end{pmatrix}.$$

Непосредственной проверкой легко убедиться, что  $BB^{-1} = E$  (при выполнении типового расчета проверка обязательна).

4) Найдем значение полинома  $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$  от матрицы  $A$ .

$$f(A) = 2A^2 - 3A + 5E = 2 \begin{pmatrix} -4 & 6 & 6 \\ -4 & 13 & 18 \\ -2 & 10 & 8 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 6 & 15 \\ -2 & 22 & 24 \\ -7 & 14 & 18 \end{pmatrix}.$$

## Варианты задания 1

Даны две квадратные матрицы  $A$  и  $B$ .

1. Вычислить  $A \cdot B, B \cdot A$ . Являются ли матрицы  $A$  и  $B$  коммутирующими?
2. Найти матрицу  $A^{-1}$  с помощью элементарных преобразований строк. Проверить, что  $A \cdot A^{-1} = E$ ;
3. Найти матрицу  $B^{-1}$  методом присоединенной (союзной) матрицы. Проверить, что  $B^{-1} \cdot B = E$ ;
4. Найти значение полинома  $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$  от матрицы  $A$ .

1.  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix};$

11.  $A = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 7 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix};$

2.  $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -7 \\ -1 & 6 & -3 \\ 2 & -4 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & -6 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix};$

12.  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix};$

3.  $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix};$

13.  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{pmatrix};$

4.  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 4 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 8 & -4 \\ 6 & 9 & -5 \\ 4 & 7 & -3 \end{pmatrix};$

14.  $A = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 4 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 7 \end{pmatrix};$

5.  $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 2 \\ 6 & 7 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 5 & -1 & 3 \end{pmatrix};$

15.  $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \\ 1 & 9 & 2 \end{pmatrix};$

6.  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix};$

16.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -4 & 9 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 2 \\ 1 & 9 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix};$

7.  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix};$

17.  $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ -4 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix};$

8.  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 8 & -7 & -6 \\ -3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 3 & -5 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix};$

18.  $A = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 4 \\ -1 & -1 & 1 \\ 10 & 1 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix};$

9.  $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 8 & -5 \\ -3 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & -3 \end{pmatrix};$

19.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -3 & 0 & 1 \\ 5 & 6 & -4 \end{pmatrix};$

10.  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix};$

20.  $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 8 & 4 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 7 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix};$

$$21. A = \begin{pmatrix} -5 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & 6 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -9 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & -5 \\ 1 & -7 & 2 \end{pmatrix};$$

$$26. A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -6 \\ -3 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 & 11 & -5 \\ 4 & 2 & -3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix};$$

$$22. A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & -3 & 6 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 2 & 7 & -5 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$27. A = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -2 \\ 11 & -3 & 4 \\ 5 & 4 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & -7 & 8 \\ 5 & -2 & 4 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix};$$

$$23. A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 3 & -7 & -2 \\ 5 & 9 & 3 \end{pmatrix};$$

$$28. A = \begin{pmatrix} 3 & 11 & -1 \\ -2 & 4 & -3 \\ 3 & 4 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 8 \\ 3 & -4 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$24. A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 3 \\ 8 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -6 \\ 5 & -7 & -2 \\ 7 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$29. A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ -2 & 5 & -11 \\ 2 & 3 & -8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 6 \\ -2 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix};$$

$$25. A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & -5 \\ -8 & 7 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ -3 & 8 & -1 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix};$$

$$30. A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & -7 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -8 \\ 5 & 11 & 2 \\ 6 & -1 & 8 \end{pmatrix}.$$

## Задание 2. Системы линейных уравнений

### Пример выполнения задания 2

Задача. Решить систему линейных уравнений. Записать решение в виде суммы общего решения соответствующей однородной системы и частного решения неоднородной системы. Общее решение однородной системы представить как линейную комбинацию фундаментальной системы решений.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 2, \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 14, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 14. \end{cases}$$

Решение. Это система  $n = 4$  линейных неоднородных уравнений с  $m = 5$  неизвестными  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ . Обозначим через  $A$  и  $A^r$  основную и расширенную матрицы системы соответственно.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}, A^r = \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 14 \\ 2 & -3 & 2 & -4 & 2 & 14 \end{array} \right).$$

Сначала надо определить, имеет ли эта система решения и сколько. Для этого приведем расширенную матрицу  $A^r$  элементарными преобразованиями строк (только!) к трапецевидной форме:

$$A^r \sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & -4 & -3 & -3 & -68 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \tilde{A}^r.$$

При этом матрица  $A$  перейдет в  $\tilde{A}$ . Размерность линейной оболочки столбцов матрицы  $A$  равна  $r = 3$  и вектор, стоящий в правой части принадлежит данной линейной оболочке. При этом  $m > r$ .

Согласно теореме Кронекера-Капелли такая система является совместной и имеет бесконечное множество решений.

Решение неоднородной системы в этом случае может быть получено как сумма общего решения соответствующей однородной и какого-либо решения неоднородной. Общее решение однородной системы представляет из себя линейную комбинацию фундаментальной системы решений, которая состоит из  $m - r$  векторов, что в рассматриваемом примере равно двум.

Чтобы найти решения однородной системы, запишем сначала эквивалентную ей систему с матрицей  $\tilde{A}$ :

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_4 = 0 \\ -4x_3 - 3x_4 - 3x_5 = 0 \end{cases}$$

В качестве базисных векторов линейной оболочки системы выберем векторы, состоящие из коэффициентов при базисных неизвестных  $x_1, x_2$  и  $x_3$ . Далее, придавая оставшимся переменным  $x_4$  и  $x_5$  любые значения, неизвестные  $x_1, x_2$  и  $x_3$  можно получить единственным образом. Чтобы найти два фундаментальных решения однородной системы, достаточно придать свободным переменным  $x_4$  и  $x_5$  значения  $x_4 = 1, x_5 = 0$  и  $x_4 = 0, x_5 = 1$ . При этом значения базисных переменных  $x_1, x_2, x_3$  находятся единственным образом, так как определитель системы уравнений для них отличен от нуля:

Взяв  $x_4 = 1, x_5 = 0$  из системы

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 3 \\ x_2 = -2 \\ -4x_3 = 3 \end{cases}$$

получим  $x_3 = -3/4, x_2 = -2, x_1 = -1/4$  и вектор решений  $X_1 = (-1/4, -2, -3/4, 1, 0)^T$ . Затем, аналогично, взяв  $x_4 = 0, x_5 = 1$ , получим  $X_2 = (-1/4, 0, -3/4, 0, 1)^T$ . Общее решение однородной системы имеет вид  $Y = c_1 X_1 + c_2 X_2$ , где  $c_1$  и  $c_2$  – произвольные числа.

Теперь найдем какое-либо решение неоднородной системы. Система, соответствующая матрице  $\tilde{A}^r$ , имеет вид

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_4 = 14, \\ -4x_3 - 3x_4 - 3x_5 = -68, \end{cases}$$

и эквивалентна исходной. В качестве ее решения выберем то, для которого  $x_4 = 0, x_5 = 0$ . Тогда получим  $x_3 = 17, x_2 = 14, x_1 = 2 \cdot 14 - 17 = 11$ , то есть вектор решения неоднородной системы  $Z = (11, 14, 17, 0, 0)^T$ .

Таким образом, общее решение исходной системы будет иметь вид

$$X = c_1 \begin{pmatrix} -1/4 \\ -2 \\ -3/4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1/4 \\ 0 \\ -3/4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11 \\ 14 \\ 17 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Вводя новые константы  $\tilde{c}_1 = c_1/4$  и  $\tilde{c}_2 = c_2/4$  общее решение исходной неоднородной системы можно записать в виде:

$$X = \tilde{c}_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \\ -3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{c}_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11 \\ 14 \\ 17 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

## Варианты задания 2

Решить систему линейных уравнений. Записать решение в виде суммы общего решения соответствующей однородной системы и частного решения неоднородной системы. Общее решение однородной системы представить как линейную комбинацию фундаментальной системы решений.

$$1. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 2x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_1 - 4x_2 - x_3 + x_4 = -9, \\ 2x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = 4, \\ x_1 + x_3 = 4, \\ 4x_1 - 6x_2 + 4x_3 - 6x_4 + 3x_5 = 4; \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 3, \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 = -1, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_5 = 0, \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 3x_5 = -3; \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = 9, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 6, \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 11; \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 = 1, \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + 2x_4 - 3x_5 = -1, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 - 2x_5 = -2; \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 + x_5 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 - 3x_5 = -2, \\ 3x_1 + 3x_2 - x_4 + 3x_5 = 3; \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 4, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = -2, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -2, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_4 + x_5 = -6; \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 8, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 - x_5 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 7; \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 1, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = -6, \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -8, \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 + 2x_5 = -7; \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = -3, \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 - x_5 = 3, \\ 3x_1 - 4x_2 - 3x_4 = -6, \\ 5x_1 - 5x_2 - x_3 - 2x_4 + x_5 = -6; \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 = 4, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 - x_5 = 11, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 6, \\ x_1 + 4x_2 - 4x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 9; \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 - x_5 = -1, \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = -3, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 2x_4 - 3x_5 = 2, \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_5 = 0; \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 = -3, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 3, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = -7, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_4 - x_5 = -7; \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 2x_4 - x_5 = 6, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 = 4, \\ 5x_1 - 4x_3 + 2x_4 = 11, \\ 2x_1 + 3x_2 - 7x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 2; \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 + x_5 = 2, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 4, \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 2, \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 3x_5 = 6, \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 - x_4 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
15. & \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 4, \\ x_1 - 4x_2 - x_4 = 4, \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 = 7; \end{cases} \\
16. & \begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + x_4 + 2x_5 = -4, \\ 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 2, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = -6, \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -8, \\ 3x_1 + x_2 - 4x_3 + 4x_4 + 2x_5 = -15; \end{cases} \\
17. & \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = 6, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 = 3, \\ 4x_1 + x_2 - 2x_3 + x_5 = -3, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = -9, \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 + 2x_5 = -6; \end{cases} \\
18. & \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_5 = 6, \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 = -1, \\ 9x_1 + 12x_2 + 3x_3 + 6x_5 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_5 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 3x_5 = -3; \end{cases} \\
19. & \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 6, \\ 5x_1 - x_2 + 10x_3 + x_4 = 15, \\ 2x_1 + 3x_3 - x_5 = 7, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 + 2x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 13; \end{cases} \\
20. & \begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 - 2x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 11, \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 = 24, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 13; \end{cases} \\
21. & \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 - x_5 = 1, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 5, \\ x_1 + 3x_2 - 6x_3 + 2x_4 - x_5 = 3, \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + x_5 = 9; \end{cases} \\
22. & \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 1, \\ 4x_1 - x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 = 4, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 11, \\ 2x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 2x_4 + x_5 = -7, \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_3 - 4x_4 - x_5 = 29; \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
23. & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 - x_5 = 4, \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_5 = 1, \\ x_1 + 4x_2 - x_4 = 1, \\ 3x_1 + x_2 - 6x_3 + x_4 = -3; \end{cases} \\
24. & \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 = 7, \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = 4, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 4, \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_5 = 7, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 4; \end{cases} \\
25. & \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 1, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 - x_5 = 3, \\ x_1 - x_2 + 3x_4 - x_5 = 1, \\ 3x_1 + 3x_3 - x_4 + x_5 = 3; \end{cases} \\
26. & \begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - x_5 = -3, \\ 5x_1 - 2x_3 + x_4 + 2x_5 = 2, \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 + 4x_5 = 8, \\ 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -2; \end{cases} \\
27. & \begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 3, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_5 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = -2, \\ x_1 + 2x_2 - x_4 - x_5 = -1; \end{cases} \\
28. & \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = 5, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 3, \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_4 + 3x_5 = 2, \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 5; \end{cases} \\
29. & \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_4 - x_5 = 1, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 5x_4 - 3x_5 = -1, \\ 2x_1 + 5x_2 - 5x_3 + 7x_4 - 4x_5 = -1; \end{cases} \\
30. & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 8, \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_5 = 4, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 - x_5 = -4, \\ 7x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 2x_5 = 12. \end{cases}
\end{aligned}$$



### Задание 3. Определение линейного пространства

#### Пример выполнения задания 3

Образует ли линейное пространство заданное множество всех положительных действительных чисел, в котором определены сумма любых двух элементов  $a$  и  $b$  и произведение любого элемента  $a$  на скаляр  $\lambda$ :

$$\text{сумма } a + b = ab, \text{ произведение } \lambda a = a^\lambda.$$

Решение.

Обозначим  $\mathbb{R}^+$  – множество всех положительных действительных чисел. Заданные в условии сумму и умножение на скаляр будем обозначать  $\hat{+}$  и  $\hat{\cdot}$ , чтобы отличать их от стандартных операций.

Поскольку произведение двух положительных чисел положительно и произвольная степень любого положительного числа также положительна, операции определены корректно:

$$a, b \in \mathbb{R}^+, \text{ тогда } a \hat{+} b = ab \in \mathbb{R}^+,$$

$$a \in \mathbb{R}^+, \lambda \in \mathbb{R}, \text{ тогда } \lambda \hat{\cdot} a = a^\lambda \in \mathbb{R}^+.$$

Проверим выполнение аксиом линейного пространства.

1-4. В силу коммутативности и ассоциативности умножения действительных чисел, операция  $\hat{+}$  коммутативна и ассоциативна, а нейтральным элементом для неё является  $1 \in \mathbb{R}^+$ . Противоположным для элемента  $a \in \mathbb{R}^+$  является элемент  $\frac{1}{a} \in \mathbb{R}^+$ . Таким образом, множество  $\mathbb{R}^+$  является абелевой группой относительно  $\hat{+}$ .

5. Унитарность этой операции очевидна:  $1 \hat{\cdot} a = a^1 = a$ .

6. Выберем произвольные  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  и произвольный элемент  $a \in \mathbb{R}^+$ ; тогда

$$\lambda \hat{\cdot} (\mu \hat{\cdot} a) = \lambda \hat{\cdot} (a^\mu) = (a^\mu)^\lambda = a^{\lambda\mu} = (\lambda \hat{\cdot} \mu) \hat{\cdot} a,$$

то есть умножение на число ассоциативно.

7-8. Проверим дистрибутивность: пусть  $\lambda, \mu$  – произвольные скаляры, а  $a, b \in \mathbb{R}^+$ . Тогда

$$(\lambda \hat{+} \mu) \hat{\cdot} a = a^{\lambda+\mu} = a^\lambda a^\mu = a^\lambda \hat{+} a^\mu = \lambda \hat{\cdot} a + \mu \hat{\cdot} a,$$

$$\lambda \hat{\cdot} (a \hat{+} b) = (ab)^\lambda = a^\lambda b^\lambda = \lambda \hat{\cdot} a \hat{+} \lambda \hat{\cdot} b.$$

Таким образом, множество  $\mathbb{R}^+$  является линейным пространством относительно заданных операций.

#### Варианты задания 3

Образует ли линейное пространство заданное множество, в котором определены сумма любых двух элементов  $a$  и  $b$  и произведение любого элемента  $a$  на любое число  $\lambda$ ?

1. Множество всех векторов трехмерного пространства, координаты которых – целые числа; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .
2. Множество всех векторов, лежащих на одной оси; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .

3. Множество всех векторов на плоскости, каждый из которых лежит на одной из осей; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .
4. Множество всех векторов трехмерного пространства; сумма  $a \cdot b$  (скалярное произведение), произведение  $\lambda \cdot a$ .
5. Множество всех векторов, лежащих на одной оси; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot |a|$ .
6. Множество всех векторов, являющихся линейными комбинациями векторов  $x, y, z$ ; сумма  $a + b$ , произведение  $\alpha \cdot a$ .
7. Множество всех функций  $a = f(t), b = g(t)$ , принимающих положительные значения; сумма  $a + b = f(t) \cdot g(t)$ , произведение  $\lambda \cdot a = f^\lambda(t)$ .
8. Множество всех непрерывных функций  $a = f(t), b = g(t)$ , заданных на  $[0,1]$ ; сумма  $a + b = f(t) + g(t)$ , произведение  $\lambda \cdot a = \lambda \cdot f(t)$ .
9. Множество всех четных функций  $a = f(t), b = g(t)$ , заданных на отрезке  $[-1,1]$ ; сумма  $a + b = f(t) \cdot g(t)$ , произведение  $\lambda \cdot a = \lambda \cdot f(t)$ .
10. Множество всех нечетных функций  $a = f(t), b = g(t)$ , заданных на отрезке  $[-1,1]$ ; сумма  $a + b = f(t) + g(t)$ , произведение  $\lambda \cdot a = \lambda \cdot f(t)$ .
11. Множество всех линейных функций  $a = f(x_1, x_2), b = g(x_1, x_2)$ ; сумма  $a + b = f(x_1, x_2) + g(x_1, x_2)$ , произведение  $\lambda \cdot a = \lambda \cdot f(x_1, x_2)$ .
12. Множество всех многочленов третьей степени от переменной  $x$ ; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .
13. Множество всех многочленов степени, меньшей или равной трем от переменных  $x, y$ ; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .
14. Множество всех упорядоченных наборов из  $n$  чисел  $a = (x_1, x_2, \dots, x_n), b = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ ; сумма  $a + b = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$ , произведение  $\lambda \cdot a = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$ .
15. Множество всех упорядоченных наборов из  $n$  чисел  $a = (x_1, x_2, \dots, x_n), b = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ ; сумма  $a + b = (x_1 y_1, x_2 y_2, \dots, x_n y_n)$ , произведение  $\lambda \cdot a = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$ .
16. Множество всех сходящихся последовательностей  $a = \{u_n\}, b = \{v_n\}$ ; сумма  $a + b = \{u_n + v_n\}$ , произведение  $\lambda a = \{\lambda u_n\}$ .
17. Множество всех многочленов от одной переменной степени меньшей или равной  $n$ ; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .
18. Множество всех многочленов от одной переменной степени  $n$ ; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .
19. Множество всех диагональных матриц  $a = (a_{ij}), b = (b_{ij}), i, j = 1, 2, \dots, n$ ; сумма  $a + b = (a_{ij} + b_{ij})$ , произведение  $\lambda a = (\lambda a_{ij})$ .
20. Множество всех невырожденных матриц  $a = (a_{ij}), b = (b_{ij}), i, j = 1, 2, \dots, n$ ; сумма  $a + b = (a_{ij}) \cdot (b_{ij})$ , произведение  $\lambda a = (\lambda a_{ij})$ .

21. Множество всех квадратных матриц  $a = (a_{ij}), b = (b_{ij}), i, j = 1, 2, \dots, n$ ;  
сумма  $a + b = (a_{ij} + b_{ij})$ , произведение  $\lambda a = (\lambda a_{ij})$ .
22. Множество всех диагональных матриц  $a = (a_{ij}), b = (b_{ij})$  размера  $n \times n$ ;  
сумма  $a + b = (a_{ij}) + (b_{ij})$ , произведение  $\lambda a = (\lambda a_{ij})$ .
23. Множество всех прямоугольных матриц  $a = (a_{ij}), b = (b_{ij}), i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$ ; сумма  
 $a + b = (a_{ij} + b_{ij})$ , произведение  $\lambda a = (\lambda a_{ij})$ .
24. Множество всех симметрических матриц  $a = (a_{ij})$ , где  $a_{ij} = a_{ji}$ ,  $b = (b_{ij})$ , где  $b_{ij} = b_{ji}$ ,  $i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$ ; сумма  $a + b = (a_{ij} + b_{ij})$ , произведение  $\lambda a = (\lambda a_{ij})$ .
25. Множество всех целых чисел;  
сумма  $a + b$ , произведение  $[\lambda \cdot a]$ .  
[] – обозначается целая часть числа.
26. Множество всех действительных чисел; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .
27. Множество всех положительных действительных чисел; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .
28. Множество всех отрицательных действительных чисел;  
сумма  $-|a| \cdot |b|$ , произведение  $-|a|^\lambda$ .
29. Множество всех действительных чисел; сумма  $a + b$ , произведение  $\lambda \cdot a$ .
30. Множество всех дифференцируемых функций  $a = f(t), b = g(t)$ ;  
сумма  $a + b = f(t) + g(t)$ , произведение  $\lambda \cdot a = \lambda \cdot f(t)$ .

## Задание 4. Базис, координаты вектора в базисе

### Пример выполнения задания 4

Задача. Доказать, что векторы  $p, q, r$  образуют базис пространства  $\mathbb{R}^3$ . Найти координаты вектора  $x$  в базисе  $p, q, r$ .

$$x = (-15, 5, 6), p = (0, 5, 1), q = (3, 2, -1), r = (-1, 1, 0).$$

Решение.

Даны векторы:  $p = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, q = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, r = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -15 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$

Любые три линейно независимых вектора образуют базис пространства  $\mathbb{R}^3$ . Для линейной независимости векторов  $p, q, r$ , необходимо и достаточно, чтобы равенство  $\lambda_1 p + \lambda_2 q + \lambda_3 r = 0$  выполнялось только при  $\lambda_i = 0, i = 1, 2, 3$ . Запишем это равенство в виде

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Оно эквивалентно системе уравнений:

$$\begin{cases} 3\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 5\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Преобразуем матрицу системы:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 5 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 10 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг  $r(A) = 3$  и совпадает с числом неизвестных, значит, однородная система имеет единственное решение:  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ . Таким образом, векторы  $p, q, r$  линейно независимы, а значит, образуют базис  $\mathbb{R}^3$ .

Найдем координаты вектора  $x$  в базисе  $p, q, r$ , то есть коэффициенты разложения вектора  $x$  по векторам  $p, q, r$ :

$$x = \lambda_1 p + \lambda_2 q + \lambda_3 r.$$

Как и ранее это выражение можно представить в виде системы линейных уравнений

$$\begin{cases} 3\lambda_2 - \lambda_3 = -15 \\ 5\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = 5 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 6 \end{cases}$$

Решая систему, находим  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 3$ , то есть  $x = 2p - 4q + 3r$ .

#### Варианты задания 4

Доказать, что векторы  $p, q, r$  образуют базис пространства  $\mathbb{R}^3$ . Найти координаты вектора  $x$  в базисе  $p, q, r$ .

1.  $x = (-2, 4, 7), p = (0, 1, 2), q = (1, 0, 1), r = (-1, 2, 4)$ .
2.  $x = (6, 12, -1), p = (1, 3, 0), q = (2, -1, 1), r = (0, -1, 2)$ .
3.  $x = (1, -4, 4), p = (2, 1, -1), q = (0, 3, 2), r = (1, -1, 1)$ .
4.  $x = (-9, 5, 5), p = (4, 1, 1), q = (2, 0, -3), r = (-1, 2, 1)$ .
5.  $x = (-5, -5, 5), p = (-2, 0, 1), q = (1, 3, -1), r = (0, 4, 1)$ .
6.  $x = (13, 2, 7), p = (5, 1, 0), q = (2, -1, 3), r = (1, 0, -1)$ .
7.  $x = (-19, -1, 7), p = (0, 1, 1), q = (-2, 0, 1), r = (3, 1, 0)$ .
8.  $x = (3, -3, 4), p = (1, 0, 2), q = (0, 1, 1), r = (2, -1, 4)$ .
9.  $x = (3, 3, -1), p = (3, 1, 0), q = (-1, 2, 1), r = (-1, 0, 2)$ .
10.  $x = (-1, 7, -4), p = (-1, 2, 1), q = (2, 0, 3), r = (1, 1, -1)$ .
11.  $x = (6, 5, -14), p = (1, 1, 4), q = (0, -3, 2), r = (2, 1, -1)$ .
12.  $x = (6, -1, 7), p = (1, -2, 0), q = (-1, 1, 3), r = (1, 0, 4)$ .
13.  $x = (5, 15, 0), p = (1, 0, 5), q = (-1, 3, 2), r = (0, -1, 1)$ .

14.  $x = (2, -1, 11), p = (1, 1, 0), q = (0, 1, -2), r = (1, 0, 3)$ .
15.  $x = (11, 5, -3), p = (1, 0, 2), q = (-1, 0, 1), r = (2, 5, -3)$ .
16.  $x = (8, 0, 5), p = (2, 0, 1), q = (1, 1, 0), r = (4, 1, 2)$ .
17.  $x = (3, 1, 8), p = (0, 1, 3), q = (1, 2, -1), r = (2, 0, -1)$ .
18.  $x = (3, 1, 12), p = (1, 2, -1), q = (3, 0, 2), r = (-1, 1, 1)$ .
19.  $x = (-9, -8, -3), p = (1, 4, 1), q = (-3, 2, 0), r = (1, -1, 2)$ .
20.  $x = (-5, 9, -13), p = (0, 1, -2), q = (3, -1, 1), r = (4, 1, 0)$ .
21.  $x = (-15, 5, 6), p = (0, 5, 1), q = (3, 2, -1), r = (-1, 1, 0)$ .
22.  $x = (8, 9, 4), p = (1, 0, 1), q = (0, -2, 1), r = (1, 3, 0)$ .
23.  $x = (23, -14, -30), p = (2, 1, 0), q = (1, -1, 0), r = (-3, 2, 5)$ .
24.  $x = (3, 1, 3), p = (2, 0, 1), q = (1, 0, 1), r = (4, 2, 1)$ .
25.  $x = (-1, 7, 0), p = (0, 3, 1), q = (1, -1, 2), r = (2, -1, 0)$ .
26.  $x = (11, -1, 4), p = (1, -1, 2), q = (3, 2, 0), r = (-1, 1, 1)$ .
27.  $x = (-13, 2, 18), p = (1, 1, 4), q = (-3, 0, 2), r = (1, 2, -1)$ .
28.  $x = (0, -8, 9), p = (0, -2, 1), q = (3, 1, -1), r = (4, 0, 1)$ .
29.  $x = (8, -7, -13), p = (0, 1, 5), q = (3, -1, 2), r = (-1, 0, 1)$ .
30.  $x = (2, 7, 5), p = (1, 0, 1), q = (1, -2, 0), r = (0, 3, 1)$ .

## Задание 5. Матрица перехода от одного базиса к другому.

### Пример выполнения задания 5

Задача. Два базиса  $f = (f_1, f_2, f_3)$  и  $g = (g_1, g_2, g_3)$  заданы своими координатами в некотором третьем базисе  $e$  в  $\mathbb{R}^3$ :  $f_1 = (1, 1, 0), f_2 = (1, 0, 1), f_3 = (0, 1, 1), g_1 = (1, 1, 1), g_2 = (1, 2, 0), g_3 = (-1, 0, 0)$ .

Вектор  $x$  задан координатами в базисе  $g$ :  $x_g = \left(\frac{3}{2}, -2, 3\right)$ . Найти матрицу перехода от базиса  $f$  к базису  $g$ . Найти координаты вектора  $x$  в базисе  $f$ .

Решение.

$$T_{e \rightarrow f} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \text{матрица перехода от } e \text{ к } f,$$

$$T_{e \rightarrow g} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \text{матрица перехода от } e \text{ к } g.$$

Чтобы найти матрицу перехода от  $f$  к  $g$ , воспользуемся формулой  $T_{e \rightarrow g} = T_{e \rightarrow f} \cdot T_{f \rightarrow g}$ .

Из этой формулы получим:  $T_{f \rightarrow g} = T_{e \rightarrow f}^{-1} \cdot T_{e \rightarrow g}$ .

Найдем матрицы  $T_{e \rightarrow f}^{-1}$  и  $T_{f \rightarrow g}$ :

$$T_{e \rightarrow f}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; T_{f \rightarrow g} = T_{e \rightarrow f}^{-1} \cdot T_{e \rightarrow g} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Чтобы найти координаты вектора  $x$  в базисе  $f$ , воспользуемся формулой:  $x_f = T_{f \rightarrow g} \cdot x_g$

$$x_f = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{15}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

Таким образом,  $T_{f \rightarrow g} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, x_f = \begin{pmatrix} -\frac{15}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$

## Варианты задания 5

Два базиса  $f = (f_1, f_2, f_3)$  и  $g = (g_1, g_2, g_3)$  заданы своими координатами в некотором третьем базисе  $e$  в  $\mathbb{R}^3$ . Вектор  $x$  задан координатами в базисе  $g$ . Найти матрицу перехода от базиса  $f$  к базису  $g$ . Найти координаты вектора  $x$  в базисе  $f$ .

1.  $f_1 = (1,0,0), f_2 = (1,1,0), f_3 = (1,1,1), g_1 = (1,2,3), g_2 = (0,1,2), g_3 = (0,0,1), x_g = (1, -1, 2)$
2.  $f_1 = (2,0,1), f_2 = (1,1,0), f_3 = (0,1,2), g_1 = (1,0,0), g_2 = (1,1,0), g_3 = (0,1,1), x_g = (2,1,3)$
3.  $f_1 = (1, -1, 0), f_2 = (1, 0, -1), f_3 = (0, 1, 1), g_1 = (2, 1, 1), g_2 = (1, 2, 1), g_3 = (1, 1, 2), x_g = (1, 1, 1)$
4.  $f_1 = (1, 2, 3), f_2 = (0, 1, 2), f_3 = (0, 0, 1), g_1 = (1, 0, 0), g_2 = (1, 1, 0), g_3 = (1, 1, 1), x_g = (4, 3, 2)$
5.  $f_1 = (1, 0, 0), f_2 = (1, 2, 0), f_3 = (0, 1, 3), g_1 = (2, 0, 1), g_2 = (1, 1, 0), g_3 = (0, 1, 2), x_g = (3, 2, 1)$
6.  $f_1 = (2, 1, 1), f_2 = (1, 2, 1), f_3 = (1, 1, 2), g_1 = (1, 0, 0), g_2 = (1, 1, 0), g_3 = (1, 1, 1), x_g = (1, 0, 2)$
7.  $f_1 = (2, 0, 1), f_2 = (1, 1, 0), f_3 = (0, 2, 1), g_1 = (1, 1, 1), g_2 = (1, -1, 0), g_3 = (0, 1, -1), x_g = (3, 1, 2)$
8.  $f_1 = (1, -1, 0), f_2 = (1, 0, 1), f_3 = (0, 1, -1), g_1 = (1, 1, 1), g_2 = (1, -1, 1), g_3 = (-1, 1, 1), x_g = (2, 1, 0)$
9.  $f_1 = (1, 0, 1), f_2 = (0, 1, 1), f_3 = (1, 1, 0), g_1 = (2, 1, 0), g_2 = (1, 2, 0), g_3 = (0, 0, 1), x_g = (1, -1, 2)$
10.  $f_1 = (1, 1, 0), f_2 = (1, 0, 1), f_3 = (0, 1, 1), g_1 = (1, 1, 1), g_2 = (-1, -2, 0), g_3 = (1, 0, 0), x_g = \left(\frac{3}{2}, -1, 3\right).$
11.  $f_1 = (-2, 0, 0), f_2 = (1, 1, 0), f_3 = (1, 1, 1), g_1 = (-1, -2, -3), g_2 = (0, 1, 2), g_3 = (0, 0, 1), x_g = (1, 1, 2)$
12.  $f_1 = (2, 0, 1), f_2 = (1, 2, 0), f_3 = (0, 1, 2), g_1 = (-1, 0, 0), g_2 = (1, 1, 0), g_3 = (0, 1, 1), x_g = (-2, 1, 3)$
13.  $f_1 = (1, 1, 0), f_2 = (1, 0, -1), f_3 = (0, 1, 2), g_1 = (2, 1, 1), g_2 = (1, 2, 1), g_3 = (1, 1, 2), x_g = (1, 2, 1)$
14.  $f_1 = (1, -2, 3), f_2 = (0, 1, 2), f_3 = (0, 0, 1), g_1 = (2, 1, 0), g_2 = (1, 1, 0), g_3 = (1, 1, 1), x_g = (1, 3, 2)$
15.  $f_1 = (-1, 0, 0), f_2 = (1, 2, 0), f_3 = (0, 1, 3), g_1 = (-2, 0, -1), g_2 = (1, 1, 0), g_3 = (0, 1, 2), x_g = (-3, 2, 1)$
16.  $f_1 = (2, 1, 1), f_2 = (1, 2, 1), f_3 = (1, 1, 2), g_1 = (-2, 0, 0), g_2 = (1, 1, 0), g_3 = (1, 1, 1), x_g = (1, 0, -2)$
17.  $f_1 = (2, 0, 1), f_2 = (-1, -1, 0), f_3 = (0, 2, 1), g_1 = (1, 1, 1), g_2 = (1, 1, 0), g_3 = (0, 1, -1), x_g = (3, -1, 2)$
18.  $f_1 = (1, -1, 0), f_2 = (-1, 0, 1), f_3 = (0, 1, 1), g_1 = (1, 1, 1), g_2 = (1, -1, 1), g_3 = (-1, 1, 1), x_g = (2, 1, 0)$

19.  $f_1 = (1,0,1), f_2 = (0, -1, -1), f_3 = (1,1,0), g_1 = (2,1,0), g_2 = (1,2,0), g_3 = (0,0,1), x_g = (1,1,2)$   
 20.  $f_1 = (-1, -1,0), f_2 = (1,0,1), f_3 = (0,1,1), g_1 = (1,1,1), g_2 = (1,2,0), g_3 = (1,0,0); x_g = (1, -1,3).$   
 21.  $f_1 = (-1,0,0), f_2 = (1,1,0), f_3 = (1,1,1), g_1 = (1,2,3), g_2 = (0, -1, -2), g_3 = (0,0,1), x_g = (1,1,2)$   
 22.  $f_1 = (2,0,1), f_2 = (1, -1,0), f_3 = (0,1,2), g_1 = (-1,0,0), g_2 = (1,1,0), g_3 = (0,1,1), x_g = (2, -1,3)$   
 23.  $f_1 = (-1,1,0), f_2 = (1,0, -1), f_3 = (0,1,1), g_1 = (2,1,1), g_2 = (1,2,1), g_3 = (1,1,2), x_g = (1,3,1)$   
 24.  $f_1 = (1, -2,3), f_2 = (0,1,2), f_3 = (0,0,1), g_1 = (-1,0,0), g_2 = (1,1,0), g_3 = (1,1,1), x_g = (4, -3,2)$   
 25.  $f_1 = (-1,0,0), f_2 = (1,2,0), f_3 = (0,1,3), g_1 = (2,0,1), g_2 = (-1, -1,0), g_3 = (0,1,2), x_g = (-3,2,1)$   
 26.  $f_1 = (2,1, -1), f_2 = (1,2,1), f_3 = (1,1,2), g_1 = (-3,0,0), g_2 = (1,1,0), g_3 = (1,1,1), x_g = (-1,0,2)$   
 27.  $f_1 = (2,0, -1), f_2 = (1,1,0), f_3 = (0,2,2), g_1 = (1,1,1), g_2 = (1,1,0), g_3 = (0,1, -1), x_g = (3, -1,2)$   
 28.  $f_1 = (-1,1,0), f_2 = (1,0,1), f_3 = (0,1, -1), g_1 = (1,1,1), g_2 = (1, -1,1), g_3 = (-1,1,1), x_g = (2,1,0)$   
 29.  $f_1 = (1,0,1), f_2 = (0,1,1), f_3 = (-1,1,1), g_1 = (2,1,0), g_2 = (1,2,0), g_3 = (0,0,1), x_g = (1,1,2)$   
 30.  $f_1 = (1,1,0), f_2 = (-1,0, -1), f_3 = (0,1,1), g_1 = (1,1,1), g_2 = (-1, -2,0), g_3 = (3,0,0), x_g = (0, -1,3).$

## Задание 6. Сумма и пересечение подпространств

### Пример выполнения задания 6

Задача. Подпространство  $L_1$  задано как линейная оболочка векторов  $a_1$  и  $a_2$ . Подпространство  $L_2$  задано как линейная оболочка векторов  $b_1, b_2$  и  $b_3$ . Найти базис и размерность суммы и пересечения этих подпространств.

$$a_1 = (1 \ 0 \ 3 \ 2 \ -1)^T, a_2 = (0 \ -4 \ 7 \ 4 \ -4)^T,$$

$$b_1 = (1 \ 1 \ -2 \ -3 \ 3)^T, b_2 = (1 \ 6 \ -7 \ -10 \ 7)^T, b_3 = (2 \ -3 \ 1 \ 1 \ 2)^T$$

Решение. Для нахождения базиса суммы подпространств  $L_1$  и  $L_2$  запишем векторы данных двух линейных оболочек по столбцам в матрицу, которую затем элементарными преобразованиями приведем к трапецевидной форме  $\tilde{A}$ :

$$A = \left( \begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 1 & 6 & -3 \\ 3 & 7 & -2 & -7 & 1 \\ 2 & 4 & -3 & -10 & 1 \\ -1 & -4 & 3 & 7 & 2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) = \tilde{A}$$

Таким образом, число базисных векторов суммы подпространств равно четырем. Их можно выбрать, например, так:  $a_1, a_2, b_1, b_2$ .

Далее, найдем базис пересечения данных подпространств. Для этого необходимо сначала найти условия, при которых произвольный вектор  $x$  с координатами  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  принадлежит линейной оболочкам  $L_1$  и  $L_2$ , а затем объединить эти условия. Положим  $x \in L_1$ , тогда

$$\left( \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & -4 & x_2 \\ 3 & 7 & x_3 \\ 2 & 4 & x_4 \\ -1 & -4 & x_5 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & -4 & x_2 \\ 0 & 0 & -12x_1 + 7x_2 + 4x_3 \\ 0 & 0 & -2x_1 + x_2 + x_4 \\ 0 & 0 & x_1 - x_2 + x_5 \end{array} \right)$$

Значит  $\dim L_1 = 2$ , а координаты  $x$  должны удовлетворять линейной однородной системе уравнений:

$$\begin{cases} -12x_1 + x_2 + 4x_3 = 0 \\ -2x_1 + x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Пусть теперь  $x \in L_2$ , тогда имеем:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & x_1 \\ 1 & 6 & -3 & x_2 \\ -2 & -7 & 1 & x_3 \\ -3 & -10 & 1 & x_4 \\ 3 & 7 & 2 & x_5 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 1 & -1 & 2x_1 + x_2 - x_5 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 + x_2 + x_3 \\ 0 & 0 & 0 & 17x_1 + 7x_2 + x_4 - x_5 \\ 0 & 0 & 0 & -11x_1 - 4x_2 + 5x_5 \end{array} \right)$$

откуда получаем  $\dim L_2 = 2$  и

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 17x_1 + 7x_2 + x_4 - x_5 = 0 \\ -11x_1 - 4x_2 + 5x_5 = 0 \end{cases}$$

Векторы фундаментальной системы решений линейной системы уравнений, являющейся объединением двух полученных систем, образуют базис пересечения двух линейных подпространств  $L_1$  и  $L_2$ . В рассматриваемом случае получим только тривиальное решение, что согласуется с теоремой о размерностях:

$$\dim L_1 + \dim L_2 = \dim(L_1 + L_2) + \dim(L_1 \cap L_2).$$

Действительно,  $2 + 2 = 4 + 0$  и размерность подпространства-пересечения равна нулю.

## Варианты задания 6

Подпространство  $L_1$  задано как линейная оболочка векторов  $a_1$  и  $a_2$ .

Подпространство  $L_2$  задано как линейная оболочка векторов  $b_1, b_2$  и  $b_3$ .

Найти базис и размерность суммы и пересечения этих подпространств.

$$\begin{aligned} 1. \quad & a_1 = (1 \ 2 \ 3 \ 1 \ 2)^T, \\ & a_2 = (2 \ -1 \ -1 \ 0 \ -3)^T, \\ & b_1 = (1 \ 1 \ -1 \ -2 \ -2)^T, \\ & b_2 = (-1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 2)^T, \\ & b_3 = (1 \ -2 \ 0 \ 2 \ -1)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad & a_1 = (1 \ 2 \ 4 \ 2 \ 7)^T, \\ & a_2 = (1 \ 1 \ 2 \ 1 \ 4)^T, \\ & b_1 = (1 \ -1 \ 2 \ 3 \ 2)^T, \\ & b_2 = (-1 \ 1 \ 0 \ -1 \ 0)^T, \\ & b_3 = (1 \ -1 \ -2 \ -1 \ -2)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad & a_1 = (1 \ 2 \ 3 \ -1 \ 4)^T, \\ & a_2 = (1 \ -1 \ 1 \ -2 \ 2)^T, \\ & b_1 = (2 \ -1 \ -1 \ 0 \ 1)^T, \\ & b_2 = (-2 \ 1 \ -1 \ 2 \ -3)^T, \\ & b_3 = (1 \ 2 \ -1 \ 3 \ -3)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad & a_1 = (1 \ 2 \ 5 \ 1 \ 3)^T, \\ & a_2 = (1 \ -1 \ 0 \ 2 \ -2)^T, \\ & b_1 = (0 \ 1 \ -2 \ -4 \ -2)^T, \\ & b_2 = (-1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 3)^T, \\ & b_3 = (1 \ -1 \ 2 \ 4 \ 0)^T. \end{aligned}$$



5.  $a_1 = (2 \ -1 \ 1 \ 4 \ 3)^T$ ,  
 $a_2 = (-3 \ -1 \ -1 \ -3 \ -1)^T$ ,  
 $b_1 = (1 \ 2 \ 2 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $b_2 = (-1 \ -2 \ -1 \ 0 \ 0)^T$ ,  
 $b_3 = (2 \ 1 \ 1 \ 2 \ 1)^T$ .
6.  $a_1 = (1 \ 1 \ 3 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (1 \ 2 \ 5 \ 3 \ 5)^T$ ,  
 $b_1 = (2 \ -1 \ 0 \ -4 \ -5)^T$ ,  
 $b_2 = (-1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 7)^T$ ,  
 $b_3 = (1 \ -1 \ -1 \ -3 \ -4)^T$ .
7.  $a_1 = (3 \ 1 \ 2 \ 1 \ 1)^T$ ,  
 $a_2 = (3 \ -2 \ 1 \ 3 \ 2)^T$ ,  
 $b_1 = (1 \ -2 \ 1 \ 3 \ 0)^T$ ,  
 $b_2 = (-1 \ 1 \ 0 \ -1 \ -1)^T$ ,  
 $b_3 = (1 \ 1 \ 2 \ 2 \ -1)^T$ .
8.  $a_1 = (2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 3)^T$ ,  
 $a_2 = (-1 \ 1 \ -2 \ -1 \ 0)^T$ ,  
 $b_1 = (1 \ 2 \ 1 \ 0 \ 3)^T$ ,  
 $b_2 = (-1 \ 0 \ 2 \ 3 \ -1)^T$ ,  
 $b_3 = (0 \ 1 \ -1 \ -1 \ 1)^T$ .
9.  $a_1 = (1 \ 3 \ 4 \ 1 \ 3)^T$ ,  
 $a_2 = (2 \ -1 \ 3 \ 4 \ 1)^T$ ,  
 $b_1 = (3 \ -3 \ -3 \ 0 \ -6)^T$ ,  
 $b_2 = (-1 \ 1 \ 0 \ -1 \ 1)^T$ ,  
 $b_3 = (-1 \ -1 \ -1 \ 0 \ 0)^T$ .
10.  $a_1 = (1 \ 4 \ 2 \ 2 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (3 \ -1 \ 1 \ -2 \ 4)^T$ ,  
 $b_1 = (-1 \ -4 \ 1 \ -5 \ 7)^T$ ,  
 $b_2 = (2 \ 1 \ -1 \ 2 \ -4)^T$ ,  
 $b_3 = (-1 \ 1 \ 0 \ 1 \ -1)^T$ .
11.  $a_1 = (1 \ 4 \ 2 \ 2 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (3 \ -1 \ 1 \ -2 \ 4)^T$ ,  
 $b_1 = (-1 \ -4 \ 1 \ -5 \ 7)^T$ ,  
 $b_2 = (2 \ 1 \ -1 \ 2 \ -4)^T$ ,  
 $b_3 = (-1 \ 1 \ 0 \ 1 \ -1)^T$ .
12.  $a_1 = (1 \ 2 \ 3 \ 3 \ 1)^T$ ,  
 $a_2 = (-1 \ 2 \ 1 \ -1 \ -3)^T$ ,  
 $b_1 = (-2 \ -1 \ -3 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $b_2 = (1 \ 2 \ 3 \ 3 \ 1)^T$ ,  
 $b_3 = (-2 \ 1 \ -1 \ 1 \ 0)^T$ .
13.  $a_1 = (1 \ 3 \ -1 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (3 \ 1 \ -1 \ 5 \ 4)^T$ ,  
 $b_1 = (1 \ -2 \ 2 \ 4 \ -1)^T$ ,  
 $b_2 = (-2 \ 1 \ -1 \ -5 \ -1)^T$ ,  
 $b_3 = (1 \ -1 \ 1 \ 3 \ 0)^T$ .
14.  $a_1 = (1 \ 2 \ 1 \ 3 \ 1)^T$ ,  
 $a_2 = (-1 \ 1 \ 2 \ -2 \ -3)^T$ ,  
 $b_1 = (2 \ 1 \ -1 \ 1 \ 0)^T$ ,  
 $b_2 = (1 \ -1 \ -2 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $b_3 = (-1 \ 1 \ 2 \ 0 \ -1)^T$ .
15.  $a_1 = (2 \ 1 \ 2 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (1 \ -1 \ 2 \ 3 \ 3)^T$ ,  
 $b_1 = (-2 \ 3 \ 2 \ -6 \ -4)^T$ ,  
 $b_2 = (2 \ -1 \ 1 \ 2 \ 0)^T$ ,  
 $b_3 = (-1 \ 1 \ 0 \ -1 \ 1)^T$ .
16.  $a_1 = (1 \ 5 \ 2 \ 1 \ 3)^T$ ,  
 $a_2 = (2 \ -1 \ 0 \ -1 \ 2)^T$ ,  
 $b_1 = (-1 \ 10 \ 3 \ 4 \ 2)^T$ ,  
 $b_2 = (2 \ 1 \ 0 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $b_3 = (-1 \ 0 \ -1 \ 2 \ -2)^T$ .
17.  $a_1 = (1 \ 2 \ 4 \ 3 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (3 \ -1 \ 1 \ -2 \ 2)^T$ ,  
 $b_1 = (-1 \ 2 \ -2 \ -1 \ -4)^T$ ,  
 $b_2 = (1 \ -1 \ 0 \ -1 \ 1)^T$ ,  
 $b_3 = (2 \ -1 \ 1 \ -1 \ 2)^T$ .
18.  $a_1 = (1 \ 2 \ 3 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (-1 \ 2 \ -2 \ -4 \ -5)^T$ ,  
 $b_1 = (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1)^T$ ,  
 $b_2 = (-1 \ 0 \ -1 \ -1 \ -2)^T$ ,  
 $b_3 = (0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0)^T$ .
19.  $a_1 = (1 \ 3 \ 1 \ 5 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (-1 \ 2 \ -1 \ 0 \ 3)^T$ ,  
 $b_1 = (-1 \ -5 \ 2 \ -4 \ -7)^T$ ,  
 $b_2 = (1 \ 2 \ -1 \ 2 \ 3)^T$ ,  
 $b_3 = (-1 \ -1 \ 2 \ 0 \ -3)^T$ .
20.  $a_1 = (1 \ 3 \ 1 \ 2 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (3 \ -1 \ 1 \ -2 \ 4)^T$ ,  
 $b_1 = (1 \ 3 \ -1 \ 4 \ 0)^T$ ,  
 $b_2 = (-1 \ -1 \ 1 \ -2 \ 0)^T$ ,  
 $b_3 = (1 \ -1 \ 2 \ -3 \ 3)^T$ .
21.  $a_1 = (3 \ 5 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (1 \ -2 \ -1 \ -3)^T$ ,  
 $b_1 = (1 \ -1 \ 2 \ -2)^T$ ,  
 $b_2 = (-2 \ 1 \ -1 \ 3)^T$ ,  
 $b_3 = (1 \ 0 \ 2 \ -1)^T$ .
22.  $a_1 = (1 \ 2 \ 3 \ 1 \ 2)^T$ ,  
 $a_2 = (2 \ -1 \ -1 \ 0 \ -3)^T$ ,  
 $b_1 = (1 \ 1 \ -1 \ -2 \ -2)^T$ ,  
 $b_2 = (-1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 2)^T$ ,  
 $b_3 = (1 \ -2 \ 0 \ 2 \ -1)^T$ .

$$\begin{aligned} 23. \quad a_1 &= (1 \ 2 \ 3 \ -1 \ 4)^T, \\ a_2 &= (1 \ 2 \ -1 \ 3 \ 0)^T, \\ b_1 &= (2 \ -1 \ -1 \ 0 \ 1)^T, \\ b_2 &= (1 \ -1 \ 1 \ -2 \ 2)^T, \\ b_3 &= (-2 \ 1 \ -1 \ 2 \ -3)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24. \quad a_1 &= (2 \ -3 \ 1 \ -1 \ 2)^T, \\ a_2 &= (-1 \ -1 \ 2 \ -2 \ 1)^T, \\ b_1 &= (1 \ -1 \ 2 \ -1 \ 1)^T, \\ b_2 &= (4 \ -3 \ 1 \ 0 \ 2)^T, \\ b_3 &= (3 \ -1 \ 2 \ 0 \ 1)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25. \quad a_1 &= (1 \ 2 \ 0 \ -1 \ 1)^T, \\ a_2 &= (1 \ -2 \ -2 \ 1 \ 0)^T, \\ b_1 &= (1 \ 3 \ 3 \ -1 \ 2)^T, \\ b_2 &= (3 \ 3 \ 1 \ -1 \ 1)^T, \\ b_3 &= (2 \ 1 \ 1 \ 0 \ 2)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 26. \quad a_1 &= (-1 \ -1 \ -1 \ 0 \ 0)^T, \\ a_2 &= (2 \ -1 \ 3 \ 4 \ 1)^T, \\ b_1 &= (1 \ 3 \ 4 \ 1 \ 3)^T, \\ b_2 &= (-1 \ 1 \ 0 \ -1 \ 1)^T, \\ b_3 &= (3 \ -3 \ -3 \ 0 \ -6)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 27. \quad a_1 &= (2 \ 1 \ -1 \ 1 \ -1)^T, \\ a_2 &= (2 \ 1 \ 3 \ -1 \ -1)^T, \\ b_1 &= (7 \ 4 \ 2 \ 0 \ -2)^T, \\ b_2 &= (4 \ 2 \ 2 \ 0 \ -2)^T, \\ b_3 &= (1 \ 1 \ 1 \ -1 \ 1)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28. \quad a_1 &= (1 \ 1 \ 0 \ -1 \ 1)^T, \\ a_2 &= (2 \ -1 \ 1 \ 0 \ -1)^T, \\ b_1 &= (5 \ 0 \ -2 \ 1 \ 2)^T, \\ b_2 &= (1 \ 2 \ -4 \ 1 \ 4)^T, \\ b_3 &= (3 \ -2 \ -2 \ 3 \ 0)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 29. \quad a_1 &= (2 \ 5 \ -5 \ 7 \ -4)^T, \\ a_2 &= (1 \ 3 \ -4 \ 5 \ -3)^T, \\ b_1 &= (1 \ 1 \ 2 \ -1 \ 1)^T, \\ b_2 &= (1 \ 2 \ -1 \ 2 \ -1)^T, \\ b_3 &= (3 \ 5 \ 0 \ 3 \ -1)^T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 30. \quad a_1 &= (3 \ -2 \ 1 \ 2 \ -1)^T, \\ a_2 &= (1 \ -1 \ 0 \ 3 \ -1)^T, \\ b_1 &= (3 \ 0 \ 3 \ -1 \ 1)^T, \\ b_2 &= (2 \ -1 \ 1 \ -1 \ 0)^T, \\ b_3 &= (1 \ 1 \ 2 \ 0 \ 1)^T. \end{aligned}$$

## Использованная литература

Афанасьева С.С., Гортинская Л.В., Рыжков А.Е., Трифанов А.И. Типовой расчет «Линейная алгебра». 3 модуль. Учебно-методическое пособие. СПб: Университет ИТМО, 2014.

Гайфуллин А.А., Пенской А.В., Смирнов С.В. Задачи по линейной алгебре и геометрии. МЦНМО, 2014. 150 с.

Гортинская Л.В., Лапин И.А., Рыжков А.Е., Смирнов В.П., Трифанов А.И. Типовой расчет «Линейная алгебра». 2 модуль. Учебно-методическое пособие. СПб: НИУ ИТМО, 2012. 40 с.

Кузнецова С.Н., Лукина М.В., Милованович Е.В. Типовые расчеты для студентов экономических специальностей. I курс (модуль 1-2). Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Учебно-методическое пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 48 с.