

# Конспект лекций по геометрии, ПИ, 2 семестр Лекции

Собрано 26 февраля 2022 г. в 21:08

---

## Содержание


<b>1. Аналитическая геометрия</b>	<b>1</b>
1.1. Системы координат . . . . .	1
1.1.1. Аффинные системы координат . . . . .	1
1.1.2. Криволинейные системы координаты . . . . .	2
1.1.3. Параметризации . . . . .	2
1.2. Понятие вектора . . . . .	3
1.3. Сложение и умножение на число . . . . .	3
1.4. ЛЗ, ЛНЗ, Базис, размерность . . . . .	4
1.5. Скалярное умножение . . . . .	4
1.6. Векторное умножение . . . . .	6

# Раздел #1: Аналитическая геометрия

## 1.1. Системы координат


### 1.1.1. Аффинные системы координат

**Def 1.1.1.** Аффинной системой координат на прямой называется взаимно-однозначное соответствие  $l \longleftrightarrow \mathbb{R}$ .



Она определяется выбором точки  $O$  и выбором вектора  $\bar{e}$ .  $АСК = \{O, \{\bar{e}\}\}$ .

**Def 1.1.2.** АСК на плоскости называется биекция  $\pi \longleftrightarrow \mathbb{R}^2$ .



Она определяется выбором точки  $O$  и векторов  $\bar{e}_1, \bar{e}_2 \neq \bar{0}, \bar{e}_1 \nparallel \bar{e}_2$ .  $АСК = \{O, \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}\}$ .


**Def 1.1.3.** Если  $|\bar{e}_1| = |\bar{e}_2| = 1, \bar{e}_1 \perp \bar{e}_2$ , то АСК называется декартовой системой координат.

**Def 1.1.4.** АСК в пространстве называется биекция  $M \longleftrightarrow \mathbb{R}^3$ . Она определяется выбором точки  $O$  и векторов  $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3 \neq \bar{0}$  – не компланарны.  $АСК = \{O, \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}\}$ .

**Def 1.1.5.** Упорядоченная тройка векторов  $(\bar{u}, \bar{v}, \bar{w})$  называется **правой**, если из конца вектор  $\bar{w}$  поворот то  $\bar{u}$  к  $\bar{v}$  по наименьшему углу выглядит происходящим против часовой стрелки, и **левой** – в противном случае.

### 1.1.2. Криволинейные системы координаты

**Def 1.1.6.** Выберем точку  $O$  и построим из неё луч  $p$ , который назовем полярной осью. Возьмем теперь произвольную точку  $M$  на плоскости и измерим две величины: расстояние от  $M$  до  $O$  и угол между вектором  $\overrightarrow{OM}$  и полярной осью. Обозначим расстояние за  $r$ , а угол за  $\varphi$ . Тогда, чтобы избежать неоднозначности, будем считать, что  $r > 0, \varphi \in [0, 2\pi)$ , и если  $r = 0$ , то  $\varphi = 0$ . Такая система координат называется **полярной**.



**Def 1.1.7.** Полярная система координат, где  $r \in \mathbb{R}, \varphi \in \mathbb{R}$ , то она называется обобщенной полярной системой координат.





Рис. 1: Координатная сеть полярной системы координат

**Def 1.1.8.** Цилиндрической системой координат называют трёхмерную систему координат, являющуюся расширением полярной системы координат путём добавления третьей координаты (обычно обозначаемой  $z$ ), которая задаёт высоту точки над плоскостью.

**Def 1.1.9.** Сферическая система координат — трёхмерная система координат, в которой каждая точка пространства определяется тремя числами, где  $r$  — расстояние до начала координат, а  $\theta$  и  $\varphi$  — зенитный и азимутальный углы соответственно.

### 1.1.3. Параметризации

Построим декартову систему координат. Теперь возьмем какую-то новую систему координат  $x', y', z'$ . Проведем через  $x', y'$  плоскость. Если  $z'$  не совпадает с  $z$ , то эта плоскость пересекает



плоскость  $(x, y)$  по какой-то прямой. Отсчитывает от вектора  $x$  до этой прямой угол  $\varphi$ . Угол между  $z$  и  $z'$  обозначим за  $\psi$ . Теперь, мы можем эту прямую поворачивать вокруг оси  $z'$  на угол  $\delta$ , пока она не совпадет с  $x'$ .

Таким образом, мы совместили исходную систему координат с новой СК. То есть мы построили соответствие между  $(\psi, \varphi, \delta)$ .

## 1.2. Понятие вектора

Пусть  $E$  – евклидово пространство.

**Def 1.2.1.** *Закрепленный вектор – упорядоченная пара точек в евклидовом пространстве. Обозначение:  $\overrightarrow{AB}$ , модуль  $|\overrightarrow{AB}|$  – расстояние между точками  $A$  и  $B$ .*

**Def 1.2.2.** *Пусть  $\{(A, B), A, B \in E\}$  – множество закрепленных векторов. Введём на нём отношение равенства:  $(A, B) = (C, D) \Leftrightarrow$ :*

1.  $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$
2.  $(A, B) \parallel (C, D)$  либо совпадают.
3.  $\overrightarrow{AB} \uparrow \overrightarrow{CD}$ .

*Замечание 1.2.3.*  $\forall A, B \rightarrow (A, A) = (B, B)$ .

*Утверждение 1.2.4.* Отношение, введённое в прошлом определении – отношение эквивалентности.

*Доказательство.* 1. Рефлексивность:  $(A, B) = (A, B)$  – верно.

2. Симметричность – очевидно.

3. Транзитивность:  $(A, B) = (C, D), (C, D) = (F, G) \Rightarrow (A, B) = (F, G)$  – верно.

Значит множество закрепленных векторов разбивается на классы эквивалентности. ■

**Def 1.2.5.** *Класс эквивалентности называется свободным вектором.*

## 1.3. Сложение и умножение на число

Пусть  $\bar{a}, \bar{b} \in V$  – классы.

**Def 1.3.1.** *Сложение векторов:  $V \times V \rightarrow V$ .  $[\overrightarrow{OO''}] = \bar{a} + \bar{b}$*

**Def 1.3.2.** Пусть  $\bar{a} \in V, \lambda \in \mathbb{R}$ . Умножение на число на число:  $\mathbb{R} \times V \rightarrow V$ .

$(V, +, \cdot)$ . Свойства:

1.  $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V \quad \bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$ .
2.  $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V \quad (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c})$ .
3.  $\exists \bar{0} : \forall \bar{a} \quad \bar{a} + \bar{0} = \bar{0} + \bar{a} = \bar{a}$ .
4.  $\forall \bar{a} \quad \exists -\bar{a} : \bar{a} + (-\bar{a}) = \bar{0}$ .
5.  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \bar{a}, \bar{b} \in V \quad \lambda(\bar{a} + \bar{b}) = \lambda\bar{a} + \lambda\bar{b}$ .
6.  $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \bar{a} \in V \quad (\lambda + \mu)\bar{a} = \lambda\bar{a} + \mu\bar{a}$ .
7.  $\forall \bar{a} \in V \quad 1 \cdot \bar{a} = \bar{a}$ .
8.  $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \bar{a} \in V \quad \lambda(\mu\bar{a}) = (\lambda\mu)\bar{a}$ .

**Def 1.3.3.** Множество  $(V, +, \cdot)$ , удовлетворяющее свойствам 1-8, называется **векторным пространством**. Элементы – векторы.

## 1.4. ЛЗ, ЛНЗ, Базис, размерность

**Def 1.4.1.**  $\lambda_1\bar{a}_1 + \dots + \lambda_n\bar{a}_n$  – линейная комбинация. Если  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$  – нетривиальная ЛК.

**Def 1.4.2.**  $\{\bar{a}_i\}_{i=1}^n$  – линейно зависимый, если  $\exists$  нетривиальная ЛК  $\{\lambda_i\}_{i=1}^n : \sum_{i=1}^n \lambda_i\bar{a}_i = 0$

**Def 1.4.3.**  $\{\bar{a}_i\}_{i=1}^n$  – ЛНЗ, если он не ЛЗ.

Свойства:

1.  $\{\bar{a} \neq \bar{0}\}$  – ЛНЗ.
2.  $\{\bar{0}\}$  – ЛЗ.
3.  $\{\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n, \bar{0}\}$  – ЛЗ.
4. Пусть  $\{\bar{a}_i\}$  – ЛЗ. Тогда  $\{\bar{a}_i, \bar{a}_j\}_{i=1, j=1}^{n, m}$  – ЛЗ.

**Def 1.4.4.**  $\{\bar{a}_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  – ЛЗ, если в нем  $\exists$  ЛЗ конечный поднабор.

**Def 1.4.5.** ЛНЗ – набор, который не является ЛЗ.

**Def 1.4.6.**  $\{\bar{a}_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  – полный, если  $\forall \bar{v} \in V \quad \exists \{\alpha_i\}_{i=1}^n, \{\lambda_i\}_{i=1}^n \quad \bar{v} = \lambda_1\bar{a}_{\alpha_1} + \dots + \lambda_n\bar{a}_{\alpha_n}$ .

**Def 1.4.7.**  $\{\bar{a}_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  – базис  $V$ , если он полный и ЛНЗ.

**Def 1.4.8.** Размерность  $V$  ( $\dim V$ ) – мощность базиса.

**Def 1.4.9.** Векторное пространство  $V$  называется конечномерным, если  $\exists$  конечный полный набор.

## 1.5. Скалярное умножение

Будем определять скалярное произведение для элементов векторного пространства  $V$ .

**Def 1.5.1.**  $(\bar{a}, \bar{b})$  – скалярное произведение:  $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$

Свойства:

1. Свойства 1-8, необходимые для существования векторного пространства.
2.  $\forall \bar{a} \in V \quad (\bar{a}, \bar{a}) \geq 0$  – положительная определённость.  
Кроме того,  $(\bar{a}, \bar{a}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0}$  – невырожденность.
3.  $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V \quad (\bar{a} + \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{a}, \bar{c}) + (\bar{b}, \bar{c})$  – аддитивность.  
 $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \bar{a}, \bar{b} \in V \quad (\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda(\bar{a}, \bar{b})$  – однородность.
4.  $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V \quad (\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{a})$ . – коммутативность.

**Пример 1.5.2.**  $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}\}$

$\bar{v} = (x_1, \dots, x_n), \bar{w} = (y_1, \dots, y_n)$

Тогда скалярное произведение:  $(\bar{v}, \bar{w}) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$ .

Проверим свойства:

1.  $(\bar{v}, \bar{v}) = x_1^2 + \dots + x_n^2 \geq 0$ .  
 $(\bar{v}, \bar{v}) = 0 \Leftrightarrow \forall i \quad x_i = 0$ .
2. Пусть  $\bar{z} = (z_1, \dots, z_n)$ , тогда  $(\bar{v} + \bar{w}, \bar{z}) = (x_1 + y_1)z_1 + \dots + (x_n + y_n)z_n = x_1 z_1 + \dots + x_n z_n + y_1 z_1 + \dots + y_n z_n = (\bar{v}, \bar{z}) + (\bar{w}, \bar{z})$ .  
 $(\lambda \bar{v}, \bar{w}) = \lambda x_1 y_1 + \dots + \lambda x_n y_n = \lambda(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n) = \lambda(\bar{v}, \bar{w})$ .
3.  $(\bar{v}, \bar{w}) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = y_1 x_1 + \dots + y_n x_n = (\bar{w}, \bar{v})$ .

**Пример 1.5.3.**  $C[0, 1]$  – непрерывные функции на отрезке  $[0, 1]$ .

Пусть  $f, g, q \in C[0, 1]$  – функции:  $(f, g) = \int_0^1 f g dx$ .

1.  $(f, f) = \int_0^1 f^2 dx \geq 0$ .  
 $(f, f) = 0 \Leftrightarrow f = 0$ .
2.  $(f + q, g) = \int_0^1 (f + q)g dx = \int_0^1 (fg + qg) dx = \int_0^1 fg dx + \int_0^1 qg dx = (f, g) + (q, g)$ .  
 $(\lambda f, g) = \int_0^1 \lambda f g dx = \lambda \int_0^1 f g dx = \lambda(f, g)$ .
3.  $(f, g) = \int_0^1 f g dx = \int_0^1 g f dx = (g, f)$ .

Таким образом, это скалярное произведение непрерывных на  $[0, 1]$  функций.

Пусть есть конечномерное векторное пространство  $V$ , на нём задано скалярное произведение  $(\cdot, \cdot)$ , выберем базис векторного пространства  $\{\bar{e}_i\}$ , рассмотрим векторы  $\bar{v} = (x_i), \bar{w} = (y_i)$ , тогда их скалярное произведение  $(\bar{v}, \bar{w}) = (x_1 \bar{e}_1 + \dots + x_n \bar{e}_n, y_1 \bar{e}_1 + \dots + y_n \bar{e}_n)$ , т.е.

$$(\bar{v}, \bar{w}) = \sum_{i,j}^n x_i y_j (\bar{e}_i, \bar{e}_j)$$

Либо же запись вида:

$$(\bar{v}, \bar{w}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_1, \bar{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\bar{e}_n, \bar{e}_1) & (\bar{e}_n, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

где  $G = ((\bar{e}_i, \bar{e}_j)), 1 \leq i \leq j \leq n$  – матрица Грама скалярного произведения.

Тогда скалярное произведение можно записать в следующем виде:  $(\bar{v}, \bar{w}) = \bar{v}^T G \bar{w}$ .

В силу коммутативности скалярного произведения  $G^T = G$ .

**Теорема 1.5.4** (Критерий Сильвестра).

$$\forall k = 1, \dots, n \quad \det(G_k) > 0$$

где  $G_n$  – миноры главной диагонали.

**Утверждение 1.5.5.** Если взять  $R^n, G$ , то  $G$  – матрица Грама  $\Leftrightarrow G^T = G$ , которая удовлетворяет критерию Сильвестра.

**Def 1.5.6.** Если базис обладает свойством:  $(e_i, e_j) = \begin{cases} 1, i \neq j \\ 1, i = j \end{cases} \Rightarrow G = E$ , тогда он называется ортонормированным базисом (ОРБ).

**Теорема 1.5.7** (Теорема Грама-Шмидта). В  $\forall V^n$  со скалярным произведением  $(,)$   $\exists$  ОНБ.

**Def 1.5.8.**  $V$  – векторное пространство,  $(,)$  – скалярное произведение на нём, тогда **модуль (длина)**  $|\bar{a}| = \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})}$ ,  $|\bar{a}| = 0 \Leftrightarrow \bar{a} = 0$ .

**Def 1.5.9.** Величина угла между векторами – число  $\alpha \in [0; \pi] \in R : \cos \alpha = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}||\bar{b}|}$ ,  $\bar{a} \neq 0, \bar{b} \neq 0$ .

**Теорема 1.5.10** (Неравенство Коши-Буняковского).

$$(\bar{a}, \bar{b})^2 \leq \bar{a}^2 \bar{b}^2$$


**Доказательство.** По свойству скалярного произведения  $(\bar{a} + t\bar{b})^2$  всегда невырожденная величина, т.е.  $(\bar{a} + t\bar{b})^2 \geq 0 \Rightarrow \bar{a}^2 + 2t(\bar{a}, \bar{b}) + t^2\bar{b}^2 \geq 0$ , тогда его дискриминант не положительный, т.к.  $t$  – любое число, то

$$(\bar{a}, \bar{b})^2 - \bar{a}^2 \bar{b}^2 \leq 0 \Rightarrow (\bar{a}, \bar{b})^2 \leq \bar{a}^2 \bar{b}^2$$

.

## 1.6. Векторное умножение

Векторное умножение определяется только для трёхмерного пространства  $V^3$ , кроме того, необходимо, чтобы пространство было ориентированным, выберем в нём правый ОНБ  $(\bar{i}, \bar{j}, \bar{k})$ .



**Def 1.6.1.** Пусть  $\bar{v} = (x_1, x_2, x_3)$ ,  $\bar{w} = (y_1, y_2, y_3)$ . Тогда **векторное произведение**

$$\bar{v} \times \bar{w} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = \bar{i}(x_2 y_3 - x_3 y_2) - \bar{j}(x_3 y_1 - x_1 y_3) + \bar{k}(x_1 y_2 - x_2 y_1).$$

Свойства:

1.  $\bar{v} \times \bar{w} = -\bar{w} \times \bar{v}$  – косокоммутативность.

2.  $\bar{v} \times \bar{v} = \bar{0}$ .

3.  $(\bar{v} + \bar{w}) \times \bar{z} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 + y_1 & x_2 + y_2 & x_3 + y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = \bar{v} \times \bar{z} + \bar{w} \times \bar{z}$  – аддитивность.

4.  $(\lambda \bar{v}) \times \bar{w} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \lambda x_1 & \lambda x_2 & \lambda x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = \lambda \bar{v} \times \bar{w}$ .

5.  $\bar{v} \times \bar{w} \perp \bar{v}, \bar{w}$

$$(\bar{v}, \bar{v} \times \bar{w}) = \left( \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}, \bar{v} \right) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = 0.$$

6.  $\bar{v} \times \bar{w} = 0 \Leftrightarrow \bar{v} \parallel \bar{w}$

$$(\bar{v}, \bar{w}, \bar{v} \times \bar{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ (x_2 y_3 - x_3 y_2) & (x_3 y_1 - x_1 y_3) & (x_1 y_2 - x_2 y_1) \end{vmatrix} = (x_2 y_3 - x_3 y_2)^2 + (x_3 y_1 - x_1 y_3)^2 + (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2 \geq 0 \Rightarrow (\bar{v}, \bar{w}, \bar{v} \times \bar{w}) = 0 \Leftrightarrow \frac{x_2}{y_2} = \frac{x_3}{y_3}, \frac{x_3}{y_3} = \frac{x_1}{y_1}, \frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} \Rightarrow \frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = \frac{x_3}{y_3}.$$

7.  $\bar{v} \nparallel \bar{w} \Rightarrow (\bar{v}, \bar{w}, \bar{v} \times \bar{w})$  – правая.

8.  $\bar{i} \times \bar{j} = \bar{k}$ . Получим таблицу умножения:  $i \rightarrow j, j \rightarrow k, k \rightarrow i$ .


9.  $(\bar{a} \times \bar{b})^2 = (x_2 y_3 - y_2 x_3)^2 + (\dots)^2 + (\dots)^2$

$$\bar{a}^2 \bar{b}^2 - (\bar{a} \bar{b})^2 = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) - (x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3)^2$$

$$(\bar{a} \times \bar{b})^2 = \bar{a}^2 \bar{b}^2 - (\bar{a} \bar{b})^2 - \text{упражнение.}$$

$$\bar{a}^2 \bar{b}^2 - (\bar{a} \bar{b})^2 = S^2 = |\bar{a}|^2 |\bar{b}|^2 \sin^2 \alpha = a^2 b^2 (1 - \cos^2 \alpha) = \bar{a}^2 \bar{b}^2 - (\bar{a} \bar{b})^2, \text{ т.к. } \cos^2 \alpha = \frac{(a, b)^2}{|a||b|}.$$

Следствие:  $|\bar{a}| = |\bar{b}| = 1, (\bar{a}, \bar{b}) \Rightarrow |\bar{a} \times \bar{b}| = 1$ .



Рассмотрим  $V^3$ , фиксируем ОНБ  $(\bar{i}, \bar{j}, \bar{k})$ , зададим векторное произведение  $\times : V \times V \rightarrow V$ .

Выберем  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$  – правый ОНБ, таким образом, если взять любой ОНБ, можно получить таблицу умножения:  $a \rightarrow b, b \rightarrow c, c \rightarrow a$ .

$$\begin{aligned} \bar{v} &= (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3), \bar{w} = (\mu_1, \mu_2, \mu_3) \Rightarrow \bar{v} \times \bar{w} = (\lambda_1 \bar{a} + \lambda_2 \bar{b} + \lambda_3 \bar{c}) \times (\mu_1 \bar{a} + \mu_2 \bar{b} + \mu_3 \bar{c}) = \\ &= \lambda_1 \mu_1 \bar{a} \times \bar{a} + \lambda_1 \mu_2 \bar{a} \times \bar{b} + \lambda_1 \mu_3 \bar{a} \times \bar{c} + \lambda_2 \mu_1 \bar{b} \times \bar{a} + \lambda_2 \mu_2 \bar{b} \times \bar{b} + \lambda_2 \mu_3 \bar{b} \times \bar{c} + \lambda_3 \mu_1 \bar{c} \times \bar{a} + \lambda_3 \mu_2 \bar{c} \times \bar{b} + \lambda_3 \mu_3 \bar{c} \times \bar{c} = \\ &= \bar{c}(\lambda_1 \mu_2 - \lambda_2 \mu_1) - \bar{b}(\lambda_1 \mu_3 - \lambda_3 \mu_1) + \bar{a}(\lambda_2 \mu_3 - \lambda_3 \mu_2) = \begin{vmatrix} \bar{a} & \bar{b} & \bar{c} \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$