Pacient 1 r.č. 123456/1111 poj.
tel.

Propouštěcí zpráva

Hospitalizace: 2 dny

RA: onkolog. negativní

EA: negativní

SA:

FA: NOLPAZA, TBL ENT, 40MG, p.o., 1-0-1 nalačno
MILURIT, TBL NOB, 100MG, p.o., 1-0-0
LETROX, TBL NOB, 100MCG, p.o., 1-0-0 nalačno
TANTUM VERDE, GGR, 1,5MG/ML, p.o., 1-1-1
ONIREX, TBL FLM, 10MG, p.o., 0-0-0-1
DEGAN, TBL NOB, 10MG, p.o., 1-1-1 při nevolnosti
NOVETRON tbl 8mg p.o. 1-0-1 při silnější nevolnosti,
KREON 25000 TBL, p.o. 1-1-1

GA: menopausa

Abusus: neguje, alkohol málo, jen přílež.

ALERGIE: neguje

CAVE: Handicap:(zrak)

Status praesens:

Subj. dobře, bez bolestí, chuť k jídlu má, bez nauzey, dýchání dobré, kašel není, stolice a mikce v normě bez patologické příměsi, stenokardie či palpitace neguje

Obj. orientovaná, řeč srozumitelná, na dotazy odpovídá přiléhavě, spolupracující,normostenická, **KŮŽE:** bez ikteru, cyanosy, turgor v normě **NEUROLOGICKY**: Bez lateralizace, **HLAVA A KRK:** Hlava na poklep a pohmat nebolestivá,výstupy n. trigeminus nebolestivé, zornice izokorické, bulby pohyblivé všemi směry,bez nystagmu, jazyk plazí středem,sliznice klidné
PLÍCE: Dýchání sklípkové, bez vedlejších poslechových fenoménů. **SRDCE:** AS pravidelná, ozvy ohraničené **BŘICHO:** V niveau - měkké, prohmatné, aperitoneální, peristaltika +, játra a slezinu nehmatám. **DKK** - bez otoku, metličkové varixy PER RECTUM: neindikuji

Vyšetření:

Lab. nález:
Ionty:
Draslík_S/P: 3,8 mmol/L [3,5 ... 5,1]
Renální funkce:
Kreatinin_S/P: 62 µmol/L [46 ... 92]
eGF z kreatininu_Q: 1,56 mL/s [1,00 ... 2,35]
Jaterní funkce:
ALT_S/P: 0,50 µkat/L [0,17 ... 0,75]
AST_S/P: 0,35 µkat/L [0,25 ... 0,58]
GGT_S/P: 0,56 µkat/L [0,17 ... 1,25]
ALP_S/P: **1,76** µkat/L [0,58 ... 1,75]
Bilirubin celkový_S/P: **3,3** µmol/L [5,0 ... 25,0]
Diabetes mellitus:
Glukóza_S/P: 5,26 mmol/L [3,60 ... 5,59]
Markery zánětu:
C reaktivní protein_S/P: 0,9 mg/L [0,0 ... 5,0]
Krevní obraz:
Leukocyty: 4,51 10^9/L [4,00 ... 10,00]
Neutrofily_analyzátor: **44,1** % [45 ... 70]
Lymfocyty_analyzátor: 33,7 % [20 ... 45]
Monocyty_analyzátor: **18,0** % [2 ... 12]
Eozinofily_analyzátor: 1,8 % [0 ... 5]
Bazofily_analyzátor: **2,4** % [0 ... 2]
Neutrofily-absolutní počet: **1,99** 10^9/L [2,00 ... 7,00]
Lymfocyty-absolutní počet: 1,52 10^9/L [0,80 ... 4,00]
Monocyty-absolutní počet: 0,81 10^9/L [0,08 ... 1,20]
Eozinofily_absolutní počet: 0,08 10^9/L [0,00 ... 0,50]
Bazofily_absolutní počet: 0,11 10^9/L [0,00 ... 0,20]

Propouštěcí zpráva - pokračování

Erytrocyty: 4,03 10^12/L [3,80 ... 5,20]
Hemoglobin: **111** g/L [120 ... 160]
Hematokrit: **0,337** - [0,350 ... 0,470]
MCV: 84 fL [82 ... 98]
RDW: **15,8** % [10 ... 15.2]
Trombocyty: 247 10^9/L [150 ... 400]
MPV: 9,5 fL [7,8 ... 12,8]
MCH: 28 pg [28 ... 34]
MCHC: 329 g/L [320 ... 360]
Komentář KO_DIF analyzátor: text

Systémová léčba:

3. cyklus adjuvantní chemoterapie FLOT
- Docetaxel 50 mg /m2 den 1
- Oxaliplatina 85 mg/m2, i.v., 120 min., den 1.
- Leukovorin 200 mg/m2, i.v., 120 min., den 1.
- 5-fluorouracil 2600 mg/m2, i.v., kontin.infuze 24hod.

- opakování co 2 týdny
- s prim profylaxí Zarzio dny 6,7
- aproximace na těl. povrch 2m2, redukce na 80%pro hematologickou toxicitu

Ostatní terapie:

DEGAN, TBL NOB, 10MG; EUTHYROX, TBL NOB, 100MCG; FORTECORTIN, TBL NOB, 4MG; KREON, CPS ETD, 25000U; LETROX, TBL NOB, 100MCG; MILURIT, TBL NOB, 100MG; NOLPAZA, TBL ENT, 40MG; NOVETRON, POR TBL DIS, 8MG; ONIREX, TBL FLM, 10MG; TANTUM VERDE, GGR, 1,5MG/ML; FORTECORTIN, TBL NOB, 4MG; CHT dle rozpisu

Průběh hospitalizace:

Pacient s adenokacinomem žaludku, přijata plánovaně ke 3. cyklu adjuvantní chemoterapie FLOT s profylaxí RF Zarzio. Za hospitalizace aplikace cyklu chemoterapie bez komplikací. Pacientka terapii toleruje bez obtíží. Pacient dimise schopný. Při dimisi afebrilní, KP kompenzovaná.

Diagnostický souhrn:

Adenoca žaludku, cT4aN0M0
- 3/26 gastro+histo: adenoCa G3; DPYD wt
- 4/26 CT: TU zesílení stěny antra žaludku, bez meta
- MDT: k neadjuvantní perioperační CHT
- 5.5.26 zaveden PICC
- **stp 1. cyklu neoadj. FLOT 80%R od 5.5.26**
- **stp 2. cyklu neoadj. FLOT 90%R od 19.5.26**
- **stp 3. cyklu neoadj. FLOT 90%R od 2.6.26**
- **stp 4. cyklu neoadj. FLOT 80%R od 23.6.26** (pro hematol.toxicitu)
- **CT 29.6.26:** žaludek bez patrné presvědčivé lož. změny, plice bez ložisek, játra bez lézí, bez patol LU paraaortálně ani v pánvi
- Subtotální resekce žaludku (Roux-Y rekonstrukce) **ypT3 ypN3b**

H: adenoca Gx, R0, angioinvaze - ne, perineurální šíření - ano, lymfangioinvaze - ano, LU 24/19
- **st.p. 1. cyklu adjuvantní FLOT 80%R od 1.9.26 s profyl. RF Zarzio D6,7**
- **st.p. 2. cyklu adjuvantní FLOT 80%R od 14.9.26 s profyl. RF Zarzio D6,7**
- **st.p. 3. cyklu adjuvantní FLOT 80%R od 1.10.26 s profyl. RF Zarzio D6,7**

Další diagnózy:

hypothyreosa, dna, stp. CHCE

Doporučení:

Pacienta propouštíme do péče ošetřujícího praktického lékaře, odborných ambulancí a naší ambulance. Pacient je dimise schopen, odvoz vlastní za doprovodu rodiny.
Při potížích doporučujeme kontrolu u ošetřujícího praktického lékaře nebo v odborných ambulancích dle charakteru potíží, pacient poučen.

Pacient byl poučen o vhodném dietním režimu, nutnosti dostatečné hydratace, přiměřené tělesné zátěži, o doporučené chronické medikaci a režimových opatřeních - zejména vyhýbání se kontaktu s prostředím, kde hrozí vyšší riziko infekce.

r.č.

Propouštěcí zpráva - pokračování

Při teplotách nad 38°C neustupujících po Paralenu kontrola na ambulanci ihned nebo telefonicky konzultace. Při průjmu užít Smectu či Imodium, při nevolnostech a zvracení do medikace Degan, Novetron/Zofran. Při potížích doporučujeme kontrolu u ošetřujícího praktického lékaře nebo v odborných ambulancích dle charakteru potíží, pacient poučen.

Dne 6.10. a 7.10.26 aplikovat ZARZIO 48 MIU podkožně ve večerních hodinách (19h.) - vydány z odd. 2ks
Doma uchovat v lednici,před podáním ponechat 15 minut při pokojové teplotě, při bolesti kloubů, svalů možno užít 1tbl Paralenu. (poučena)

Dne posun na přání pacientky po domluvě se staniční lékařkou, ráno odběr KO+diff, biochem, CRP a poté dle stavu a lab. hospitalizace ke 4. cyklu adj. chemoterapie FLOT s profyl. RF.

Proplachy PICC katetru dle kartičky (co 7-10 dní)

Restage CT H+B+P obj. v FNO CT1. Zatím bez žádanky

Doporučená medikace:

NOLPAZA, TBL ENT, 40MG, p.o., 1-0-1 nalačno
MILURIT, TBL NOB, 100MG, p.o., 1-0-0
LETROX, TBL NOB, 100MCG, p.o., 1-0-0 nalačno
TANTUM VERDE, GGR, 1,5MG/ML, p.o., 1-1-1
ONIREX, TBL FLM, 10MG, p.o., 0-0-0-1
DEGAN, TBL NOB, 10MG, p.o., 1-1-1 při nevolnosti
NOVETRON tbl 8mg p.o. 1-0-1 při silnější nevolnosti,
KREON 25000 TBL, p.o. 1-1-1

Datum a čas: