



GUÍA PRÁCTICA

Plantas Medicinales

para el Sistema Digestivo

Fichas de plantas · Recetas · Glosario



Una palabra antes de empezar

Gracias por haber formado parte de este taller. Para mí, cada encuentro es una oportunidad de compartir algo que me apasiona profundamente: el mundo de las plantas medicinales, su historia, su ciencia, y el vínculo que podemos construir con ellas en nuestra vida cotidiana.

Esta guía es un regalo para llevarte a casa. La pensé como un material de consulta: podés volver a ella cuando tengas una duda, cuando quieras preparar una infusión, o simplemente cuando sientas curiosidad por saber un poco más sobre alguna planta.

En esta guía vas a encontrar fichas detalladas de cada planta que vimos en el taller, con sus indicaciones, contraindicaciones y formas de uso. También un glosario con los términos más importantes, porque creo que entender el lenguaje de la salud es el primer paso para cuidarnos mejor. Y por supuesto, las recetas: la infusión antináuseas, el Amargo Aperitivo y el vinagre fermentado de lavanda. Y un apartado especial sobre tinturas madre para las que quieran profundizar un poco más.

Toda la información de las fichas está basada en evidencia científica disponible y en fuentes de referencia en fitoterapia. No es magia ni intuición: son plantas con historia, con principios activos identificados y con mecanismos de acción estudiados. Eso no significa que sean inofensivas, por eso también vas a encontrar las contraindicaciones y precauciones de cada una.

Espero que lo disfrutes, que te sea útil, y que estas plantas se conviertan en aliadas de tu bienestar.

Con cariño,

Ayelén

Mburucuya.hierbas

El sistema digestivo

Un recorrido en simple

El sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados de transformar los alimentos en nutrientes que el cuerpo puede absorber y usar. El recorrido empieza en la boca y termina en el intestino grueso.

Boca	Primer punto de contacto. La masticación rompe el alimento en trozos más pequeños y la amilasa salival comienza a digerir los hidratos de carbono.
Esófago	Tubo muscular que transporta el alimento desde la boca hasta el estómago mediante movimientos peristálticos.
Estómago	Produce ácido clorhídrico y enzimas digestivas. Aquí se descomponen las proteínas y se forma el bolo alimenticio.
Intestino delgado	Es donde ocurre la mayor parte de la absorción de nutrientes. Recibe la bilis del hígado y las enzimas del páncreas para seguir digiriendo.
Intestino grueso	Absorbe agua y electrolitos. Alberga la microbiota intestinal, fundamental para la salud digestiva e inmunológica.
Hígado y vesícula	El hígado produce bilis, que se almacena en la vesícula biliar y se libera al intestino para digerir las grasas. También cumple funciones de detoxificación.

La mayoría de las plantas medicinales digestivas actúan en el estómago, el intestino o el hígado/vesícula. Por eso, entender dónde está cada órgano ayuda a entender por qué se usa cada planta.

Glosario básico

Cuatro conceptos clave para leer esta guía

Efecto adverso

¿Qué me genera la planta?

Es una reacción no deseada que puede ocurrir como consecuencia del uso de una planta, incluso cuando se usa correctamente y a las dosis indicadas. No ocurre en todas las personas, pero es importante conocerlos. Ejemplo: el boldo en dosis altas puede causar náuseas o irritación gástrica.

Contraindicación

¿Hay algo en mi cuerpo que me impide tomarla?

Es una condición o situación (enfermedad, estado fisiológico, medicamento) que hace que el uso de una planta sea inadecuado o riesgoso para esa persona en particular. No significa que la planta sea mala, sino que no es adecuada para ese caso específico. Ejemplo: el boldo está contraindicado en personas con obstrucción biliar.

Interacción

¿Puede interferir con algún medicamento?

Ocurre cuando una planta modifica el efecto de un medicamento (o viceversa), ya sea potenciándolo o reduciéndolo. Siempre informar al médico o farmacéutico si se están usando plantas medicinales junto a medicamentos. Ejemplo: el jengibre a dosis altas puede potenciar el efecto de anticoagulantes.

Dosis

¿Cuánto es suficiente?

La cantidad adecuada de una planta para obtener el efecto deseado sin generar riesgos. Más cantidad no significa más efecto. En herbolaria, respetar la dosis recomendada es tan importante como en cualquier otro tratamiento. Las dosis indicadas en esta guía son para uso en adultos sanos.

Fichas de plantas

Una ficha detallada por cada planta vista en el taller

Boldo	<i>Peumus boldus</i> Comp. activo: Boldina (alcaloide)	Colagoga · Colerética
INDICACIONES	Dispepsia, digestión lenta y pesada, cálculos biliares leves, insuficiencia hepática leve.	
CONTRAINDICACIONES	Obstrucción biliar, cólico biliar agudo, cálculos biliares grandes, embarazo y lactancia, insuficiencia hepática severa.	
EFFECTOS ADVERSOS	En dosis altas: náuseas, vómitos, irritación gastrointestinal. Raramente: nefrotoxicidad con uso prolongado.	
INTERACCIONES	No combinar con anticoagulantes (warfarina). Precaución con otros hepatoprotectores.	
FORMA DE USO	Infusión de hojas: 1 cdita por taza, 2-3 veces al día después de las comidas. No usar más de 4 semanas seguidas.	

Alcaucil	<i>Cynara scolymus</i> Comp. activo: Cinarina (ácido fenólico)	Colagoga · Digestiva amarga
INDICACIONES	Hígado graso leve, colesterol elevado, digestión lenta, dispepsia funcional.	
CONTRAINDICACIONES	Obstrucción biliar, alergia a plantas de la familia Asteraceae, embarazo.	
EFFECTOS ADVERSOS	Poco frecuentes: flatulencias, malestar gastrointestinal leve al inicio del tratamiento.	
INTERACCIONES	Puede potenciar el efecto de medicamentos hipolipemiantes. Precaución con diuréticos.	
FORMA DE USO	Extracto estandarizado (cápsulas) o infusión de hojas: 1-2 tazas al día antes de las comidas.	

Cardo mariano	<i>Silybum marianum</i> Comp. activo: Silimarina (flavonolignano)	Hepatoprotectora
INDICACIONES	Protección hepatocelular, cirrosis hepática leve, hepatitis tóxica, intoxicación por alcohol.	
CONTRAINDICACIONES	Alergia a plantas de la familia Asteraceae. Usar con precaución en embarazo (consultar profesional).	
EFFECTOS ADVERSOS	Poco frecuentes: efecto laxante leve, náuseas ocasionales.	
INTERACCIONES	Puede interferir con medicamentos metabolizados por el hígado (CYP450). Consultar con profesional.	
FORMA DE USO	Extracto estandarizado al 70-80% de silimarina: cápsulas o comprimidos según indicación del fabricante.	

Diente de León	<i>Taraxacum officinale</i> Comp. activo: Taraxacina (sesquiterpeno amargo)	Colagoga · Diurética · Digestiva amarga
INDICACIONES	Estimulación hepática y biliar, retención de líquidos, inapetencia, digestión lenta.	
CONTRAINDICACIONES	Obstrucción biliar, alergia a Asteraceae, úlcera péptica activa.	
EFFECTOS ADVERSOS	Poco frecuentes: reacciones alérgicas en personas sensibles a la familia Asteraceae.	
INTERACCIONES	Puede potenciar el efecto de diuréticos y de medicamentos para la diabetes.	
FORMA DE USO	Infusión de hojas o raíz: 1-2 cucharaditas por taza, 2-3 veces al día. La raíz tostada puede usarse como sustituto del café.	

Menta	<i>Mentha x piperita</i> Comp. activo: Mentol (aceite esencial)	Antiespasmódica · Carminativa
INDICACIONES	Colon irritable, espasmos intestinales, náuseas, flatulencias, digestión lenta.	
CONTRAINDICACIONES	Reflujo gastroesofágico, hernia de hiato, niños menores de 2 años (aceite esencial). El aceite esencial puro no debe usarse en mucosas ni en el rostro de niños.	
EFFECTOS ADVERSOS	Ardor o reflujo si se usa en personas con hernia de hiato. El aceite esencial en dosis altas puede causar náuseas paradójicas.	
INTERACCIONES	Puede interferir con ciclosporina y algunos antihipertensivos. El aceite esencial puede aumentar la absorción de algunos fármacos.	
FORMA DE USO	Infusión: 1 cdita de hojas secas por taza, 3 veces al día entre comidas. Para colon irritable: cápsulas de aceite esencial con cubierta entérica.	

Manzanilla	<i>Matricaria chamomilla</i> Comp. activo: Apigenina (flavonoide)	Antiespasmódica · Antiinflamatoria · Antiemética
INDICACIONES	Gastritis leve, espasmos digestivos, cólicos, náuseas, mucosa intestinal irritada, ansiedad con síntomas digestivos.	
CONTRAINDICACIONES	Alergia a plantas de la familia Asteraceae. Precaución en embarazo en dosis altas.	
EFFECTOS ADVERSOS	Raramente: reacciones alérgicas (dermatitis de contacto o sistémica) en personas sensibles a Asteraceae.	
INTERACCIONES	Puede potenciar levemente el efecto de anticoagulantes (warfarina) con uso prolongado y dosis altas.	
FORMA DE USO	Infusión de flores: 1 cucharada por taza, dejar reposar tapado 10 minutos, colar. 2-4 tazas al día.	

Cedrón	<i>Aloysia citriodora</i> Comp. activo: Citral y limoneno (aceites esenciales)	Antiespasmódica · Ansiolítica digestiva
INDICACIONES	Espasmos digestivos, colon irritable asociado a ansiedad o estrés, digestión lenta nerviosa.	
CONTRAINDICACIONES	Embarazo (uso moderado, consultar profesional). No hay contraindicaciones absolutas bien documentadas.	
EFFECTOS ADVERSOS	Muy poco frecuentes: fotosensibilidad leve con uso de extractos concentrados y exposición al sol.	
INTERACCIONES	No se conocen interacciones significativas a dosis normales de infusión.	
FORMA DE USO	Infusión de hojas frescas o secas: 1 cucharadita por taza, 2-3 veces al día. Excelente combinada con menta o melisa.	

Hinojo	<i>Foeniculum vulgare</i> Comp. activo: Anetol (aceite esencial)	Antiespasmódica · Carminativa
INDICACIONES	Gases, distensión abdominal, espasmos intestinales, cólico del lactante (uso externo en masaje).	
CONTRAINDICACIONES	Embarazo (estimula la musculatura uterina en dosis altas). Alergia a plantas de la familia Apiaceae.	
EFFECTOS ADVERSOS	Raramente: reacciones fotosensibilizantes con extractos concentrados.	
INTERACCIONES	No se conocen interacciones significativas a dosis de infusión habitual.	
FORMA DE USO	Infusión de frutos (semillas): 1 cdita por taza, 2-3 veces al día después de las comidas. Para masaje en cólico del lactante: aceite vehicular con gotas de aceite esencial de hinojo.	

Jengibre	<i>Zingiber officinale</i> Comp. activo: Gingeroles y shogaols (fenoles)	Antiemético · Digestivo · Carminativo
INDICACIONES	Náuseas (embarazo, quimioterapia, postoperatorio, viaje), digestión lenta, gases, dismotilidad gástrica.	
CONTRAINDICACIONES	Cálculos biliares (consultar con profesional). En dosis altas durante el embarazo: consultar al médico.	
EFFECTOS ADVERSOS	En dosis altas: ardor, reflujo, diarrea. Raramente: reacciones alérgicas.	
INTERACCIONES	Potencia el efecto de anticoagulantes (warfarina, AAS) a dosis altas. Puede interferir con antidiabéticos.	
FORMA DE USO	Infusión: 2 fetas de jengibre fresco en agua hirviendo 5 minutos. También fresco en comidas o en cápsulas estandarizadas.	

Anís verde	<i>Pimpinella anisum</i> Comp. activo: Anetol (aceite esencial)	Carminativa · Antiespasmódica suave
INDICACIONES	Meteorismo, flatulencias, espasmos digestivos leves, digestión lenta.	
CONTRAINDICACIONES	Embarazo (puede tener efecto estrogénico en dosis altas). Alergia a plantas de la familia Apiaceae.	
EFFECTOS ADVERSOS	Raramente: reacciones alérgicas en personas sensibles a la familia Apiaceae.	
INTERACCIONES	No se conocen interacciones significativas a dosis habituales.	
FORMA DE USO	Infusión de frutos: 1 cucharadita por taza, después de las comidas. También como condimento en preparaciones culinarias.	

Genciana	<i>Gentiana lutea</i> Comp. activo: Genciopirina (iridoide amargo)	Digestiva amarga · Aperitiva
INDICACIONES	Inapetencia, digestiones muy lentas, insuficiencia de secreción gástrica, dispepsia con sensación de plenitud.	
CONTRAINDICACIONES	Úlcera gastroduodenal activa, gastritis con hipersecreción ácida, hipertensión arterial, embarazo.	
EFFECTOS ADVERSOS	En dosis altas: náuseas, dolor de cabeza. Su sabor extremadamente amargo puede provocar náuseas si se usa mal.	
INTERACCIONES	Puede potenciar el efecto de antihipertensivos.	
FORMA DE USO	Tintura o extracto: 20-30 gotas en agua 30 minutos antes de las comidas. No usar más de 4 semanas continuas.	

Romero	<i>Rosmarinus officinalis</i> Comp. activo: Ácido rosmarínico (polifenol)	Digestiva · Colerética suave · Carminativa
INDICACIONES	Digestión pesada, espasmos digestivos leves, insuficiencia biliar leve, flatulencias.	
CONTRAINDICACIONES	Embarazo en dosis medicinales (no en cantidades culinarias). Hipertensión arterial con extractos concentrados. Epilepsia.	
EFFECTOS ADVERSOS	Poco frecuentes: dermatitis de contacto. El aceite esencial en dosis altas puede ser convulsivante.	
INTERACCIONES	Puede interferir con anticoagulantes y antihipertensivos a dosis altas.	
FORMA DE USO	Infusión de hojas: 1 cucharadita por taza, 1-2 veces al día después de las comidas. También como condimento.	

Regaliz	<i>Glycyrrhiza glabra</i> Comp. activo: Glicirricina / DGL (triterpeno)	Antiinflamatoria de la mucosa · Gastroprotectora
INDICACIONES	Úlcera gástrica y duodenal, esofagitis, gastritis, mucosa digestiva inflamada o irritada.	
CONTRAINDICACIONES	Hipertensión arterial (con glicirricina), insuficiencia cardíaca, edema, hipopotasemia, embarazo, insuficiencia renal.	
EFFECTOS ADVERSOS	Con glicirricina: retención de sodio, pérdida de potasio, hipertensión, pseudohiperaldosteronismo. El extracto DGL (desglicolado) elimina estos riesgos.	
INTERACCIONES	Potencia corticosteroides. Puede interferir con antihipertensivos y diuréticos.	
FORMA DE USO	Extracto DGL (desglicolado): cápsulas o comprimidos masticables antes de las comidas. Evitar el regaliz natural convencional para uso interno prolongado.	

Malva	<i>Malva sylvestris</i> Comp. activo: Mucílagos (polisacáridos)	Antiinflamatoria de la mucosa · Emoliente
INDICACIONES	Irritación e inflamación de la mucosa digestiva, estreñimiento leve, mucositis, gastritis leve.	
CONTRAINDICACIONES	No se conocen contraindicaciones absolutas a dosis normales. Precaución en embarazo.	
EFFECTOS ADVERSOS	Muy poco frecuentes: reacciones alérgicas puntuales.	
INTERACCIONES	Los mucílagos pueden retardar la absorción de otros medicamentos si se toman juntos. Separar 1-2 horas de otros fármacos.	
FORMA DE USO	Infusión de flores y hojas: 1-2 cucharadas por taza, 2-3 veces al día. Dejar reposar 15 minutos para que los mucílagos se liberen.	

Sábila	<i>Aloe vera</i> Comp. activo: Acemanano (polisacárido)	Antiinflamatoria de la mucosa · Laxante suave
INDICACIONES	Colon irritable, estreñimiento ocasional, mucosa intestinal inflamada.	
CONTRAINDICACIONES	Síndrome de colon irritable severo, embarazo, lactancia, niños menores de 12 años, enfermedades inflamatorias intestinales activas (Crohn, colitis ulcerosa) sin supervisión.	
EFFECTOS ADVERSOS	El látex (parte amarilla bajo la piel) es fuertemente laxante y puede causar calambres y diarrea. El jugo interno (gel) es el que tiene uso seguro.	
INTERACCIONES	El látex de aloe puede potenciar glucósidos cardíacos y diuréticos. Puede interferir con antidiabéticos.	
FORMA DE USO	Jugo de pulpa (gel interior, sin látex): 50-100 ml antes de las comidas. Usar productos estandarizados y certificados sin aloína.	

Lavanda	<i>Lavandula angustifolia</i> Comp. activo: Linalol y acetato de linalilo (aceite esencial)	Antiespasmódica suave · Ansiolítica
INDICACIONES	Espasmos digestivos asociados a ansiedad o estrés, colon irritable funcional, digestión nerviosa. Uso en fermentados como aporte probiótico aromático.	
CONTRAINDICACIONES	Embarazo (evitar aceite esencial en uso interno). El aceite esencial puro no debe ingerirse sin supervisión profesional.	
EFFECTOS ADVERSOS	En uso externo: raramente dermatitis de contacto. En uso interno de aceite esencial: náuseas si se excede la dosis.	
INTERACCIONES	No se conocen interacciones significativas con el uso de la planta en infusión o fermentado.	
FORMA DE USO	Infusión de flores secas: 1 cucharadita por taza, 1-2 veces al día. Fermentado de vinagre: 1 cucharadita en agua o como aderezo.	

Recetas

▣ Infusión antináuseas

RECOMENDADO PARA	Náuseas en general. En caso de embarazo, consumir solo con jengibre (omitir la manzanilla).
INGREDIENTES	• 2 fetas de jengibre fresco • 2 cucharaditas de flores de manzanilla (aprox. 4 g) • 500 ml de agua potable • Olla y colador
PREPARACIÓN	1. Colocar las 2 fetas de jengibre en una olla con 500 ml de agua. 2. Llevar al fuego hasta que rompa hervor y dejar hervir 5 minutos. 3. Apagar el fuego y agregar las 2 cucharaditas de manzanilla. 4. Tapar y dejar reposar 10 minutos. 5. Colar y servir.
FORMA DE USO	Hasta 4 tazas al día.
CONSERVACIÓN	Se prepara al momento del uso. Puede conservarse hasta 2 horas a temperatura ambiente o en botella tapada en heladera hasta 48 horas.

▣ Amargo Aperitivo Digestivo

RECOMENDADO PARA	Preparar el sistema digestivo antes de las comidas. Estimula la secreción gástrica y biliar. Consumir 30 minutos antes de comer.
INGREDIENTES	• 30 g de diente de león • 30 g de flores de manzanilla • 10 g de cáscara de naranja amarga • 10 g de hojas de carqueja • 600 ml de alcohol de uso alimenticio • 400 ml de agua potable • Frasco de vidrio de al menos 1500 ml • Colador y frascos gotero • Etiqueta para el frasco
PREPARACIÓN	1. Colocar las hierbas en el frasco de vidrio. 2. Agregar un dedo de agua y agitar para hidratar las hierbas. 3. Mezclar el agua y el alcohol, y verter sobre las hierbas. 4. Cerrar, etiquetar y guardar en lugar fresco y oscuro. 5. Agitar todos los días durante 21 días. 6. Al cumplir los 21 días, colar y enfrascar en goteros. 7. Etiquetar y guardar en lugar fresco y oscuro.
FORMA DE USO	15 ml (1 cucharada) antes de cada comida principal.
CONSERVACIÓN	Hasta 2 años en lugar fresco, oscuro y seco.

▣ Vinagre Fermentado de Lavanda

RECOMENDADO PARA	Incorporar probióticos a la alimentación cotidiana. Usar como aderezo o disuelto en agua. También puede prepararse con flores de diente de león, pétalos de rosa o flores de caléndula.
INGREDIENTES	• 500 ml de agua potable • 3 cucharadas bien colmadas de azúcar rubia • Jugo de medio limón • 20 g de flores de lavanda secas • Frasco de vidrio de boca ancha • Frasco de vidrio de boca angosta con tapa • Lenzos para cubrir los frascos • Banditas elásticas • Etiqueta para el frasco
PREPARACIÓN	FASE 1 — Días 1 a 7: Colocar todos los ingredientes en el frasco de boca ancha y revolver bien. Tapar con un lienzo y sostener con una banda elástica. Mantener a temperatura ambiente, revolviendo una vez por día para evitar la formación de hongos en la superficie. FASE 2 — Semanas 2 a 4: Colar el líquido y pasar a un frasco de boca angosta. Cubrir nuevamente con lienzo y banda elástica. Continuar la fermentación a temperatura ambiente por 3 semanas más, sin necesidad de revolver. FINAL: Cuando el proceso de fermentación esté completo (total: aprox. 4 semanas), reemplazar el lienzo por una tapa rosca.
FORMA DE USO	Como aderezo en ensaladas o una cucharadita disuelta en un vaso de agua.
CONSERVACIÓN	Conservar en heladera una vez finalizada la fermentación.

Este vinagre puede prepararse con cualquier flor comestible y medicinal. Algunas variantes: flores de diente de león (digestivo y diurético), pétalos de rosa (antioxidante) o flores de caléndula (antiinflamatoria).

Tinturas madre

Extractos concentrados en alcohol: más potencia, más duración

Una tintura madre es un extracto vegetal que utiliza una mezcla de agua y alcohol como solvente. A diferencia de la infusión o la decocción, el alcohol permite extraer una mayor concentración de principios activos y conservarlos por mucho más tiempo. Es la preparación fitoterapéutica con mayor estabilidad y concentración disponible para uso domiciliario.

¿Cuándo conviene usar una tintura en lugar de una infusión?

	Infusión / Decocción	Tintura madre
Velocidad de acción	Más rápida — ideal para síntomas agudos (espasmos, náuseas, gases)	Algo más lenta al inicio, pero sostenida en el tiempo
Uso recomendado	Molestias puntuales y tratamientos cortos	Tratamientos de fondo, plantas de uso sostenido (boldo, alcaucil, cardo mariano)
Concentración	Menor	Mayor — dosis en gotas
Conservación	Horas a temperatura ambiente o hasta 48 hs en heladera	Hasta 2 años en lugar fresco y oscuro
Duración del tratamiento	A demanda	Máximo 4-6 semanas continuas, luego descanso

Proporciones de alcohol y agua según la parte de la planta

Parte de la planta	Ejemplos	Alcohol	Agua	¿Por qué?
Partes duras	Raíces, cortezas, frutos	80–90%	10–20 %	El alcohol penetra mejor las estructuras celulares duras para liberar los principios activos
Partes intermedias	Tallos, hojas	60–70%	30–40 %	Equilibrio entre extracción y preservación de compuestos más solubles en agua
Partes suaves	Flores	50–60%	40–50 %	Las flores liberan sus principios activos con menor concentración de alcohol

Mientras más dura la parte de la planta, más alcohol se necesita. El alcohol tiene mayor capacidad que el agua para romper las estructuras celulares y extraer los principios activos.

Procedimiento general para preparar una tintura madre

1	Colocar 100 g de hierba en un frasco de vidrio limpio.
2	Agregar un dedo de agua y agitar para hidratar la planta e impregnarla con el líquido.
3	Agregar el resto del agua correspondiente y luego el alcohol. Agitar nuevamente.
4	Al unirse el agua y el alcohol se genera calor (reacción exotérmica). Es completamente normal, no hay que preocuparse.
5	Tapar el frasco y etiquetar con: nombre de la hierba, fecha de preparación, fecha de filtrado, propiedades (opcional).
6	Dejar macerar entre 12 y 28 días en un lugar oscuro y alejado del calor. Agitar el frasco algunos días durante este período para favorecer la liberación de principios activos.
7	Una vez cumplido el tiempo, filtrar con un filtro de tela.
8	Envasar la solución obtenida en frascos goteros para su uso.

Fecha de vencimiento: 2 años a partir de la fecha de preparación, conservando en lugar fresco, oscuro y seco.

Para el cardo mariano (*Silybum marianum*), la tintura madre es una excelente opción ya que la silimarina se extrae mejor en alcohol. Se usan los frutos secos molidos (parte dura), por lo que corresponde usar 80-90% de alcohol.