

## Индивидуальное задание к практической работе №3 по Excel.

1. Решить уравнение из таблицы, расположенной ниже, вариант выбирается в соответствии с номером по журналу.

№вариант а	Уравнение	Отрезок, содержа- щий корень
1	$3\sin\sqrt{x} + 0.35x - 3.8 = 0$	[2,3]
2	$0.25x^3 + x - 1.25 = 0$	[0; 2]
3	$x + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} - 2.5 = 0$	[0.4; 1]
4	$x - \frac{1}{(3 + \sin(3.6x))} = 0$	[0; 0.85]
5	$0.1x^2 - x \ln x = 0$	[1; 2]
6	$\operatorname{tg} x - \left(\frac{1}{3}\right)(\operatorname{tg} x)^3 + \left(\frac{1}{5}\right)(\operatorname{tg} x)^5 - \frac{1}{3} = 0$	[0; 0.8]
7	$\arccos x - \sqrt{(1 - 0.3x^3)} = 0$	[0; 1]
8	$3x - 4\ln x - 5 = 0$	[2; 4]
9	$\cos\left(\frac{2}{x}\right) - 2\sin\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} = 0$	[1; 2]
10	$\sqrt{(1 - 0.4x^2)} - \arcsin x = 0$	[0; 1]
11	$e^x - e^{-x} - 2 = 0$	[0; 1]
12	$\sin(\ln x) - \cos(\ln x) + 2 \ln x = 0$	[1; 3]
13	$x - 2 + \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$	[1.2; 2]
14	$e^x + \ln x - 10x = 0$	[3; 4]
15	$\cos x - e^{-x^2/2} + x - 1 = 0$	[1; 2]
16	$1 - x + \sin x - \ln(1 + x) = 0$	[0; 1.5]
17	$3x - 14 + e^x - e^{-x} = 0$	[1; 3]
18	$\sqrt{(1 - x)} - \operatorname{tg} x = 0$	[0; 1]
19	$x + \cos(x^{0.52} + 2) = 0$	[0.5; 1]
20	$3(\ln x)^2 + 6 \ln x - 5 = 0$	[1; 3]
21	$\sin x^2 + \cos x^2 - 10x = 0$	[0; 1]
22	$x^2 - \ln(1 + x) - 3 = 0$	[2; 3]
23	$2x \cdot \sin x - \cos x = 0$	[0.4; 1]
24	$e^x + \sqrt{(1 + e^{2x})} - 2 = 0$	[-1; 0]
25	$\ln x - x + 1.8 = 0$	[2; 3]
26	$x \cdot \operatorname{tg} x - \frac{1}{3} = 0$	[0.2; 1]
27	$\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) - \operatorname{ctg}\left(\frac{x}{2}\right) + x = 0$	[1; 2]
28	$0.4 + \operatorname{arctg} \sqrt{x} - x = 0$	[1; 2]
29	$\sqrt{(1 - x)} - \cos\left(\sqrt{(1 - x)}\right) = 0$	[0; 1]
30	$0.6 \cdot 3^x - 2.3x - 3 = 0$	[2; 3]

2. Выполнить вычисление частичных сумм ряда из таблицы на соответствующем диапазоне. Число точек выбирается  $|x_{\text{кон}} - x_{\text{нач}}|/29$ . В отдельном столбце вычислить значение  $Y(x)$  в соответствующих точках.

Пример выполненной работы на основании разложения в степенной ряд функции

$$Y(x) = x \cdot \cos(3x).$$

Ряд имеет вид  $S(x) = x - \frac{3^2 \cdot x^3}{2!} + \frac{3^4 \cdot x^5}{4!} - \frac{3^6 \cdot x^7}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{3^{2n} \cdot x^{2n+1}}{(2n)!}$

Для вычисления данного ряда используется рекуррентная формула. Для вывода этой формулы нужно рассмотреть  $n$ -ый член ряда и  $(n-1)$ -ый член ряда. Заметим, что знак слагаемого меняется при переходе к каждому последующему элементу и, если у первого элемента был знак «+», то у второго уже «-», поэтому при переходе от одного элемента к другому достаточно поставить знак «-».

$$a_n = \frac{3^{2n} \cdot x^{2n+1}}{(2n)!}$$

$$a_{n-1} = \frac{3^{2(n-1)} \cdot x^{2(n-1)+1}}{(2(n-1))!}$$

Для вывода рекуррентной формулы поделим  $n$ -ый член ряда на  $(n-1)$ -ый

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{\frac{3^{2n} \cdot x^{2n+1}}{(2n)!}}{\frac{3^{2(n-1)} \cdot x^{2(n-1)+1}}{(2(n-1))!}} = \frac{3^{2n} \cdot x^{2n+1}}{(2n)!} \cdot \frac{(2n-2)!}{3^{2n-2} \cdot x^{2n-2+1}} =$$

$$= \frac{3^{2n} \cdot x^{2n+1}}{(2n)!} \cdot \frac{(2n-2)!}{3^{2n-2} \cdot x^{2n-1}} = \frac{3^2 \cdot x^2}{(2n-1) \cdot (2n)}$$

Отдельно поясню сокращение множителей с факториалом.

$(2n-2)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-2)$  и  $(2n)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n)$  и, соответственно, эти 2 произведения отличаются на 2 множителя  $(2n-1)$  и  $(2n)$ . Таким образом,

$$a_n = -a_{n-1} \cdot \frac{x^2 \cdot 3^2}{(2n-1) \cdot 2n}$$

В файле kniga9.pdf приведен пример выполнения данной работы. В первом столбце  $x$ , он изменяется в диапазоне  $[0, \pi]$ . В столбцах от В до S вычисляются 18 членов ряда, а в 19 колонке подсчитана их сумма.

В файле Дополнение\_к\_инд.заданию.xlsx представлен принцип заполнения таблицы табулирования ряда. Обращаю внимание, что формулы в excel не набиваются вручную для каждой ячейки, а набиваются для одной ячейки и протягиваются. При этом необходимо использовать относительную и смешанную адресацию.

В отдельном столбце V произведено табулирование (вычисление значений) самой функции  $Y(x)$ . Аналогичные действия Вам надо произвести с Вашим рядом из 5 практической работы по WORD. Диапазон значений  $x$  берется из 3 колонки. Он разбивается на 30 частей. Для справки Ваши варианты приведены в таблице ниже. Номер варианта выбирается в соответствии с номером по журналу.

N	Функции $S(x), Y(x)$	Диапазон
1	$S = 1 + \frac{\ln 3}{1!}x + \frac{\ln^2 3}{2!}x^2 + \dots + \frac{\ln^n 3}{n!}x^n$ $Y = 3^x$	$0.1 \leq x \leq 1$
2	$S = \cos x + \frac{\cos 2x}{2} + \dots + \frac{\cos nx}{n}$ $Y = -\ln 2 \sin(x/2) $	$\pi/5 \leq x \leq 9\pi/5$
3	$S = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $Y = \sin x$	$0.1 \leq x \leq 1$
4	$S = \sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$ $Y = x/2$	$\pi/5 \leq x \leq 4\pi/5$
5	$S = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ $Y = e^x$	$1 \leq x \leq 2$
6	$S = 1 + \frac{\cos(\pi/4)}{1!}x + \dots + \frac{\cos(n\pi/4)}{n!}x^n$ $Y = e^{x \cos(\pi/4)} \cdot \cos(x \cdot \sin(\pi/4))$	$0.1 \leq x \leq 1$
7	$S = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ $Y = \cos x$	$0.1 \leq x \leq 1$

8	$S = x \cdot \sin(\pi/4) + x^2 \sin(2\pi/4) + \dots + x^n \sin(n\pi/4)$ $Y = \frac{x \cdot \sin(\pi/4)}{1 - 2x \cdot \cos(\pi/4) + x^2}$	$0.1 \leq x \leq 0.8$
9	$S = x + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$ $Y = 0.25 \ln \frac{1+x}{1-x} + 0.5 \operatorname{arctg} x$	$0.1 \leq x \leq 0.8$
10	$S = 1 + \frac{\cos x}{1!} + \dots + \frac{\cos nx}{n!}$ $Y = e^{\cos x} \cdot \cos(\sin x)$	$0.1 \leq x \leq 1$
11	$S = 1 + \frac{3x^2}{1!} + \dots + \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ $Y = (1 + 2x^2)e^{x^2}$	$0.1 \leq x \leq 1$
12	$S = x \frac{\cos(\pi/3)}{1} + x^2 \frac{\cos(2\pi/3)}{2} + \dots + x^n \frac{\cos(n\pi/3)}{n}$ $Y = -0.5 \ln(1 - 2x \cos(\pi/3) + x^2)$	$0.1 \leq x \leq 0.8$
13	$S = \frac{x-1}{x+1} + \frac{(x-1)^3}{3(x+1)^3} + \dots + \frac{(x-1)^{2n+1}}{(2n+1)(x+1)^{2n+1}}$ $Y = 0.5 \ln x$	$0.2 \leq x \leq 1$
14	$S = -\cos x + \frac{\cos 2x}{2^2} + \dots + (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}$ $Y = \frac{1}{4} \left( x^2 - \frac{\pi^2}{3} \right)$	$\pi/5 \leq x \leq \pi$
15	$S = \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{15} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{4n^2 - 1}$ $Y = (1 + x^2) \frac{\operatorname{arctg} x}{2} - \frac{x}{2}$	$0.1 \leq x \leq 1$
16	$S = \sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \dots + \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$ $Y = \frac{\pi}{4}$	$\pi/10 \leq x \leq 9\pi/10$
17	$S = 1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ $Y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$0.1 \leq x \leq 1$

18	$S = \frac{\cos(2x)}{3} + \frac{\cos(4x)}{15} + \dots + \frac{\cos(2nx)}{4n^2 - 1}$ $Y = \frac{1}{2} - \frac{\pi \sin x }{4}$	$0.1 \leq x \leq 0.8$
19	$S = 1 + \frac{2x}{1!} + \frac{4x^2}{2!} + \dots + \frac{(2x)^n}{n!}$ $Y = e^{2x}$	$0.1 \leq x \leq 1$
20	$S = 1 + 2 \cdot \frac{x}{2} + \dots + \left(\frac{n^2 + 1}{n!}\right) \cdot \frac{x^n}{2^n}$ $Y = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 1\right) e^{x/2}$	$0.1 \leq x \leq 1$
21	$S = x - \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ $Y = \operatorname{arctg} x$	$0.1 \leq x \leq 0.5$
22	$S = 1 - \frac{3}{2}x^2 + \dots + (-1)^n \frac{2n^2 + 1}{(2n)!} x^{2n}$ $Y = (1 - 0.5x^2) \cos x - 0.5x \cdot \sin x$	$0.1 \leq x \leq 1$
23	$S = -\frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^4}{24} - \dots + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}$ $Y = 2((\cos x)^2 - 1)$	$0.1 \leq x \leq 1$
24	$S = -(1+x)^2 + \frac{(1+x)^4}{2} + \dots + (-1)^n \frac{(1+x)^{2n}}{n}$ $Y = \ln \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$	$-2 \leq x \leq -0.1$
25	$S = x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $Y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$0.1 \leq x \leq 1$
26	$S = \frac{x}{3!} + \frac{4x^2}{5!} + \dots + \frac{n^2}{(2n+1)!} x^n$ $Y = \frac{1}{4} \left( \frac{x+1}{\sqrt{x}} \operatorname{sh} \sqrt{x} - \operatorname{ch} \sqrt{x} \right)$	$0.2 \leq x \leq 0.8$
27	$S = x \cos(\pi/4) + x^2 \cos(2\pi/4) + \dots + x^n \cos(n\pi/4)$ $Y = \frac{x \cos(\pi/4) - x^2}{x^2 - 2x \cos(\pi/4) + 1}$	$0.1 \leq x \leq 0.8$
28	$S = 3x + 8x^2 + \dots + n(n+2)x^n$ $Y = \frac{x(3-x)}{(1-x)^3}$	$0.1 \leq x \leq 0.8$
29	$S = \cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \dots + \frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2}$ $Y = \frac{\pi^2}{8} -  x  \frac{\pi}{4}$	$\pi/5 \leq x \leq \pi$

30	$S = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$ $Y = x \cdot \operatorname{arctg} x - \ln \sqrt{1+x^2}$	$0.1 \leq x \leq 0.8$
----	--	-----------------------