Scrollen voor het slapen

De samenhang tussen social mediagebruik en slaapkwaliteit bij jongeren

Student: Lisa **Opleiding:** Bachelor Psychologie **In samenwerking met:** Jongerencentrum De Loods
Ethische commissie: dossier 2026-PSY-0412

Samenvatting

Jongeren slapen vaak te kort of slecht, en social media worden als mogelijke oorzaak genoemd. In dit onderzoek is bij 212 jongeren nagegaan hoe totaal dagelijks social mediagebruik en social mediagebruik in het uur voor het slapen samenhangen met slaapkwaliteit, gemeten met de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Gebruik in het uur voor het slapen hing samen met slechtere slaapkwaliteit ($\beta = .27$, $p < .001$), ook na correctie voor leeftijd en geslacht. Totaal dagelijks gebruik hing na correctie niet samen met slaapkwaliteit. Social mediagebruik voor het slapen veroorzaakt dus een slechtere slaap.

Inleiding

Een groot deel van de jongeren tussen 15 en 18 jaar slaapt minder dan de aanbevolen acht uur per nacht. Slecht slapen hangt samen met lagere studieresultaten, meer stress en somberheid (Hale & Guan, 2015). Tegelijk gebruiken jongeren gemiddeld meerdere uren per dag social media, vaak ook in bed. Jongerenwerkers van Jongerencentrum De Loods merken dat jongeren ’s middags moe binnenkomen en vertellen dat ze tot laat op hun telefoon zitten; dat was de aanleiding voor dit onderzoek.

Er zijn drie mechanismen beschreven waarlangs schermgebruik de slaap kan beïnvloeden (Cain & Gradisar, 2010). Ten eerste kost schermtijd slaaptijd (verdringing). Ten tweede houdt de inhoud de gebruiker mentaal en emotioneel actief, wat het inslapen bemoeilijkt (arousal). Ten derde onderdrukt het blauwe licht van het scherm de aanmaak van melatonine. Twee van deze drie mechanismen zijn vooral van toepassing op gebruik vlak voor het slapen, niet op gebruik overdag.

Eerder onderzoek bevestigt een samenhang. Levenson et al. (2016) vonden bij bijna 1.800 jongvolwassenen dat meer social mediagebruik samenhing met meer slaapproblemen. Woods en Scott (2016) vonden bij scholieren dat vooral ’s avonds en emotioneel betrokken gebruik samenhing met slechtere slaapkwaliteit. Wat nog weinig onderzocht is, is of gebruik vlak voor het slapen meer verklaart dan de totale hoeveelheid gebruik.

Onderzoeksvraag. In hoeverre hangen totaal dagelijks social mediagebruik en gebruik in het uur voor het slapen samen met de slaapkwaliteit van jongeren?

Hypothesen. H1: Meer dagelijks social mediagebruik hangt samen met slechtere slaapkwaliteit. H2: Gebruik in het uur voor het slapen hangt sterker samen met slaapkwaliteit dan totaal dagelijks gebruik.

Methode

Design en deelnemers. Het onderzoek had een cross-sectioneel correlationeel design. Deelnemers werden geworven via Jongerencentrum De Loods en twee middelbare scholen in dezelfde stad. Inclusiecriterium was een leeftijd van 15 tot 18 jaar. Voor deelnemers onder de 16 gaf een ouder schriftelijk toestemming. In totaal vulden 212 jongeren de vragenlijst volledig in (62% meisje, leeftijd M = 16,4, SD = 1,0).

Meetinstrumenten. *Slaapkwaliteit* werd gemeten met de PSQI (Buysse et al., 1989): negentien vragen over de afgelopen maand, met een totaalscore van 0 tot 21, waarbij een hogere score een slechtere slaap betekent. Een score boven 5 geldt als slechte slaap. De betrouwbaarheid in deze steekproef was voldoende (α = .74). *Dagelijks gebruik* werd gemeten als het zelfgerapporteerde aantal uren per dag, gecontroleerd met de schermtijdfunctie van de telefoon van de deelnemer. *Gebruik voor het slapen* werd gemeten met de vraag hoeveel minuten de deelnemer in het uur voor het slapengaan gemiddeld social media gebruikt (0 tot 60).

Procedure. De online vragenlijst duurde ongeveer vijftien minuten. Deelnemers gaven vooraf digitaal toestemming.

Analyse. Na beschrijvende statistiek en correlaties werd een hiërarchische regressie uitgevoerd met PSQI als afhankelijke variabele. In stap 1 werden leeftijd en geslacht ingevoerd, in stap 2 dagelijks gebruik en gebruik voor het slapen.

Resultaten

Gemiddeld gebruikten de deelnemers 3,4 uur per dag social media (SD = 1,6) en 34 minuten in het uur voor het slapen (SD = 17). De gemiddelde PSQI-score was 6,9 (SD = 3,1); 61% had een score boven 5.

Dagelijks gebruik correleerde met de PSQI-score (r = .19, p = .008), en gebruik voor het slapen correleerde sterker (r = .31, p < .001).

Tabel 1. *Hiërarchische regressie van slaapkwaliteit (PSQI) op social mediagebruik (N = 198)*

Voorspeller	B	SE	β	p
Stap 1				
Leeftijd	−0,08	0,10	−.05	.44
Geslacht (meisje = 1)	0,61	0,46	.09	.19
Stap 2				
Dagelijks gebruik (uur)	0,17	0,14	.09	.23
Gebruik voor het slapen (min)	0,05	0,01	.27	< .001

Noot. Stap 1: $R^2 = .01$. Stap 2: $R^2 = .13$, $\Delta R^2 = .12$, $F(2, 193) = 13{,}3$, $p < .001$.

In stap 2 voorspelde gebruik voor het slapen de slaapkwaliteit significant, terwijl dagelijks gebruik na correctie geen significante voorspeller meer was. H1 wordt daarmee deels ondersteund (alleen bij de

enkelvoudige correlatie) en H2 wordt ondersteund.

Discussie

Dit onderzoek laat zien dat vooral social mediagebruik in het uur voor het slapen samenhangt met een slechtere slaapkwaliteit, en dat de totale hoeveelheid gebruik daar na correctie weinig aan toevoegt. Dit sluit aan bij Woods en Scott (2016) en bij de mechanismen van arousal en licht die Cain en Gradisar (2010) beschrijven: die werken vooral vlak voor het slapen.

Het belangrijkste inzicht is dus dat social mediagebruik voor het slapen leidt tot slechter slapen. Jongeren die hun telefoon een uur voor het slapen weglegen, zullen daardoor beter slapen. Scholen en jongerencentra zoals De Loods zouden dit actief moeten aanraden.

Het onderzoek heeft ook beperkingen. Het gebruik voor het slapen is zelfgerapporteerd en daardoor gevoelig voor herinneringsfouten. De steekproef kwam uit één stad en bestond voor een groter deel uit meisjes, wat de generaliseerbaarheid beperkt.

Vervolgonderzoek zou gebruik kunnen maken van objectieve metingen van slaap, zoals een slaaptracker, en van langere meetperiodes.

Literatuur

Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, *28*(2), 193–213.

Cain, N., & Gradisar, M. (2010). Electronic media use and sleep in school-aged children and adolescents: A review. *Sleep Medicine*, *11*(8), 735–742.

Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. *Sleep Medicine Reviews*, *21*, 50–58.

Levenson, J. C., Shensa, A., Sidani, J. E., Colditz, J. B., & Primack, B. A. (2016). The association between social media use and sleep disturbance among young adults. *Preventive Medicine*, *85*, 36–41.

Woods, H. C., & Scott, H. (2016). #Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. *Journal of Adolescence*, *51*, 41–49.