

1.2

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

BISOGNA CHIEDERSI SE $A \cdot B$ PUÒ
FARSI. A 3×3 B 3×2 SÌ, PERCHÉ
 $A_C = B_R$

$A \cdot B$ = righe x colonne:

$$\begin{pmatrix} (4 \cdot 0) + (1 \cdot 2) + (-1 \cdot 3), & (4 \cdot 1) + (1 \cdot 1) + (-1 \cdot 1) \\ (3 \cdot 0) + (0 \cdot 2) + (2 \cdot 3), & (3 \cdot 1) + (0 \cdot 1) + (2 \cdot 1) \\ (-2 \cdot 0) + (1 \cdot 2) + (1 \cdot 3), & (-2 \cdot 1) + (1 \cdot (-1)) + (1 \cdot 1) \\ (0 \cdot 0) + (1 \cdot 2) + (-3 \cdot 3), & (0 \cdot 1) + (1 \cdot (-1)) + (-3 \cdot 2) \end{pmatrix}$$