

SEMINAR săptămâna 3: Metoda lui Gauss-Jordan

0.1 SARCINI

Ce începe cu „puteți” este opțional. Restul este „recomandat cu căldură”.

- Puteți citi de pe wikipedia (în engleză) despre metoda lui Gauss.
- De citit din cartea scrisă cu dl. Dăianu:
 - exemplul de la pagina 25
 - §18 de la pagina 26
 - exercițiile rezolvate 3 și 4a)
- De lucrat exercițiile: 8 (pag. 41, cu metoda Gauss-Jordan), 17 (pag. 44 - de aflat matricea scară redusă cu Gauss-Jordan), 19 (pag. 45) și 20 (pag. 45, cu metoda Gauss-Jordan)
- În fine, rezolvați și încărcați pe CV exercițiul pe care îl aveți lăsat temă pe CV.

0.2 EXERCITIUL REZOLVAT

Calculați inversa matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ folosind metoda Gauss-Jordan.

Soluție. Efectuăm transformări elementare asupra matricei

$$(A|I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

pentru a obține matricea scară redusă. Efectuăm transformarea $-L_1 + L_3 \rightarrow L_3$ și obținem

$$(A|I_3) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right);$$

Adunăm linia 2 la linia 3 și obținem forma scară a matricei A :

$$(A|I_3) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Ea are 3 pivoți, deci matricea A este inversabilă. Facem acum pivoții egali cu 1. Doi dintre ei sunt deja 1, mai avem doar de împărțit linia 3 cu 2. Obținem că

$$(A|I_3) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right).$$

Facem acum 0-uri deasupra pivoților. Începem de pe coloana 3. Pe linia 1 avem

$$\text{deja } 0; \text{ scădem din linia 2 linia 3. Obținem } (A|I_3) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right).$$

Facem 0 și deasupra pivotului de pe coloana 2. Din linia 1 scădem linia 2. Obținem

$$(A|I_3) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \sim (I_3|A^{-1}).$$

$$\text{Prin urmare } A^{-1} = \left(\begin{array}{ccc} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right).$$

0.3 EXERCITII PROPUSE

Exercițiile de mai jos corespund exercițiilor 1-10 din tema precedentă. Acolo trebuiau rezolvate cu metoda lui Gauss. Dacă mai aveți rezolvările cu Gauss, le puteți continua pentru a le finaliza cu Gauss-Jordan.

1. Rezolvați sistemul de mai jos folosind metoda lui Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} z = 1 \\ 2y - z = 2 \\ 3x - y - z = 3 \end{cases}$$

2. Rezolvați sistemul de mai jos folosind metoda lui Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + 2z = 3 \\ 4x - 7y + 9z = 8 \end{cases}$$

3. Rezolvați sistemul de mai jos folosind metoda lui Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} -x + 3y - z = 1 \\ -x + 4y - 3z = 2 \\ -x + 5y - 4z = 3 \end{cases}$$

4. Rezolvați sistemul de mai jos folosind metoda lui Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ -x - 2y + z = 2 \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$$

5. Rezolvați sistemul de mai jos folosind metoda lui Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 5 \\ -x + 2y = 5 \end{cases}$$

6. Rezolvați sistemul de mai jos folosind metoda lui Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 5 \\ 4x + y = 6 \end{cases}$$

7. Rezolvați sistemul de mai jos folosind metoda lui Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases}$$

8. Folosind metoda Gauss-Jordan decideți dacă matricea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 0 & 9 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

este inversabilă. În caz că este, calculați-i inversa; în caz că nu este, aflați-i forma scară redusă.

9. Folosind metoda Gauss-Jordan decideți dacă matricea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 5 & 8 \\ 3 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

este inversabilă. În caz că este, calculați-i inversa; în caz că nu este, aflați-i forma scară redusă.

10. O matrice $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ are rangul 2. Câte 0-uri poate avea o formă scară redusă a ei?