

Содержание

1	Эволюционная система уравнений	
	Навье-Стокса	2
1.1	Понятие слабого решения	2
1.2	О единственности слабого решения в случае $n = 2$	11
	Список литературы	15

1 Эволюционная система уравнений Навье-Стокса

1.1 Понятие слабого решения

Пусть Ω — ограниченная область в пространстве R^n , где $n = 2, 3$, с достаточно гладкой границей $\partial\Omega$. Рассмотрим начально-краевую задачу для системы уравнений Навье-Стокса

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial v}{\partial x_i} - \nu \Delta v + \nabla p = f; \quad (1)$$

$$\operatorname{div} v = 0; \quad (2)$$

$$v|_{t=0} = v_0; \quad (3)$$

$$v|_{(0,T) \times \partial\Omega} = 0. \quad (4)$$

Здесь $v = (v_1(t, x), \dots, v_n(t, x))$ — вектор-функция скорости движения частицы жидкости, $p = p(t, x)$ — функция давления, $f = f(t, x)$ — вектор-функция плотности внешних сил, $\nu > 0$ — коэффициент вязкости. $\Delta v = (\Delta v_1, \dots, \Delta v_n)$, $\Delta v_i = \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_n^2}$; $\operatorname{div} v = \frac{\partial v}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial v}{\partial x_n}$; $\nabla p = (\frac{\partial p}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial p}{\partial x_n})$.

Сформулируем определение сильного решения рассматриваемой задачи (1)-(4). Для этого введем необходимые функциональные пространства:

$L_p(\Omega)$ — множество измеримых функций, суммируемых с p -ой степенью, где $1 \leq p < \infty$, и нормой является $\|v\|_{L_p(\Omega)} = (\int_{\Omega} |v(x)|^p dx)^{1/p}$.

Пространство $L_{\infty}(\Omega)$ состоит из измеримых существенно ограниченных функций $v : \Omega \rightarrow R^n$. Функция $v : \Omega \rightarrow R^n$ называется существенной ограниченной, если существует число $C_1 < \infty$, что $\|v(x)\| \leq C_1$ при почти всех $x \in \Omega$. Норма в $L_{\infty}(\Omega)$ задается $\|v\|_{L_{\infty}(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} \|v(x)\|$.

$W_p^m(\Omega)$ — где $m \geq 1$, $p \geq 1$, пространство Соболева, состоящее из функции, которые со своими обобщенными частными производными до порядка m включительно принадлежат пространству $L_p(\Omega)$,

$$\|v\|_{W_p^m(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |D^{\alpha}v(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

$C_0^{\infty}(\Omega)$ — пространство бесконечно дифференцируемых функций на Ω со значениями в R^n и с компактным носителем, содержащимся в Ω .

ν — множество функций $v \in C_0^{\infty}(\Omega)$, таких что $\operatorname{div} v = 0$;

H — замыкание ν по норме пространства $L_2(\Omega)$;

V — замыкание ν по норме пространства $W_1^1(\Omega)$;

$L_p(a, b; X)$ — где $1 \leq p < \infty$ пространство суммируемых с p -ой степенью функций на $[a, b]$ со значениями в банаховом пространстве X . Норма пространства $L_p(a, b; X)$ задается $\|v\|_{L_p(a, b; X)} = (\int_0^T \|v(s)\|_X^p ds)^{1/p}$.

Через $L_{\infty}(a, b; X)$ будем обозначать множество всех измеримых существенно ограниченных функций $v : [a, b] \rightarrow X$. Множество $L_{\infty}(a, b; X)$ является банаховым пространством относительно нормы $\|v\|_{L_{\infty}(a, b; X)} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} \|v(s)\|_X$.

Будем обозначать E^* сопряженное пространство к пространству E .

$\langle f, \varphi \rangle$ — обозначим действие функционала f из E^* на элемент φ из E .

C_i — будем обозначать положительные константы.

Пусть f и v_0 — заданные функции, где $f \in L_2(0, T; L_2(\Omega))$ и $v_0 \in V$.

Определение 1.1. *Сильным решением начально-краевой задачи (1)-(4) называется пара функций $v \in L_2(0, T; L_2(\Omega))$ и $p \in L_2(0, T; L_2(\Omega))$, удовлетворяющих следующим условиям:*

1. обобщенные частные производные функций, содержащихся в равенствах (1)-(2), принадлежат пространству $L_2(0, T; L_2(\Omega))$;
2. при подстановке функций уравнения (1)-(2) обращаются в равенства в пространстве $L_2(0, T; L_2(\Omega))$;
3. функция v удовлетворяет начальному условию (3) и граничному условию (4).

Введем понятие слабого решения. Для этого пусть v и p — сильное решение задач (1)-(4).

Чтобы обеспечить понимание определения слабого решения, мы временно предположим, что $v = v(t, x)$ и $p = p(t, x)$ являются, фактически, гладкими решениями задачи. Сопоставим функции v отображение $v : [0, T] \rightarrow W_2^1(\Omega)$, определенное по формуле

$$[v(t)](x) = v(t, x), t \in [0, T], x \in \Omega.$$

Другими словами, v рассматривается не как функции переменных t и x , а как функция переменной t , определенная на отрезке $[0, T]$ и принимающая значения в функциональном пространстве $W_2^1(\Omega)$.

Аналогично определим $p : [0, T] \rightarrow L_2(\Omega)$ по формуле

$$[p(t)](x) = p(t, x), t \in [0, T], x \in \Omega$$

и функцию $f : [0, T] \rightarrow L_2(\Omega)$ по формуле

$$[f(t)](x) = f(t, x), t \in [0, T], x \in \Omega.$$

Умножая равенство (1) при фиксированных значениях $t \in [0, T]$ на функцию $\varphi(x) \in V$ скалярно в $L_2(\Omega)$, получим

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial t} \varphi dx + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v_i \frac{\partial v}{\partial x_i} \varphi dx - \\ & - \nu \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial^2 v_j}{\partial x_i^2} \varphi_j dx + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial p}{\partial x_i} \varphi_i dx = \int_{\Omega} f \varphi dx. \end{aligned}$$

Выполним преобразования слагаемых, связанные с интегрированием по частям ¹

$$-\nu \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 v_j}{\partial x_i^2} \varphi_j dx = \nu \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} = \nu \int_{\Omega} \nabla v : \nabla \varphi dx.$$

¹ Метод интегрирования по частям.

Здесь символ «:» обозначает покомпонентное матричное произведение, т. е. для $C = (c_{ij}), D = (d_{ij}), i, j = 1, \dots, m$, имеем $C : D = \sum_{i,j=1}^m c_{ij} d_{ij}$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial p}{\partial x_i} \varphi_i dx &= - \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} p \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_i} dx = \int_{\Omega} p \operatorname{div} \varphi dx = 0; \\ \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v_i \frac{\partial v}{\partial x_i} \varphi dx &= - \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v \frac{\partial}{\partial x_i} (v_i \varphi) dx = \\ &= - \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \varphi dx - \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v v_i \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx = \\ &= - \int_{\Omega} v \varphi \operatorname{div} v dx - \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v_i v \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx = - \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v_i v \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx. \end{aligned}$$

Таким образом, приходим к равенству

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} v \varphi dx - \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v_i v \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx + v \int_{\Omega} \nabla v : \nabla \varphi dx = \int_{\Omega} f \varphi dx. \quad (5)$$

Заметим, что равенство (5) может выполняться и при более слабых требованиях на функцию $v(t, x)$. Покажем, что достаточно предполагать, что $v \in L_2(0, T; V)$ для того, чтобы каждый интеграл, входящий в равенство (5), имел смысл.

В силу теоремы вложений Соболева²

вложение $W_2^1(\Omega) \subset L_4(\Omega)$ непрерывно при $n \leq 4$. Поэтому, так как $V \subset W_2^1(\Omega)$, то $v_i(t, x)v(t, x) \in L_2(\Omega)$ и $v_i(t, x)v(t, x)\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \in L_1(\Omega)$ при каждом фиксированном значении t . Следовательно, интеграл $\sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v_i v \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx$ определен.

Кроме того, это слагаемое определяет линейный непрерывный функцио-

² Пусть $p_1 \geq p$ и $\mathfrak{a}(W_{p_1}^{m_1}(\Omega)) > \mathfrak{a}(W_p^m(\Omega))$, то пространство $W_p^m(\Omega)$ компактно вложено в пространство $W_{p_1}^{m_1}(\Omega)$, где $\mathfrak{a}(W_p^m(\Omega)) = \frac{n}{p} - m$.

нал на V . Обозначим этот функционал через $K(v)$:

$$\langle K(v), \varphi \rangle = \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v_i v \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx.$$

Отметим, что $\int_{\Omega} v \varphi dx \in L_2(0, T)$ и производная в выражении $\frac{d}{dt} \int_{\Omega} v \varphi dx$ понимается в смысле распределений на интервале $(0, T)$. Поэтому равенство (5) выполняется в смысле распределений. Все слагаемые равенства, исключая первое, принадлежат пространству $L_1(0, T)$, поэтому $\frac{d}{dt} \int_{\Omega} v \varphi dx \in L_1(0, T)$ и равенство (5) выполняется для почти всех значений $t \in (0, T)$.

Подводя итог рассуждениям, приходим к следующему определению слабого решения.

Определение 1.2. Пусть $f \in L_2(0, T; L_2(\Omega))$ и $v_0 \in H$. Слабым решением задачи (1)-(4) называется функция $v \in L_2(0, T; V)$, удовлетворяющая для всех $\varphi \in V$ и для почти всех значений $t \in (0, T)$ равенству

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} v \varphi dx - \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} v_i v \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx + v \int_{\Omega} \nabla v : \nabla \varphi dx = \int_{\Omega} f \varphi dx \quad (6)$$

и условию

$$v(0) = v_0. \quad (7)$$

Выше показано, что равенство (6) корректно для $v \in L_2(0, T; V)$ и если (v, p) сильное решение задачи (1)-(4), то v является слабым решением. Поэтому задачу о поиске сильных решений заменим задачей об исследовании слабых решений.

Заметим, однако, что для функции $v \in L_2(0, T; V)$ условие (7) не имеет смысла, так как не определено значение функции $v(t)$ в каждой точке $t \in (0, T)$. Покажем, что функция $v(t)$, удовлетворяющая равенству (6), является непрерывной на $[0, T]$ со значениями в V^* и слабо непрерывной со значениями в H . Поэтому равенство (7) имеет смысл и определение слабого решения корректно.

Преобразуем равенство (6). Скалярное произведение $(v(t), \varphi)_{L_2(\Omega)}$ определяет линейный непрерывный функционал на H , а следовательно, эле-

мент из H^* . Учитывая отождествление $H \equiv H^*$ и цепочку вложений $V \subset H \subset H^* \subset V^*$, элемент $v(t)$ можно рассматривать как функционал на V , действие которого на функцию $\varphi \in V$ определяется равенством $\langle v(t), \varphi \rangle = (v(t), \varphi)_{L_2(\Omega)}$. Тогда можно считать, что функция $v(t)$ на $[0, T]$ принимает значения в V^* и

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} v \varphi dx = \frac{d}{dt} \langle v(t), \varphi \rangle.$$

С учетом введенных обозначений равенство (6) можно записать в виде

$$\frac{d}{dt} \langle v(t), \varphi \rangle - \nu \langle \Delta v(t), \varphi \rangle - \langle K(v(t)), \varphi \rangle = \langle f(t), \varphi \rangle,$$

где $\Delta : V \rightarrow V^*$, обозначает оператор Лапласа, действующий по правилу $\langle \Delta v(t), \varphi \rangle = - \int_{\Omega} \nabla v : \nabla \varphi dx$. Или можно (6) переписать в виде:

$$\frac{d}{dt} \langle v(t), \varphi \rangle = \langle \nu \Delta v(t) + K(v(t)) + f(t), \varphi \rangle. \quad (8)$$

Исследуем свойства операторов, входящих в правую часть равенства.

Лемма 1.1.

1. Оператор $\Delta : L_2(0, T; V) \rightarrow L_2(0, T; V^*)$ линейный и непрерывный, причем

$$\|\Delta v\|_{L_2(0, T; V^*)} = \|v\|_{L_2(0, T; V)}, \quad \forall v \in L_2(0, T; V^*). \quad (9)$$

2. Оператор $K : L_2(0, T; V) \rightarrow L_1(0, T; V^*)$ непрерывен и справедлива оценка

$$\|K(v)\|_{L_1(0, T; V^*)} \leq C_2 \|v\|_{L_2(0, T; V)}^2, \quad \forall v \in L_2(0, T; V^*), \quad (10)$$

для некоторой константы C_2 .

Доказательство. Покажем, что оператор $\Delta : V \rightarrow V^*$ линейный. Для

этого возьмем v и $u \in V$ и применим к ним оператор Лапласа

$$\Delta(\alpha v + \beta u) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}(\alpha v_i + \beta u_i) = \alpha \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_i^2} + \beta \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_i^2}.$$

Заметим, что оператор $\Delta : V \rightarrow V^*$ определяет изометрию пространств. Действительно:

$$\begin{aligned} \|\Delta v\|_{V^*} &= \sup_{\varphi \in V} \frac{|\langle \Delta v, \varphi \rangle|}{\|\varphi\|_V} = \sup_{\varphi \in V} \frac{\left| \int_{\Omega} \nabla v : \nabla \varphi dx \right|}{\|\varphi\|_V} \leq \sup_{\varphi \in V} \frac{\|\nabla v\|_{L_2(\Omega)} \|\nabla \varphi\|_{L_2(\Omega)}}{\|\varphi\|_V} \leq \\ &\leq \sup_{\varphi \in V} \frac{\|v\|_V \|\varphi\|_V}{\|\varphi\|_V} = \|v\|_V \end{aligned}$$

То есть $\|\Delta v\|_{V^*} \leq \|v\|_V$. С другой стороны, положим $\varphi = v$:

$$|\langle \Delta v, v \rangle| = \left| \int_{\Omega} \nabla v : \nabla v dx \right| = \|v\|_V^2.$$

Применим неравенство Коши-Буняковского $\|v\|_V^2 = |\langle \Delta v, v \rangle| \leq \|\Delta v\|_{V^*} \|v\|_V$. Сократив на $\|v\|_V$, получим $\|\Delta v\|_{V^*} \geq \|v\|_V$. Следовательно получаем $\|\Delta v\|_{V^*} = \|v\|_V$. Заметим, что линейный ограниченный оператор является непрерывным.

Отсюда для $v \in L_2(0, T; V)$ имеем $\|\Delta v\|_{V^*} = \|v(t)\|_V$ для почти всех $t \in [0, T]$. Так как $\|v(t)\|_V \in L_2(0, T)$, то $\|\Delta v(t)\|_{V^*} \in L_2(0, T)$. Следовательно, $\Delta v \in L_2(0, T; V^*)$ и справедливо равенство (9). Таким образом, линейный оператор Δ определяет изометрию пространств $L_2(0, T; V)$ и $L_2(0, T; V^*)$.

2) По определению оператора K для любых $v, \varphi \in V$ действует по правилу

$$\langle K(v), \varphi \rangle = \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} v_i v_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} dx.$$

Значит для любого $v \in V$ получим

$$\left| \langle K(v), \varphi \rangle \right| \leq \left| \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n v_i v_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} dx \right| \leq$$

$$\begin{aligned}
&\leq \left(\sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} |v_i v_j|^2 dx \right)^{1/2} \left(\sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} \left| \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} \right|^2 dx \right)^{1/2} \leq \\
&\leq \left(\sum_{i=1}^n \int_{\Omega} |v_i|^4 dx \right)^{1/4} \left(\sum_{j=1}^n \int_{\Omega} |v_j|^4 dx \right)^{1/4} \left(\sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} \left| \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} \right|^2 dx \right)^{1/2} \leq \|v\|_{L_4(\Omega)}^2 \|\varphi\|_V.
\end{aligned}$$

По теореме вложения Соболева вложение $V \in L_4(\Omega)^n$ непрерывно для $n \leq 4$, поэтому, $\|v\|_{L_4(\Omega)^n} \leq C_3 \|v\|_V$ и, следовательно, $\|K(v)\|_{V^*} \leq C_3^2 \|v\|_V^2$. Отсюда для $v \in L_2(0, T; V)$ имеем $K(v) \in L_1(0, T; V^*)$ и

$$\|K(v)_{L_1(0,T;V^*)}\| \leq \int_0^T \|K(v(t))\|_{V^*} dt \leq C_3^2 \int_0^T \|v(t)\|_V^2 dt = C_3^2 \|v\|_{L_2(0,T;V)}^2.$$

Докажем непрерывность оператора K . Для любых функций $v, u \in L_2(0, T; V)$ справедлива оценка

$$\begin{aligned}
&\int_0^T \|K(v) - K(u)\|_{V^*} dt \leq \int_0^T \left(\sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} (v_i v_j - u_i u_j)^2 dx \right)^{1/2} dt \leq \\
&\leq \int_0^T \left(\sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} (v_i(v_j - u_j) + (v_i - u_i)u_j)^2 dx \right)^{1/2} dt \leq \\
&\leq \sqrt{2} \sum_{i,j=1}^n \int_0^T \left(\int_{\Omega} v_i^2 (v_j - u_j)^2 dx \right)^{1/2} + \left(\int_{\Omega} (v_i - u_i)^2 u_j^2 dx \right)^{1/2} dt \leq \\
&\leq \sqrt{2} \sum_{i,j=1}^n \int_0^T (\|v_i\|_{L_4(\Omega)} \|v_j - u_j\|_{L_4(\Omega)} + \|v_i - u_i\|_{L_4(\Omega)} \|u_j\|_{L_4(\Omega)}) dt \leq \\
&\leq C_2 (\|v\|_{L_2(0,T;L_4(\Omega))} + \|u\|_{L_2(0,T;L_4(\Omega))}) \|v - u\|_{L_2(0,T;L_4(\Omega))}
\end{aligned}$$

Отсюда, если $\|v - u\|_{L_2(0,T;L_4(\Omega))} \rightarrow 0$, то $\|K(v) - K(u)\|_{L_1(0,T;L)} \rightarrow 0$. Поэтому отображение K непрерывно. □

По утверждению леммы $\nu \Delta v \in L_2(0, T; V^*)$, $K(v) \in L_1(0, T; V^*)$, поэтому $\nu \Delta v(t) + K(v(t)) + f(t) \in L_1(0, T; V^*)$. Тогда из равенства (8) и теоремы

³ следует

1. что функция $v(t)$ имеет суммируемую производную $v'(t)$;
2. в силу равенства $\frac{d}{dt}\langle\phi, u(t)\rangle = \langle\phi, g(t)\rangle$

$$\frac{d}{dt}\langle v(t), \varphi\rangle = \langle v'(t), \varphi\rangle$$

3. равенство $\frac{d}{dt}\langle v(t), \varphi\rangle = \langle \Delta v(t) + K(v(t)) + f(t), \varphi\rangle$ можно записать в виде

$$v'(t) = \nu\Delta v(t) + K(v(t)) + f(t).$$

Подводя итог рассуждений, отметим, что так как $v'(t) \in L_1(0, T; V^*)$, поэтому функция $v(t)$ непрерывна на отрезке $[0, T]$ со значениями в V^* . Кроме того, эта функция слабо непрерывна со значениями в H . Поэтому начальное условие (7) имеет смысл.

Переформулируем понятие слабого решения

Определение 1.3. Пусть $n \leq 4$, $f \in L_2(0, T; L_2(\Omega))$ и $v^0 \in H$. Слабым решением задачи (1)-(4) называется функция $v \in L_2(0, T; V)$ такая, что $v' \in L_1(0, T; V^*)$, равенство

$$v'(t) - \nu\Delta v(t) - K(v(t)) = f(t) \tag{11}$$

³ Пусть X - банахово пространство с сопряженным X^* и функции u, g принадлежат пространству $L_1(a, b, X)$. Тогда следующие три условия эквивалентны:

(а) функция $u(t)$ почти всюду равна первообразной от $g(t)$ и

$$u(t) = \xi + \int_a^b g(s)ds, \xi \in X$$

для п.в. $t \in [a, b]$

(b) для каждой приобретенной функции $\eta \in \mathcal{D}(a, b)$

$$\int_a^b u(t)\eta'(t)dt = - \int_a^b g(t)\eta(t)dt$$

(с) для каэжого $\phi \in X^*$

$$\frac{d}{dt}\langle\phi, u(t)\rangle = \langle\phi, g(t)\rangle$$

в смысле скалярных распределений на (a, b) . Если условия (а)-(с) выполнены, то и, в частности, почти всюду равна некоторой непрерывной функции.

выполняется для почти всех значений $t \in (0, T)$ и

$$v(0) = v_0 \quad (12)$$

1.2 О единственности слабого решения в случае $n = 2$

В этом разделе мы рассмотрим вопрос о единственности слабого решения начально-краевой задачи (1)-(4) для эволюционной системы уравнений Навье-Стокса. Покажем, что в случае $\Omega \subset R^2$ слабое решение начально-краевой задачи единственно. Однако для размерности $n > 2$ аналогичное утверждение неверно. Примером, показывающим, что слабое решение задачи не единственно, служит результат о бифуркации решений, содержащийся, например, в [22, гл.II, §4, п.4.4].

Сформулируем и докажем утверждение о единственности слабого решения в случае $n = 2$, следуя [22, гл.III, §3, теорема 3.2].

Теорема 1.1. *Пусть Ω ограниченная область в R^2 с достаточно гладкой границей $\partial\Omega$. Тогда слабое решение v задачи (1)-(4) единственно.*

Доказательство. Покажем единственность слабого решения. Предположим, что u и v – слабые решения задачи $v'(t) - \Delta v(t) - K(v(t)) + \text{grad} p = f(t)$, $v(0) = v^0$. Подставим эти решения в уравнение $v(0) = v^0$ и рассмотрим разность полученных равенств. Для разности $w = v - u$ получим равенство

$$w' - \nu \Delta w(t) - K(v(t)) + K(u(t)) = 0$$

Применим функционалы, стоящие в равенстве, к функции $w(t)$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\Omega} w(t, x) w(t, x) dx + \nu (w(t, x), w(t, x)) = \\ & = \int_{\Omega} \frac{\partial v_i}{\partial t} \cdot v(t, x) \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} dx - \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial t} v(t, x) \cdot \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} dx \end{aligned} \quad (13)$$

Оценим правую часть полученного равенства.

$$\int_{\Omega} \frac{\partial v_i}{\partial t} v(t, x) \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} dx - \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial t} v(t, x) \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\Omega} \frac{\partial v_i}{\partial t} v(t, x) \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} dx - \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial t} v(t, x) \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} dx + \\
&+ \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial t} v(t, x) \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} dx - \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial t} v(t, x) \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} dx = \\
&= \int_{\Omega} \frac{\partial w_i(t, x)}{\partial t} \cdot v(t, x) \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} - \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial t} w(t, x) \cdot \frac{\partial w_i(t, x)}{\partial x_i} dx
\end{aligned}$$

Используем интегрирование по частям для вычисления первого интеграла

$$\int_{\Omega} \frac{\partial w_i(t, x)}{\partial t} v(t, x) \cdot w(t, x) = - \int_{\Omega} \frac{\partial w_i(t, x)}{\partial t} \cdot \frac{\partial v(t, x)}{\partial x_i} w(t, x) dx$$

так как $\partial_i w_i(t, x) = \operatorname{div} w(t, x) = 0$. Используем интегрирование по частям для вычисления второго из интегралов

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} \frac{\partial \varphi_i}{\partial t} w(t, x) \frac{\partial w(t, x)}{\partial x_i} dx &= \sum_{i=0}^{n=2} \int_{\Omega} \frac{\partial \varphi_i}{\partial t} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial |w|^2(t, x)}{\partial x_i} dx = \\
&= -\frac{1}{2} \int_{\Omega} \sum_{i=1}^{n=2} \frac{\partial^2 \varphi_i(t, x)}{\partial t \partial x_i} \cdot |w|^2(t, x) dx = 0
\end{aligned}$$

так как $\sum_{i=1}^2 \partial_i \varphi_i(t, x) = \operatorname{div} \varphi(t, x) = 0$ Отсюда и из равенства (13) получим

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\Omega} w(t, x) w(t, x) dx + v(w(t, x) w(t, x)) = \\
&= - \int_{\Omega} \frac{\partial w_i(t, x)}{\partial t} \cdot \frac{\partial v(t, x)}{\partial x_i} w(t, x) dx
\end{aligned}$$

или

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w(t)\|_H^2 + v\|w(t)\|_H^2 = \left| \int_{\Omega} w_i(t, x) \cdot \partial_i v(t, x) w(t, x) dx \right| \quad (14)$$

Оценим правую часть неравенства, используя неравенства Шварца,

$$\left| \int_{\Omega} w_i(t, x) \cdot \partial_i v(t, x) w(t, x) dx \right| = \left| \int_{\Omega} w_i(t, x) \cdot \partial_j(t, x) w_j(t, x) dx \right| \leq$$

$$\begin{aligned}
& \left(\int_{\Omega} |w_i(t, x)|^2 |w_j(t, x)|^2 dx \right)^{1/2} \cdot \left(\int_{\Omega} |\partial_i v_j(t, x)|^2 dx \right)^{1/2} \leq \\
& \left(\int_{\Omega} |w_i(t, x)|^4 dx \right)^{1/4} \left(\int_{\Omega} |w_j(t, x)|^4 dx \right)^{1/4} \cdot \left(\int_{\Omega} |\partial_i v_j(t, x)|^2 dx \right)^{1/2} \\
\text{или} \quad & \left| \int_{\Omega} w_i(t, x) \cdot \partial_i v(t, x) w(t, x) dx \right| \leq \\
& \leq \|w_i(t)\|_{L_4(\Omega)} \cdot \|w_j(t)\|_{L_4(\Omega)} \cdot \|\partial_i v_j(t)\|_{L_2(\Omega)}
\end{aligned}$$

Учитывая, что запись, содержащая повторяющиеся индексы, предполагает суммирование по этим индексам, получаем

$$\left| \int_{\Omega} w_i(t, x) \cdot \partial_i v(t, x) w(t, x) dx \right| \leq \|w(t)\|_{(L_4(\Omega))^n}^2 \cdot \|v(t)\|_V$$

Применим неравенство О.А. Ладыженской и далее неравенство Коши $a \cdot b = \varepsilon a^2 + \frac{b^2}{4\varepsilon} c\varepsilon = \frac{v}{2^{1/2}}$, получим

$$\begin{aligned}
& \left| \int_{\Omega} w_i(t, x) \cdot \partial_i v(t, x) w(t, x) dx \right| \leq \\
& \leq 2^{1/2} \|w(t)\|_{(L_2(\Omega))^n} \cdot \|w(t)\|_V \cdot \|v(t)\|_V \leq \\
& \leq v \|w(t)\|_V^2 + \frac{1}{2^{3/2}v} \|v(t)\|_{(L_2(\Omega))^n}^2 \cdot \|w(t)\|_V
\end{aligned}$$

Подставляя полученное соотношение в неравенство (14), получаем

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w(t)\|_H^2 \leq \frac{1}{2^{3/2}v} \|w(t)\|_H^2 \cdot \|v(t)\|_V$$

Тогда из неравенство Гронуолла-Беллмана [1, теорема 26 глава IV, с.188] следует

$$\|w(t)\|_H^2 \leq \|w(0)\|_H^2 \exp \left(\int_0^t \frac{1}{2^{1/2}v} \cdot \|v(s)\|_V ds \right)$$

Поскольку $w(0) = v(0) - u(0) = 0$, то из полученного выше неравенства приходим к выводу, что $w(t) = 0$ для всех $t \in [0, T]$. Следовательно, $v = u$

и слабое и полное слабое решение задачи (1)-(4) единственно. □

Список литературы

1. *Темам Р.* Уравнения Навье-Стокса. Теория и численный анализ. — М., 1987. — с. 261—262.
2. *Темам Р.* Уравнения Навье-Стокса. Теория и численный анализ. — М., 1987. — с. 226—232.