

Esercizi Lezione 7: Interrogazioni in Algebra Relazionale

SCHEMA RELAZIONALE:

STUDENTI (Matricola, Cognome, Nome, DataNascita)

CORSI (Codice, Titolo, Docente)

ESAMI (Studente, Voto, Corso)

1. Indicare quali fra i seguenti sono possibili vincoli di integrità referenziale (nessuna, una o più risposte potrebbero essere vere):

- ☐ A. Fra Studente di ESAMI e Matricola di STUDENTI
- ☐ B. Fra Matricola di STUDENTI e Studente di ESAMI
- ☐ C. Fra Corso di ESAMI e Codice di CORSI
- ☐ D. Fra Codice di CORSI e Corso di ESAMI

2. Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere (nessuna, una o più risposte potrebbero essere vere):

- ☐ A. (Matricola, Cognome, Nome, DataNascita) è superchiave per STUDENTI
- ☐ B. (Matricola, Cognome, Nome) è superchiave per STUDENTI
- ☐ C. (Cognome, Nome, DataNascita) è superchiave per STUDENTI
- ☐ D. (Studente, Voto, Corso) è superchiave per ESAMI
- ☐ E. (Studente, Corso) è superchiave per ESAMI
- ☐ F. (Studente, Corso) è superchiave minimale per ESAMI
- ☐ G. (Studente) è superchiave minimale per ESAMI
- ☐ H. (Studente) è chiave primaria per ESAMI
- ☐ I. (Corso) è chiave primaria per ESAMI
- ☐ L. Se valesse un vincolo di tipo Unique su Titolo di CORSI sarebbero ammessi valori NULL
- ☐ M. Sono ammessi valori NULL su Docente di CORSI
- ☐ N. Sono ammessi valori NULL su Codice di CORSI
- ☐ O. Su Codice di CORSI vale un vincolo di tipo NOTNULL
- ☐ P. Su Voto di ESAMI potrebbe avere senso definire un vincolo di dominio con $Voto > 0 \text{ AND } Voto < 50$
- ☐ Q. E' possibile effettuare una Natural Join fra STUDENTI e ESAMI
- ☐ R. E' possibile effettuare una Natural Join fra CORSI e ESAMI
- ☐ S. Il risultato di una Natural Join fra (STUDENTI) e (STUDENTI) è STUDENTI
- ☐ T. Il risultato di una Natural Join fra (STUDENTI) e (STUDENTI) ha lo stesso schema di STUDENTI
- ☐ U. Il risultato di una Natural Join fra (STUDENTI) e (STUDENTI con tutti gli attributi rinominati) ha lo stesso schema di STUDENTI
- ☐ V. In ESAMI sono ammesse due tuple uguali
- ☐ Z. In ESAMI sono ammesse due tuple con valori "NULL, NULL, NULL" perché due NULL uguali sono considerati valori diversi

3. Indicare la risposta corretta alla seguente query (nessuna, una o più risposte potrebbero essere vere): **Trovare le matricole degli studenti che hanno sostenuto l'esame DataManagement con voto>6.**

☐ Query1:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie_{\text{Matricola}=\text{Studente}} (\text{ESAMI})$

$B = (\sigma_{\text{Titolo}=\text{"DataManagement"}} (\text{CORSI})) \bowtie_{\text{Codice}=\text{Corso}} (A)$

$C = \pi_{\text{Matricola}} (\sigma_{\text{Voto}>6} (B))$

☐ Query2:

$A = (\sigma_{\text{Titolo}=\text{"DataManagement"}} (\text{CORSI})) \bowtie_{\text{Codice}=\text{Corso}} (\text{ESAMI})$

$B = \pi_{\text{Studente}} (\sigma_{\text{Voto}>6} (A))$

☐ Query3:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie_{\text{Matricola}=\text{Studente}} (\text{ESAMI})$

$B = (\sigma_{\text{Voto}>6} ((\sigma_{\text{Titolo}=\text{"DataManagement"}} (\text{CORSI})) \bowtie_{\text{Codice}=\text{Corso}} (A)))$

$C = \pi_{\text{Matricola}} (B)$

☐ Query4:

$A = (\sigma_{\text{Corso}=\text{"DataManagement"}} (\text{STUDENTI} \bowtie_{\text{Matricola}=\text{Studente}} (\text{ESAMI}))$

$B = \pi_{\text{Matricola}} (\sigma_{\text{Voto}>6} (A))$

☐ Query5:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie_{\text{Matricola}=\text{Studente}} (\text{ESAMI})$

$B = ((\sigma_{\text{Voto}>6} (\sigma_{\text{Titolo}=\text{"DataManagement"}} (\text{CORSI}))) \bowtie_{\text{Codice}=\text{Corso}} (A))$

$C = \pi_{\text{Matricola}} (B)$

☐ Query6:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie_{\text{Matricola}=\text{Studente}} (\rho_{\text{Codice} \leftarrow \text{Corso}} (\text{ESAMI}))$

$B = (\sigma_{\text{Voto}>6} ((\sigma_{\text{Titolo}=\text{"DataManagement"}} (\text{CORSI})) \bowtie (A)))$

$C = \pi_{\text{Matricola}} (B)$

☐ Query7:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie (\rho_{\text{Codice, Matricola} \leftarrow \text{Studente, Corso}} (\text{ESAMI}))$

$B = (\sigma_{\text{Voto}>6} ((\sigma_{\text{Titolo}=\text{"DataManagement"}} (\text{CORSI})) \bowtie (A)))$

$C = \pi_{\text{Matricola}} (B)$

4. Indicare la risposta corretta alla seguente query (nessuna, una o più risposte potrebbero essere vere): **Trovare lo studente (o gli studenti) più giovane/i.** (Si consideri una data più vecchia come più piccola rispetto ad una più recente, ad esempio: 1/1/2000 < 2/3/2001)

☐ Query1:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie \text{STUDENTI}$

$B = \sigma_{\text{DataNascita} < \text{DataNascita2}} (A)$

☐ Query2:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie (\rho_{\text{DataNascita2} \leftarrow \text{DataNascita}} (\pi_{\text{DataNascita}} (\text{STUDENTI})))$

$B = (\pi_{\text{Matricola}} (\sigma_{\text{DataNascita} > \text{DataNascita2}} (A)))$

☐ Query3:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie (\rho_{\text{DataNascita2} \leftarrow \text{DataNascita}} (\pi_{\text{DataNascita}} (\text{STUDENTI})))$

$B = (\pi_{\text{Matricola}} (\sigma_{\text{DataNascita} < \text{DataNascita2}} (A)))$

☐ Query4:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie (\rho_{\text{DataNascita2} \leftarrow \text{DataNascita}} (\pi_{\text{DataNascita}} (\text{STUDENTI})))$

$B = (\pi_{\text{Matricola}} (\sigma_{\text{DataNascita} < \text{DataNascita2}} (A)))$

$C = (\pi_{\text{Matricola}} (\text{STUDENTI})) - B$

☐ Query5:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie (\rho_{\text{DataNascita2} \leftarrow \text{DataNascita}} (\pi_{\text{DataNascita}} (\text{STUDENTI})))$

$B = (\pi_{\text{Matricola}} (\sigma_{\text{DataNascita} > \text{DataNascita2}} (A)))$

$C = (\pi_{\text{Matricola}} (\text{STUDENTI})) - B$

☐ Query6:

$A = \text{STUDENTI} \bowtie (\rho_{\text{DataNascita2} \leftarrow \text{DataNascita}} (\pi_{\text{DataNascita}} (\text{STUDENTI})))$

$B = (\pi_{\text{Matricola}} (\sigma_{\text{DataNascita} < \text{DataNascita2} \wedge \text{DataNascita ISNULL} (A)))$

$C = (\pi_{\text{Matricola}} (\text{STUDENTI})) - B$

☐ Query7:

$A = \rho_{\text{Matricola2}, \text{Cognome2}, \text{Nome2}, \text{DataNascita2} \leftarrow \text{Matricola}, \text{Cognome}, \text{Nome}, \text{DataNascita}} (\text{STUDENTI})$

$B = \text{STUDENTI} \bowtie A$

$C = (\sigma_{\text{DataNascita} < \text{DataNascita2}} (B))$

$D = (\pi_{\text{Matricola}} (\text{STUDENTI} - C))$