

Лекции по математическому анализу

Slava Boben

September 5, 2019

Содержание

1	Лекция 1	2
1.1	Общая информация	2
1.1.1	Контакты	2
1.1.2	Оценка	2
1.1.3	Коллоквиум	2
1.1.4	Экзамен	2
1.1.5	Литература	2
1.2	Теория пределов и непрерывных функций одной переменной	2
1.2.1	Понятие действительного числа	2
2	Семинар 1	4
2.1	Математическая индукция	4
2.2	Неравенство бернулли	4
2.3	Биномиальные коэффициенты	5
2.3.1	Бином Ньютона	5
2.4	Сумма геометрической прогрессии	5
2.5	Рациональные числа с двумя десятичными представлениями	6

1 Лекция 1

1.1 Общая информация

1.1.1 Контакты

Делицын Андрей Леонидович

- delitsyn@mail.ru
- adelistyn@hse.ru

1.1.2 Оценка

$$O_{\text{пром}} = \text{Округление} \left(\frac{1}{10} ДЗ_1 + \frac{1}{10} КР_1 + \frac{3}{10} КК_1 + \frac{5}{10} ЭКЗ_1 \right)$$
$$O_{\text{итог}} = \text{Округление} \left(\frac{1}{20} ДЗ_2 + \frac{1}{20} КР_2 + \frac{3}{20} КК_2 + \frac{5}{20} ЭКЗ_2 + \frac{10}{20} O_{\text{пром}} \right)$$
$$\text{Округление}(x) = [x]$$

1.1.3 Коллоквиум

1 балл Простая задача (например, продифференцировать функцию)

Основная часть

На подготовку к основной части дается 40 минут

1 балл Формулировка теоремы без доказательства или определение некоторого понятия

2 балла Решить задачу

4 балла Доказательство теоремы

2 балла Дополнительные вопросы

1.1.4 Экзамен

То же что и коллоквиум, за исключением первой части (один балл с нее идет в второе задание)

1.1.5 Литература

1. А. М. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин. Курс математического анализа: учеб. пособие для вузов, М.: МФТИ, 2000.
2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, СПб.: Лань, 2001.
3. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учеб. пособие для вузов, М.: АСТ: Астрель, 2004.
4. Л. Д. Кудрявцев [и др.]; Под ред. Л. Д. Кудрявцева. Сборник задач по математическому анализу: в 3 т.
5. Зорич, В. А. Математический анализ: учебник, М.: МЦНМО, 2015.

1.2 Теория пределов и непрерывных функций одной переменной

1.2.1 Понятие действительного числа

(а) *Натуральные числа*

$$\mathbb{N} = 1, 2, \dots, n, \dots$$
$$+, \times$$

(б) *Целые числа*

$$\mathbb{Z} = -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots$$
$$+, -, \times$$

Группа - множество, в котором определена операция, такая что,

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \forall b \in \mathbb{Z}, \quad \exists c \in \mathbb{Z} \\ c = a + b$$

Свойства групп:

1. $(a + b) + d = a + (b + d)$
2. $\exists 0 : a + 0 = a$
3. $\forall a \exists (-a)$
 $a + (-a) = 0$
4. $a + b = b + a$ — Коммутативная или абелева

(с) *Рациональные числа*

$$\mathbb{Q} = \frac{m}{n} \\ m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}$$

Операция сложения для рациональных чисел:

$$\frac{m}{n} + \frac{k}{l} = \frac{ml + nk}{nl}$$

Пусть есть два числа, $\forall a \in \mathbb{Q}, \forall b \in \mathbb{Q}$, для этих чисел определена операция умножения

5. $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
6. $\exists 1 : a \times 1 = a$
7. $\forall a \exists a^{-1}$
 $a \times a^{-1} = 1$
8. $a \times b = b \times a$
9. $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

Таким образом рациональные числа — это группа по сложению и за исключением нуля по умножению. Если выполняются все 9 свойств — соответствующее множество называется полем. Возникает вопрос, достаточно ли рациональных цифр?

Вспомним теорему Пифагора — $a^2 + b^2 = c^2$. Допустим, $a = 1, b = 1$, тогда $c^2 = 2$. Для нас важно то, что это число c не может быть представлено никакой рациональной дробью, давайте проверим это.

Предположим что есть $c = \frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}$. Можно считать что дробь $\frac{m}{n}$ несократима.

$$c^2 = 2 \implies \frac{n^2}{m^2} = 2 \implies m^2 = 2n^2$$

m — четное, $m = 2p$

$$4p^2 = 2n^2 \implies n^2 = 2p^2$$

n — тоже четное, $n = 2k$

Тогда поделим n на m : $\frac{m}{n} = \frac{2p}{2k}$, дробь сократима, пришли к противоречию

Получается, множества рациональных чисел не хватает чтобы взять корень из двойки.

И вот теперь, мы сделаем следующее построение, позволяющее ввести понятие вещественных чисел, и вообще говоря, измерить любой отрезок на прямой

Будет ли это множество полем? Будет, и более того, это множество позволит нам решить проблему измерения любого отрезка. А есть ли какие либо поля, которые содержат в себе поле вещественных чисел? Есть, таким полем является поле комплексных чисел. Все ли свойства вещественных чисел имеют место для комплексных чисел? Нет, вещественные числа всегда можно сравнивать.

$\forall a, b$

$$1. \begin{cases} a < b \\ b < a \\ a = b \end{cases}$$

$$2. a < b, b < c \implies a < c$$

$$3. a < b \implies \forall c : a + c < b + c$$

$$4. \forall c > 0 : a * c < b * c$$

2 Семинар 1

2.1 Математическая индукция

$$P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$$

Если 1) верно, 2) $\forall n : P_n \rightarrow P_{n+1} \implies P_n$ верно $\forall n$

$$P_1 : 3|1^1 - 1 \text{ верно}$$

$$P_n : 3|n^3 - n$$

$$P_{n+1} : 3|(n+1)^3 - (n+1) ?$$

$$\begin{aligned} (n+1)^3 - (n+1) &= n^3 + 3n^2 + 3n - n - 1 \\ &= n^3 - n + 3(n^2 + n) \end{aligned}$$

Задача 1. $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$P_1 : 1^2 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6} = 1$$

Шаг: P_n верно, тогда

$$\begin{aligned} P_{n+1} : 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n+3)(n+2)}{6} \\ &= \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6} \end{aligned}$$

2.2 Неравенство бернулли

Задача 2. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [-1; +\infty) \implies (1+x)^n \geq 1+nx$

$$P_1 : (1+x) \geq 1+1x$$

$$\begin{aligned} P_n : (1+x)^n \geq 1+nx &\xrightarrow{(1+x) \geq 0} (1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) \\ &(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x + nx^2 \\ &(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x \end{aligned}$$

Задача 3. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [-2; +\infty) \implies (1+x)^n \geq 1+nx$

$$P_1 : 1+x \geq 1+1x$$

$$P_n : (1+x)^n \geq 1+nx$$

$$\underbrace{(1+x)^{n+1}} + \underbrace{(1+x)^n} = (1+x)^n \underbrace{(1+x+1)}_{x+2 \geq 0} \geq (1+nx)(1+x+1) = \underbrace{1 + (n+1)x}_{\geq 0} + \underbrace{1 + nx(1+x)}_{\geq 0}$$

Для $x \in [-2; -1)$ выполняется $(1+x)^n \leq 1 \leq 1 + \underbrace{nx(1+x)}_{>0}$

2.3 Биномиальные коэффициенты

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$
$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

2.3.1 Бином Ньютона

Задача 4. Доказать для $a, b \neq 0$

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n b^0 + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}a^0b^n$$
$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Пусть $x = \frac{a}{b}, x \in R$

$$\frac{(a+b)^n}{b^n} = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{a^k}{b^k} \implies$$
$$\implies (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Задача 5. Доказать $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$

Докажем по индукции

$$P_1 : (1+x)^1 = 1+x = \binom{1}{0}1x^0 + \binom{1}{1}x^1$$

$$P_{n+1} : (1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) = (1+x)^n + (1+x)^n x$$
$$= x^0 + \binom{n}{1}x^1 + \binom{n}{2}x^2 + \dots + \binom{n}{n}x^n +$$
$$+ \binom{n}{0}x^1 + \binom{n}{1}x^2 + \dots + \binom{n}{n-1}x^n + x^{n+1}$$
$$= \binom{n+1}{0}x^0 + \left(\binom{n}{1} + \binom{n}{0}\right)x^1 + \left(\binom{n}{2} + \binom{n}{1}\right)x^2 + \dots + \left(\binom{n}{n} + \binom{n}{n-1}\right)x^n + x^{n+1}$$
$$= \binom{n+1}{0}x^0 + \binom{n+1}{1}x^1 + \binom{n+1}{2}x^2 + \dots + \binom{n+1}{n}x^n + \binom{n+1}{n+1}x^{n+1}$$

Задача 6. Доказать $2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$
$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1 = 2^n$$
$$x=1 \implies 2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k$$

2.4 Сумма геометрической прогрессии

$$\sum_{k=1}^n aq^{k-1} = S_n$$

$$\begin{aligned}
S_n q &= \sum_{k=1}^n a q^k = S_n - a + a q^n \\
&= \underbrace{a + a q + a q^2 + \dots + a q^{n-1}}_{S_n} + a q^n - a \implies \\
\implies (q-1) S_n &= a q^n - a \implies \\
\implies S_n &= \begin{cases} a \frac{q^n - 1}{q - 1}, & q \neq 1 \\ n a, & q = 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

2.5 Рациональные числа с двумя десятичными представлениями

$$\pi = 3.1415\dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.3333\dots$$

$$1 = 1.00000\dots 0\dots = 0.9999999\dots$$

$$\frac{9}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9}{10^3} + \dots = \frac{9}{10} \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \dots \right) = \frac{9}{10} \frac{10}{9} = 1$$