

Анализ 3

Галкина


05.09.2022

Оглавление

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Идеи и номера с практики | 5 |
| 1.1 | Знакопостоянные несобственные интегралы | 5 |
| 1.2 | Знакопеременные несобственные интегралы | 6 |
| 1.3 | Интеграл, зависящий от параметра | 15 |
| 1.4 | Несобственный интеграл, зависящий от параметра | 16 |
| 1.5 | Интегралы Эйлера | 17 |
| 2 | Несобственный интеграл | 19 |
| 2.1 | Основные определения | 19 |
| 2.1.1 | Свойства несобственного интеграла | 20 |
| 2.1.2 | Критерии сходимости несобственного интеграла | 21 |
| 2.1.3 | Признаки сравнения в предельной форме | 22 |
| 2.1.4 | Абсолютная и условная сходимость | 23 |
| 2.2 | Собственный интеграл, зависящий от параметра | 24 |
| 2.2.1 | Базовые определения | 24 |
| 2.2.2 | Несобственные интегралы, зависящие от параметра | 29 |
| 2.2.3 | Вычисление некоторых классических интегралов | 39 |
| 2.3 | Функции Эйлера | 40 |
| 2.3.1 | Гамма-функция Эйлера | 40 |
| 2.3.2 | Бета-функция | 42 |

Глава 1

Идеи и номера с практики

Идеи Тимура, достойные того, чтобы быть запечатленными. Те места, которые на слух отмечаются словами типа «финт ушами», будут отмечаться знаком «опасный поворот»  в стиле Бурбаки (а не то, что вы подумали).

1.1 Знакопостоянные несобственные интегралы

Для знакопостоянных интегралов можно использовать признак сравнения. Обычно сравнение происходит с обобщенной степенной функцией. При этом имеется два различных типа особых точек: на бесконечности и с уходом на бесконечность в точке. Разберем подробнее.

Пример 1. Интеграл

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} dx$$

сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.

Пример 2. Интеграл

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^{\alpha}} dx$$

сходится при $\alpha < 1$ и расходится при $\alpha \geq 1$.

Пример. Интеграл $\int_1^{\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 - x^2 + 1}$ сходится, поскольку подынтегральная функция эквивалентна $\frac{1}{x^2}$ - сходящейся штуке.

Пример (№2374). Исследуем на сходимость в зависимости от параметров интеграл

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$$


Имеем 2 особые точки: 1 и ∞ , поэтому разобьем область исследования на две части и будем исследовать интеграл \int_{10}^{∞} .

Нам потребуется следующий признак сравнения: для $\varepsilon > 0$

$$\frac{1}{x^\varepsilon} < \ln^\alpha(x) < x^\varepsilon, \quad x > \delta(\alpha, \varepsilon)$$

(доказательство через правило Лопиталя: действительно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^\alpha(x)}{x^\varepsilon} = 0$).
Значит, имеем

$$\frac{1}{x^{p+\varepsilon}} \leq \frac{1}{x^p \ln^q x} \leq \frac{1}{x^{p-\varepsilon}}$$



Итак, интеграл сходится при $p > 1 + \varepsilon$ и расходится при $p < 1 - \varepsilon$. Так как ε вообще-то произвольный, то и условие сходимости не должно зависеть от него; иначе говоря, интеграл сходится при $p > 1$ и расходится при $p < 1$.

Рассмотрим случай, когда $p = 1$. Имеем

$$\int_{10}^{\infty} \frac{1}{x \ln^q x} dx = \begin{cases} \ln(x) = t \\ dt = \frac{dx}{x} \end{cases} = \int_{\ln 10}^{\infty} \frac{dt}{t^q}$$

Значит, этот интеграл сходится при $q > 1$. Соберем ответ:

$$\begin{cases} 1. p > 1 - \text{сходится;} \\ 2. p < 1 - \text{расходится;} \\ 3. p = 1, q > 1 - \text{сходится;} \\ 4. p = 1, q \leq 1 - \text{расходится.} \end{cases}$$

1.2 Знакопеременные несобственные интегралы

Напомним, что для применения признаков Абеля и Дирихле в интеграле $\int_a^{\infty} f(x)g(x)dx$, необходимо, чтобы $f(x)$ и $g'(x)$ были непрерывными функциями.

Пример.

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin(x)}{x^\alpha}$$

Интеграл имеет одну особую точку: $+\infty$.

Сначала рассмотрим абсолютную сходимость: $\frac{|\sin(x)|}{x^\alpha} \leq \frac{1}{x^\alpha}$, откуда по признаку сравнения получаем, что интеграл сходится абсолютно при $\alpha > 1$.

Рассмотрим обычную сходимость: интеграл удовлетворяет признаку Дирихле, поскольку $\forall y > a : \int_a^y \sin(x) dx = -\cos(y) + \cos(a) \leq 20$ и $\frac{1}{x^\alpha} \rightarrow 0$

монотонно. Значит, интеграл сходится при $\alpha > 0$.

Теперь рассмотрим расходимость интервала. Докажем условную сходимость на $(0, 1]$. Оценим снизу удвоенным синусом:

$$\frac{|\sin(x)|}{x^\alpha} \geq \frac{\sin^2(x)}{x^\alpha} = \frac{1 - \cos(2x)}{2x^\alpha} = \frac{1}{2x^\alpha} - \frac{\cos(2x)}{2x^\alpha}$$

Вторая дробь сходится по Дирихле, откуда весь интеграл расходится абсолютно при $\alpha \leq 1$.

Осталось установить расходимость при $\alpha \leq 0$. Вспомним определение предела по Гейне:

$$\forall \{y_n\} \rightarrow 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{y_n} f(x) dx \rightarrow const$$

Тогда интеграл можно представить в виде $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_n}^{y_{n+1}} f(x) dx$. Найдем какую-нибудь последовательность, на которой будет расходимость. Итак, пусть $y_n = \pi n$.

Теперь нам потребуется следующая

Теорема 1 (о среднем)

Если $f(x)$ непрерывна и $g(x)$ знакопостоянна, тогда

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi) \cdot \int_a^b g(x) dx, \quad \xi \in (a, b)$$

Из теоремы получаем, что

$$\int_{\pi n}^{\pi n + \pi} \frac{\sin(x)}{x^\alpha} dx = \frac{1}{\xi_n^\alpha} \int_{\pi n}^{\pi n + \pi} \sin(x) dx = \frac{2 \cdot (-1)^n}{\xi_n^\alpha}$$

Тогда интеграл равен

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot (-1)^n}{\xi_n^\alpha}$$

Ряд расходится по необходимому признаку, поэтому интеграл расходится по определению Гейне.

Можно доказать то же самое по критерию Коши. Именно, при $\alpha \leq 0$:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta \exists y_1, y_2 > \delta : \left| \int_{y_1}^{y_2} \frac{\sin(x)}{x^\alpha} \right| > \varepsilon$$

Чтобы убить модули, выберем такие пределы интегрирования, на которых синус знакопостоянен. Имеем

$$\int_{2\pi n}^{2\pi n + \pi} \frac{\sin(x)}{x^\alpha} dx = \frac{1}{\xi_n^\alpha} \cdot 2, \quad 2\pi n \leq \xi_n \leq 2\pi n + \pi$$

Подставив худший вариант, получаем $\frac{2}{(2\pi n)^\alpha} \geq 2$, то есть расходимость. Соберем ответ:

$$\begin{cases} 1. \alpha > 1 - \text{сходится абсолютно;} \\ 2. 0 < \alpha \leq 1 - \text{сходится условно;} \\ 3. \alpha \leq 0 - \text{расходится.} \end{cases}$$

Поговорим про суммы. Более-менее очевидно, что если $\int_a^b f(x)dx$ и $\int_a^b g(x)dx$

сходятся, то и $\int_a^b (f(x) + g(x))dx$ сходится. Так же и для абсолютной сходимости. Так, $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$, $g(x) = -\frac{\sin(x)}{x}$ - сходятся условно, но их сумма сходится абсолютно.

Пример (№2380в). $\int_0^{\infty} x^2 \cos(e^x) dx$. Одна особая точка - ∞ . Невероятно, но он сходится, так как пики косинуса становятся всё тоньше и тоньше.



Идея: чтобы проинтегрировать, надо добавить что-то такое, что можно внести под дифференциал. Домножим и разделим подынтегральную функцию на экспоненту, получим $\frac{x^2 e^x \cos(e^x)}{e^x}$, и проинтегрируем $e^x \cos(e^x)$, а остальное выкинем из интеграла по теореме о среднем

Оценим монотонность: $(x^2 e^{-x})' = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x}$. При $x > 2$ производная отрицательна, значит, стремление к нулю монотонно. Значит, по Дирихле он сходится, так как первообразная косинуса ограничена.

Рассмотрим абсолютную сходимость:

$$|x^2 \cos(e^x)| \geq x^2 \cos^2(e^x) = \frac{x^2}{2} + \frac{x^2 2 \cos(2e^x)}{2}$$

Здесь первая дробь расходится, вторая сходится аналогично самому интегралу, то есть интеграл не сходится абсолютно.

Пример. Построим пример положительной функции, которая неограничена, но интеграл от неё сходится. Будем строить штуки с площадью $\frac{1}{2^n}$ интервалах $(n, n+1)$. Суммировав площади, получим, что интеграл сходится.



Но по определению Гейне мы должны показать сходимость при любом выборе последовательности! (а в данном случае мы взяли $x_n = n$). На самом деле, для знакоположительных функций при выборе любой последовательности пределы частичных сумм $\sum_{n=1}^k \int_n^{n+1} f(x) dx$ одинаковы!

Действительно, любую частичную сумму последовательности можно зажать между членами x_n и x_{n+1} последовательности $x_n = n$, а её предел одинаков.

Если мы возьмем знакопеременную функцию, то если она сходится при самой «плохой» последовательности, то она сходится при любой другой последовательности. Причем самая плохая последовательность состоит из тех точек, где функция меняет знак. Имеет место следующая

Теорема 2 Если $f(x)$ — знакопеременная функция и $\{x_n\}$ — последовательность, состоящая из точек, где функция меняет знак, то из сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx$ следует сходимость $\int_1^{\infty} f(x) dx$

Геометрический смысл: при данном выборе последовательности отрицательные и положительные члены имеют наибольший возможный размер.

Пример (№2380а) $\int_0^{\infty} x^p \sin(x^q) dx$, $q \neq 0$. Две особые точки: 0 и ∞ .

Рассмотрим сначала на бесконечности.

1. Если $q < 0$, то интеграл знакостоянный:

$$x^p \sin(x^q) \sim x^{p+q}$$

Значит, интеграл сходится при $p + q < -1$.

2. Теперь займемся ситуацией, когда $q > 1$, и интеграл знакопеременный. Применим идею идею из предыдущего номера: домножим сверху и снизу на какую-нибудь штуку, в данном случае qx^{q-1} . Получим

$$\frac{x^p \sin(x^q) \cdot qx^{q-1}}{qx^{q-1}} = -\frac{x^{p-q+1}}{q} \cdot (\cos(x^q))'$$

Эта штука сходится по Дирихле при $p - q + 1 < 0$, так как $-\frac{1}{q}x^{p-q+1}$ монотонно стремится к нулю.

3. Рассмотрим абсолютную сходимость:

$$|x^p \sin(x^q)| \leq x^p$$

Сходится абсолютно при $p < -1$.

4. Рассмотрим ситуацию, когда $-1 < p \leq -1 + q$. Докажем, что здесь сходимость условная.

$$|x^p \sin(x^q)| \geq x^p \sin^2(x^q) = \frac{x^p}{2} - \frac{x^p \cos(2x^q)}{2}$$

Первая дробь расходится, вторая дробь сходится при $p - q + 1 < 0$ по аналогии с самим интегралом. Значит, интеграл не сходится абсолютно.

5. Докажем, что интеграл расходится при $p \geq -1 + q$. Рассмотрим последовательность, из точек, где синус меняет знак, и, согласно теореме,

оценим интеграл рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{(\pi n)^{\frac{1}{q}}}^{(\pi n + \pi)^{\frac{1}{q}}} x^p \sin(x) dx$. Заметим, что $(\pi n)^{\frac{1}{q}} \rightarrow \infty$.

Снова домножим на qx^{q-1} . Тогда

$$\frac{1}{q} \xi_n^{p-q+1} \int_{(\pi n)^{\frac{1}{q}}}^{(\pi n + \pi)^{\frac{1}{q}}} \sin(x^q) qx^{q-1} dx = \frac{1}{q} \xi_n^{p-q+1} (-\cos(x^q)) \Big|_{(\pi n)^{\frac{1}{q}}}^{(\pi n + \pi)^{\frac{1}{q}}} = \frac{2(-1)^{n+1}}{q} \xi_n^{p-q+1}$$

Значит, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{q} \xi_n^{p-q+1}$ расходится по необходимому признаку, так

как $\xi_n^{p-q+1} \geq (\pi n)^{\frac{p-q+1}{q}} \rightarrow \infty$.

Теперь рассмотрим интеграл в нуле.

$$\int_0^1 x^p \sin(x^q) dx = \begin{cases} t = \frac{1}{x} \\ dt = -\frac{dx}{x^2} \\ 0 \mapsto \infty \\ 1 \mapsto 1 \end{cases} = \int_1^{\infty} \frac{1}{t^{p+2}} \sin\left(\frac{1}{t^q}\right) dt$$

Получили ситуацию один в один, только вместо p и q будет $p + 2$ и $-q$.

Пример (№2373). $\int_0^{\infty} \frac{\sin(\ln(x))}{\sqrt{x}} dx$. Сначала исследуем в нуле:

$$\left| \frac{\sin \ln(x)}{\sqrt{x}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

значит, сходится абсолютно.

Теперь исследуем на сходимость на бесконечности. Так как $(\cos \ln(x))' = -\frac{\sin \ln(x)}{x}$, представим функцию в виде $\frac{\sin \ln(x)}{x} \cdot \sqrt{x}$ и возьмем худшую последовательность $x_n = e^{\pi n}$:

$$\begin{aligned} \int_{e^{\pi n}}^{e^{\pi n + \pi}} \frac{\sin \ln(x)}{x} \cdot \sqrt{x} dx &= \sqrt{\xi_n} \cdot \int_{e^{\pi n}}^{e^{\pi n + \pi}} \frac{\sin \ln(x)}{x} dx = \sqrt{\xi_n} \cdot (\cos \ln(x)) \Big|_{e^{\pi n}}^{e^{\pi n + \pi}} = \\ &= \sqrt{\xi_n} (-1)^{-1} \cdot 2 \rightarrow \infty \end{aligned}$$

- интеграл расходится.

Пример (из Кудрявцева). $\int_0^{\infty} \sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) \frac{dx}{\sqrt{x}}$. Имеем две особые точки: 0 и ∞ . Рассмотрим в нуле и уберем синус оценкой:

$$\sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

сходится абсолютно.



На бесконечности: разложим синус в ряд Тейлора до такого члена, который в итоге будет сходиться абсолютно:

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}} - \frac{\sin^3 x}{3!x^{\frac{3}{2}}} + o\left(\frac{\sin^3 x}{x^{\frac{3}{2}}}\right) \right) = \frac{\sin x}{x} - \frac{\sin^3 x}{3!x^{\frac{5}{2}}} + o\left(\frac{\sin^3 x}{x^2}\right)$$

Первая дробь сходится условно по Дирихле, вторая дробь сходится абсолютно, о-малое от абсолютно сходящейся функции сходится абсолютно, поэтому все вместе сходится условно.

Пример. $\int_2^{\infty} \sqrt{x} \ln\left(1 - \frac{\sin x^2}{x-1}\right) dx$. Одна особая точка - бесконечность.

Разложим логарифм в ряд Тейлора:

$$\sqrt{x} \left(\frac{\sin x^2}{x-1} - \frac{\sin^2 x^2}{2(x-1)^2} + o\left(\frac{\sin^2 x^2}{(x-1)^2}\right) \right) = \frac{\sqrt{x} \sin x^2}{x-1} - \frac{\sqrt{x} \sin^2 x^2}{2(x-1)^2} + o\left(\frac{\sin^2 x^2}{(x-1)^2}\right)$$

Первый член оценим по теореме о среднем, домножив на производную аргумента синуса:

$$\frac{2x\sqrt{x}\sin x^2}{2x(x-1)} = \frac{\sqrt{x}(-\cos x^2)'}{2x(x-1)}$$

Косинус ограничен, все остальное монотонно стремится к нулю (можно взять производную и убедиться в этом), значит, первый член сходится условно по Дирихле. Теперь докажем, что абсолютно он расходится:

$$\left| \frac{\sqrt{x}\sin x^2}{x-1} \right| \geq \frac{\sqrt{x}\sin^2 x^2}{|x-1|} = \frac{\sqrt{x}}{|x-1|} \cdot \frac{(1-\cos 2x^2)}{2} = \frac{\sqrt{x}}{2|x-1|} - \frac{\sqrt{x}\cos 2x^2}{2|x-1|}$$

Вторая дробь сходится аналогично предыдущему пункту, первая дробь расходится, значит, все вместе абсолютно расходится.

Теперь рассмотрим второй член разложения логарифма в ряд Тейлора:

$$\left| \frac{\sqrt{x}(-\sin^2 x^2)}{2(x-1)^2} \right| \leq \frac{\sqrt{x}}{2(x-1)^2} \sim \frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}}$$

Итак, второй член сходится абсолютно, значит, и о-малое от него сходится абсолютно. Так как первый член сходится условно, то интеграл сходится условно.

Пример. $\int_0^{\infty} \frac{\sin(x+x^2)}{x^\alpha} dx$. Имеем две особые точки: 0 и ∞ .

1. Исследуем на сходимость в нуле:

$$\frac{\sin(x+x^2)}{x^\alpha} \sim \frac{1+x}{x^{\alpha-1}} \sim \frac{1}{x^{\alpha-1}}$$

сходится при $\alpha < 2$.

2. Исследуем на бесконечности. Начнем с абсолютной сходимости (обычная оценка сверху):

$$\left| \frac{\sin(x+x^2)}{x^\alpha} \right| \leq \frac{1}{x^\alpha}$$

- сходится абсолютно при $\alpha > 1$.

Исследуем на обычную сходимость. Домножим на производную аргумента косинуса:

$$\frac{(1+2x)\sin(x+x^2)}{(1+2x)x^\alpha} = \frac{(-\cos(x+x^2))'}{(1+2x)x^\alpha} = \frac{(-\cos(x+x^2))'}{x^{\alpha+1}} \cdot \frac{1}{2+\frac{1}{x}}$$

Заметим, что первая дробь сходится по признаку Дирихле при $\alpha+1 > 0$, а вторая монотонна и ограничена, значит, все выражение сходится по

признаку Абеля при $\alpha > -1$.

Теперь докажем, что ряд расходится абсолютно при $\alpha \in (-1, 1]$; оценим квадратом синуса, перейдем к косинусу и понизим степень:

$$\frac{|\sin(x + x^2)|}{x^\alpha} \geq \frac{1 - \cos(2x + 2x^2)}{2x^\alpha} = \frac{1}{2x^\alpha} - \frac{\cos(2x + 2x^2)}{2x^\alpha}$$

Первая дробь расходится, вторая сходится по Дирихле, значит, интеграл расходится.

Докажем расходимость при $\alpha \leq -1$. Используем для этого ряд из нулей синуса. Корни синуса найдем из уравнения $x^2 + x = \pi n$. Так как мы рассматриваем интеграл на $+\infty$, то нам нужен только положительный корень: обозначим его $\sigma(n) = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\pi n}}{2}$. В ряду домножим на производную аргумента синуса и применим теорему о среднем:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\sigma(n)}^{\sigma(n+1)} \frac{(1 + 2x) \sin(x + x^2)}{(1 + 2x)x^\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + 2\xi_n)\xi_n^\alpha} \int_{\sigma(n)}^{\sigma(n+1)} (-\cos(x + x^2))' dx$$

Интеграл от производной косинуса в нулях синуса равен $2 \cdot (-1)^n$, значит, общий член ряда имеет вид и оценивается по верхней границе

$$\frac{2 \cdot (-1)^n}{(1 + 2\xi_n)\xi_n^\alpha} \geq \frac{1}{(2\sigma(n + 1) + 1)(\sigma(n))^\alpha}$$

(мы взяли разные σ , поскольку мы хотим оценить снизу, а $\alpha < 0$). Подставляя значение корня, получаем расходимость ряда, и, как следствие, расходимость интеграла.

Итак, соберем ответ: в нуле сходится при $\alpha < 2$, на бесконечности сходится абсолютно на $(1, \infty)$, сходится на $(-1, 1]$, расходится на $(-\infty, -1]$.

Пример. $\int_1^{\infty} x^\alpha \sin \sin x dx$. Одна особая точка - бесконечность. Абсолютная сходимость очевидна:

$$|x^\alpha \sin \sin x| \leq x^\alpha$$

- сходится при $\alpha < -1$.

Чтобы исследовать обычную сходимость, надо доказать ограниченность первообразной от $\sin \sin x$. Сделаем это через ряды (потому что через домножение на интегрирующий множитель не получится):

$$\int_0^y \sin \sin x dx = \int_0^{\pi} \dots + \int_{\pi}^{2\pi} \dots + \dots + \int_{2\pi k}^y \dots$$

где $k = \left\lfloor \frac{y}{2\pi} \right\rfloor$. Чтобы получить оценку, не зависящую от y , докажем, что сумма всех интегралов, кроме последнего, равна нулю:

$$\int_{2\pi k}^{2\pi k+\pi} \sin \sin x dx + \int_{2\pi k+\pi}^{2\pi k+2\pi} \sin \sin x dx = \begin{cases} t = t + \pi \\ dx = dt \end{cases} =$$

Введем эту замену, чтобы привести второй интеграл к тем же пределам и сделать его отрицательным:

$$= \int_{2\pi k}^{2\pi k+\pi} \sin \sin x dx + \int_{2\pi k}^{2\pi k+\pi} \sin \sin(t+\pi) dt = \int_{2\pi k}^{2\pi k+\pi} \sin \sin x dx + \int_{2\pi k}^{2\pi k+\pi} \sin(-\sin t) dt = 0$$

Оценим последний интеграл:

$$\left| \int_{2\pi k}^y \sin \sin x dx \right| \leq \int_{2\pi k}^y |\sin x| dx \leq \int_{2\pi k}^y 1 dx = y - 2\pi k \leq 2\pi$$

Значит, интеграл сходится по Дирихле при $\alpha < 0$.

Докажем (обычную) расходимость при $\alpha \geq 0$. Снова используем ряды, но на этот раз будем использовать теорему о среднем:

$$\int_{\pi n}^{\pi n+\pi} x^\alpha \sin \sin x dx = \xi_n^\alpha \cdot \int_{\pi n}^{\pi n+\pi} \sin \sin x dx = \xi_n^\alpha (-1)^n \int_0^\pi \sin \sin x dx$$

Интеграл $\int_0^\pi \sin \sin x dx$ не зависит от n и положителен, обозначим его значение за β . Тогда общий член ряда имеет вид

$$\xi_n^\alpha \cdot (-1)^n \cdot \beta \geq (\pi n + \pi)^\alpha \cdot (-1)^n$$

то есть ряд расходится по необходимому признаку, и сам интеграл расходится.

Наконец, докажем абсолютную расходимость при $\alpha \in [-1, 0)$. Она устанавливается аналогично: так как

$$\int_{\pi n}^{\pi n+\pi} |\sin \sin x| dx = \int_0^\pi |\sin \sin x| dx = \beta$$

то общий член ряда имеет вид $\xi_n^\alpha \beta$. Подставляя оценку $\xi_n = \pi n + \pi$, имеем расходимость ряда и соответственно расходимость Мы интеграла. Соберем ответ: интеграл абсолютно сходится при $\alpha \in (-\infty, -1)$, сходится условно при $\alpha \in [-1, 0)$, расходится при $\alpha \in [0, \infty)$.

1.3 Интеграл, зависящий от параметра

Будем рассматривать интеграл $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$, $y \in [c, d]$. Мы будем использовать следующие нумерованные теоремы:

Th 1. Из непрерывности f следует непрерывность F на $(c, d]$;

Th 2. F можно интегрировать по y и переставлять интегралы местами;

Th 3. Если f и f'_y непрерывны на $[a, b] \times [c, d]$, тогда $F'(y) = \int_a^b f'_y(x, y) dx$;

Th 4.

Пример (№3713в). Найти $\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^2 x^2 \cos ax \, dx$. Сначала интегрируем по частям:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{1}{a} \sin ax \cdot x \Big|_0^2 - \frac{1}{a} \int_0^2 \sin ax \, dx \right) = \lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin 2a}{a} + \frac{1}{a^2} \cos ax \Big|_0^2 \right) = 4 - 2 = 2$$

С другой стороны, так как $\lim_{a \rightarrow 0} \cos ax = 1$, то по теореме 1 получаем

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^2 x \cos ax \, dx = \int_0^2 x \, dx = 2$$

Пример (№3715). Найти $\lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{x}{y^2} e^{-\frac{x^2}{y^2}} dx$. Функция не определена при $y = 0$, однако, посчитав предел по Лопиталю, можно увидеть, что предел в нуле равен нулю. Доопределим функцию нулем при $y = 0$ и поехали интегрировать. Заметим, что $(e^{-\frac{x^2}{y^2}})' = -\frac{2x}{y^2} e^{-\frac{x^2}{y^2}}$, поэтому

$$\lim_{y \rightarrow 0} -\frac{1}{2} \int_0^1 -\frac{2x}{y^2} e^{-\frac{x^2}{y^2}} dx = \lim_{y \rightarrow 0} -\frac{1}{2} e^{-\frac{x^2}{y^2}} \Big|_0^1 = \lim_{y \rightarrow 0} -\frac{1}{2} (e^{-\frac{1}{y^2}} - 1) = \frac{1}{2}$$



Но если бы мы воспользовались теоремой 1, то получили бы другой ответ! Противоречие лишь кажущееся, так как для выполнения условий теоремы 1 необходима непрерывность по двум переменным (то есть по всем путям, ведущим нулю). Доопределив функцию нулем, мы сделали её непрерывной по оси Y .

Пример (№3734). $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctg(\alpha \cdot tgx)}{tgx} dx$. Пусть $f(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctg(\alpha \cdot tgx)}{tgx} dx$.

Функция не определена в нуле и в $\frac{\pi}{2}$, поэтому она не непрерывна. Чтобы добить непрерывность, доопределим функцию:

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} r!!!!!!!!!!!!et \\ \alpha_0, & x = 0 \\ 0, & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

По теореме 3 можно дифференцировать, тогда

$$f'_\alpha = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x \, dx}{(1 + (\alpha \cdot tgx)^2) \cos^2 x} = \int_0^\infty \frac{du}{(1 + (\alpha u)^2)(1 + u^2)}$$

Берем по частям:

$$\frac{\alpha}{\alpha^2 - 1} \int_0^\infty \frac{d(\alpha u)}{1 + (\alpha u)^2} - \frac{1}{\alpha^2 - 1} \int_0^\infty \frac{du}{1 + u^2} =$$

Пример №3737. $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$, $a, b > 0$. Заметим, что $(x^b)'_b = x^b \ln x$,

откуда $\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^y dy$. Интеграл можно менять местами:

$$\int_0^1 dx \int_a^b x^y dy = \int_a^b (\int_0^1 x^y dx) dy = \int_a^b \frac{dy}{y+1} = \ln(y+1) \Big|_a^b = \ln \left(\frac{b+1}{a+1} \right)$$

Заметим, что теорему применять можно при ????

1.4 Несобственный интеграл, зависящий от параметра

Доказать равномерную сходимость на $0, a \leq \alpha \leq b$, обычную сходимость

$$0 \leq \alpha \leq b \quad I = \int_0^\infty \alpha e^{-\alpha x} dx$$

Пример (№3755.2) $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha} \quad 1 < \alpha_0 \leq \alpha < \infty \quad 1 < \alpha < \infty$

Пример (№37??) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x-\alpha)^2+1}$ $0 \leq \alpha < \infty$. Не сходится равномерно, ибо арктангенс (если взять интеграл) имеем максимум в нуле.

1.5 Интегралы Эйлера

Надо запомнить всего лишь 4 формулы. Основная идея - делание замен для того, чтобы попасть в пределы интегрирования.

$$\text{№3843} \int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx = B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma(3/2)\Gamma(3/2)}{\Gamma(3)} = \frac{1}{8}\pi$$

№3849 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}}$. Сведем к бета-функции заменой $t = 1 - x^n$, $dx = -\frac{1}{n}(1-t)^{\frac{1}{n}-1}dt$. Имеем

$$\int_0^1 t^{\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{n} \cdot (1-t)^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n} B\left(-\frac{1}{n} + 1, \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \frac{\pi}{\sin \pi n}$$

№3851 $\int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x^n} dx$. Сделаем замену, чтобы подогнать пределы интегрирования под бета-функцию. Замена $t = \frac{1}{1+x^n}$. Пределы пересчитаются, тогда интеграл равен

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{\frac{m-1}{n}} t \frac{1}{n} \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{\frac{1}{n}-1} \frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{n} \int_0^1 \left(\frac{1}{n} - 1\right)^{\frac{m-n}{n}} \frac{1}{t} dt$$

!!!!!!

№3856

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx = \begin{cases} \sin x = t \\ dt = \cos x dx \\ \cos x = \sqrt{1-t^2} \end{cases} = \int_0^1 t^m (1-t^2)^{\frac{n-1}{2}} dt =$$

$$\begin{cases} u = t^2 \\ du = 2t dt \end{cases} = \frac{1}{2} \int_0^1 u^{\frac{m-1}{2}} (1-u)^{\frac{n-1}{2}} du$$

Пример из Кудрявцева. $\int_{-2}^2 \frac{dx}{-2\sqrt[4]{(2+x)^3(2-x)}}$. Замена $t = 2+x$. Имеем

$\int_0^4 \frac{dt}{t^{\frac{3}{4}}(4-t)^{\frac{1}{4}}}$. Вынесем четверку, делая замену $u = \frac{t}{4}$. Тогда

$$\frac{4}{4^{\frac{1}{4}} \cdot 4^{\frac{3}{4}}} \int_0^1 \frac{du}{u^{\frac{3}{4}}(1-u)^{\frac{1}{4}}} = B\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \pi\sqrt{2}$$

Пример посложнее. $\int_1^2 \sqrt{\frac{x-1}{2-x}} \frac{dx}{(x+3)^2}$. Сначала избавляемся от второго множителя, делая замену $t = \frac{1}{x+3}$. Тогда $-\int_{1/4}^{1/5} \sqrt{\frac{\frac{1}{t}-4}{5-\frac{1}{t}}} dt = \int_{\frac{1}{5}}^{\frac{1}{4}} \sqrt{\frac{1-4t}{5t-1}} dt$. Теперь замена $u = 4(5t-1)$:

$$\frac{1}{20} \int_0^1 \sqrt{\frac{4(1-u)}{5u}} du = \frac{\sqrt{4}}{20\sqrt{5}} B\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\pi}{20\sqrt{5}}$$

Пример (№3863). $\int_0^\infty \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx$. Сначала посчитаем интеграл без логарифма:

$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \begin{cases} t = \frac{1}{1+x} \\ dx = -\frac{1}{t^2} dt \end{cases} = \int_0^1 \frac{(\frac{1}{t}-1)^{p-1}}{\frac{1}{t}} \frac{1}{t^2} dt = \int_0^1 (1-t)^{p-1} t^{-p} dt$$

Значение этого интеграла $B(1-p, p) = \frac{\pi}{\sin \pi p}$



Как убить логарифм? Возьмем производную от функции по параметру: $f'_p = \left(\frac{\pi}{\sin \pi p}\right)' = -\frac{\cos \pi p}{\sin^2 \pi p} \pi^2$. Дифференцировать можно, потому что интеграл сходится равномерно.

пример. о

Глава 2

Несобственный интеграл

2.1 Основные определения

Определение 1 Пусть функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$ для всех $b > a$. Тогда **несобственный интеграл первого рода** (с одной особой точкой) - предел

$$\int_a^{\infty} f(x) dx := \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

Если таковой предел существует, то интеграл сходится; если предел равен бесконечности или не существует, то интеграл расходится. Аналог определяется и интеграл с нижним пределом $-\infty$.

Определение 2 Пусть $\forall \varepsilon > 0$ функция f интегрируема на $[a + \varepsilon, b]$, и $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$. Тогда **несобственный интеграл второго рода** (с особой точкой a) - предел

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

Пример. $\int_0^1 \ln x dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{\varepsilon}^1 \ln x dx \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(x \ln x \Big|_{\varepsilon}^1 - \int_{\varepsilon}^1 dx \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \frac{-\varepsilon^2}{1/\varepsilon} - 1 = -1$ - интеграл сходится.

Если на некотором промежутке интеграл имеет конечное число особых точек, то всегда можно разбить промежуток на такие области, в которых каждый интеграл имеет лишь одну особую точку. Говорят, что

интеграл **сходится, если он сходится на в каждой особой точке!**

Так, $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ расходится при любом p , так как он расходится хотя бы на одном из промежутков $(0, 1)$ или $[1, \infty)$.

Будем обозначать интегрируемость в смысле несобственного интеграла как $f \in \tilde{R}$.

Теорема 3 (формула Ньютона-Лейбница)

Пусть $f \in \tilde{R}[a, b)$, b - особая точка первого или второго рода, и на этом интервале существует функция $F(x)$ - первообразная для f . Тогда

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

где $F(b) = \lim_{x \rightarrow b} f(b)$

Доказательство. \square

Определение 3 Пусть a, b - особые точки промежутка $\langle a, b \rangle$ Интеграл в смысле главного значения («*valeur principale*») -

$$v.p. \int_a^b = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_a^{\omega-\varepsilon} f(x)dx + \int_{\omega+\varepsilon}^b f(x)dx \right)$$

где $\omega \in (a, b)$ - особая точка.

Пример. $v.p. \int_0^2 \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln 3$

2.1.1 Свойства несобственного интеграла

1. Пусть $f \in \tilde{R}[a, \infty)$, $g \in \tilde{R}[a, \infty)$. Тогда $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \lambda f + \mu g \in \tilde{R}[a, \infty)$. (линейность).
2. Пусть $f \in \tilde{R}[a, \infty)$, $g \in \tilde{R}[a, \infty)$ и $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \geq a$. Тогда $\int_a^{\infty} f(x)dx \leq \int_a^{\infty} g(x)dx$.
3. Формула замены переменной.

Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi: \langle \alpha, \beta \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$, причем $\varphi(a) = a$, $\varphi(\beta) = b$, φ возрастает и у неё существует и непрерывна производная на $\langle \alpha, \beta \rangle$.

Тогда $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)dx = \int_a^b f(t)dt$.

4. Формула интегрирования по частям.

Пусть производные u, v существуют и непрерывны на промежутке

$$a, b. \text{ Тогда } \int_a^b u'v dx + \int_a^b v'u dx = uv \Big|_a^b.$$

2.1.2 Критерии сходимости несобственного интеграла

Теорема 4 (критерий Коши)

Пусть $\forall b \geq a$ функция интегрируема на $[a, b]$. Тогда $\int_a^\infty f(x)dx$ сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists b_0(\varepsilon) > 0 \forall b_1, b_2 > b_0 : \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)dx \right| < \varepsilon$

Доказательство. По условию, существует предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) = A \in \mathbb{R}$,

где $F(b) = \int_a^b f(x)dx$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда из существования предела следует для $\frac{\varepsilon}{2}$: $\exists b_0(\varepsilon) > a : |F(b) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. Пусть $b_1 > b_0, b_2 > b_0$. Тогда $|F(b_2) - F(b_1)| = |F(b_2) - A| + |F(b_1) - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Достаточность. Докажем существование предела $\lim_{b \rightarrow \infty} F(b)$ из определения предела по Гейне. Пусть $b_n \rightarrow \infty$, тогда $\forall b_0 > a \exists n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n > n_0$ Покажем, что предел не зависит от выбора последовательности b_n . Выберем другую последовательность b_n^* . Обозначим предел $\lim_{n \rightarrow \infty} F(b_n^*) = B$. Составим последовательность $b_1, b_1^*, b_2, b_2^*, \dots \rightarrow \infty$. Тогда предел F от этой последовательности обозначим как C . Так как пределы подпоследовательностей сходятся к пределу последовательности, то $A = B = C$. Значит, выполняется условие определения предела по Гейне, значит, интеграл сходится. \square

Пример. $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ сходится при $\alpha > 0$, расходится при $\alpha \leq 0$. Докажем это.

1. $\alpha > 0$. Поехали: $\forall \varepsilon > 0 \exists b_0(\varepsilon) > 1 \forall b_1 > b_0, b_2 > b_0 : \left| \int_{b_1}^{b_2} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| < \varepsilon$.

Доказываем: $\left| \int_{b_1}^{b_2} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| = \left| \int_{b_1}^{b_2} \frac{1}{x^\alpha} d \cos x \right| = \left| \frac{\cos x}{x^\alpha} \right|_{b_1}^{b_2} - \int_{b_1}^{b_2} \cos x d\left(\frac{1}{x^\alpha}\right) \leq \dots \leq \frac{4}{b_0^\alpha}$. Значит, $b_0 > \left(\frac{4}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$.

2. $\alpha \leq 0$. Синус теперь принимает разные знаки. Пусть $b_k = 2\pi k$. Тогда по критерию Коши интеграл расходится.

Теорема 5 (критерий сходимости через остаток)

Пусть $\int_a^\infty = \int_a^b + \int_b^\infty, (b > a)$.

1. Если интеграл сходится, то и любой из его остатков сходится.

2. Если хотя бы один из остатков сходится, то интеграл сходится.

Доказательство. Интеграл посередине - число, поэтому от него ничего не зависит. \square

Теорема 6 (*критерий сходимости несобственного интеграла от несобственной функции*)

Пусть $\forall b > a$ функция интегрируема на $[a, b]$ и неотрицательная. Тогда $\int_a^\infty f(x)dx$ сходится \Leftrightarrow первообразная $F(b) < M$ ограничена.

Доказательство. Пусть $a < b_1 < b_2$. Имеем

$$F(b_2) = \int_a^{b_2} f(x)dx = \int_a^{b_1} f(x)dx + \int_{b_1}^{b_2} f(x)dx = F(b_1) + \int_{b_1}^{b_2} f(x)dx$$

откуда $F(b_2) - F(b_1) = \int_{b_1}^{b_2} f(x)dx \geq 0$. Значит, $F(b)$ неубывает и ограничена сверху. Значит, существует предел $\lim_{b \rightarrow \infty} F(b)$, и интеграл сходится. Обратно, пусть существует конечный предел $\lim_{b \rightarrow \infty} F(b)$, то $F(b)$ ограничена в некоторой окрестности бесконечности U . Тогда существует такое $b_0 > a \forall b \geq b_0 : F(b) \leq M$. Значит, $F(b)$ ограничена. Если $b^* < b_0$, то $F(b^*) < F(b_0)$. Итак, F ограничена. \square

2.1.3 Признаки сравнения в предельной форме

В данном разделе признаки работают для неотрицательных функций.

Теорема 7 (*признак сравнения*)

Пусть $f(x) > g(x) > 0$ начиная с некоторого $x > a$, и для любого $b > a$ функции интегрируемы на $[a, b]$. Тогда

1. Если $\int f(x)$ сходится, то и $\int g(x)$ сходится.
2. Если $\int g(x)$ расходится, то и $\int f(x)$ расходится.

Доказательство. 1. Обозначим $F(b) = \int_a^b f(x)dx$ и $G(b) = \int_a^b g(x)dx$.

По условию, интеграл сходится, поэтому $F(b) \leq M$. По свойству определенного интеграла, $F(b) \leq G(b)$, поэтому $G(b)$ также ограничена и сходится по предыдущему критерию.

2. Аналогично. \square

Теорема 8 (*второй признак сравнения*)

Если $\frac{f(x)}{g(x)} = k, \infty \neq k \neq 0$, то их интегралы сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Пусть $k > 0$. Тогда для

$$\varepsilon > \frac{k}{2} \exists b_0 > a \forall x > b_0 : \frac{k}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3k}{2}$$

Значит, $f(x) < \frac{3k}{2}g(x)$, и из сходимости интеграла от $g(x)$ следует сходимость интеграла от $f(x)$. С другой стороны, $\frac{k}{2}g(x) < f(x)$, поэтому из сходимости интеграла от $f(x)$ следует сходимость интеграла от $g(x)$. \square

Следствие. Если $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow \infty$, то интегралы сходятся или расходятся одновременно.

2.1.4 Абсолютная и условная сходимость

Определение 4 Интеграл сходится абсолютно, если сходится интеграл от модуля.

Очевидно, из абсолютной сходимости следует обычная.

Теорема 9 (признак Дирихле)

Пусть:

1. $f \in C[a, \infty)$ (и существует интеграл $F(b) = \int_a^b f(x)dx$);
2. $\exists M = \text{const} \forall b \geq a : |f(b)| \leq M$;
3. $g'(x) \in C[a, \infty)$;
4. $g'(x)$ знакопостоянна;
5. $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$;

Тогда $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ сходится условно.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда из условия 5 для

$$\frac{\varepsilon}{4M} \exists b_0 > a \forall x > b_0 : |g(x)| < \frac{\varepsilon}{4M}$$

Возьмем произвольные $b_1, b_2 > b_0$, тогда

$$\int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x)dx > \int_{b_1}^{b_2} g(x)df(x) = g(x)f(x)\Big|_{b_1}^{b_2} - \int_{b_1}^{b_2} F(x)g'(x)dx = ???$$

Итак,

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x)dx \right| \leq |g(b_2)| \cdot |F(b_2)| + |g(b_1)| \cdot |F(b_1)| + |F(\xi)| \cdot |g(b_2)| + |f(\xi)| \cdot |g(b_1)| \leq \frac{4M \cdot \varepsilon}{4M}$$

□

Теорема 10 (признак Абеля)*Пусть:*

1. $f \in C[a, \infty)$ (и существует интеграл $F(b) = \int_a^b f(x)dx$);
2. $g'(x) \in C[a, \infty)$;
3. $g'(x)$ знакопостоянна;
4. $\exists M = \text{const} \forall x \geq a : |g(x)| \leq M$ Тогда $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ сходится условно.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда из условия 2 по критерию Коши для

$$\frac{\varepsilon}{2M} \exists b_0 > a \forall b_1, b_2 > b_0 : \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2M}$$

????????????????

По критерию Коши,

$$\begin{aligned} \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x)dx \right| &\leq g(b_2) \cdot \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)dx \right| + |g(b_1)| \cdot \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)dx \right| \leq \\ &\leq M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} \cdot 2 = \varepsilon \quad \square \end{aligned}$$

2.2 Собственный интеграл, зависящий от параметра

2.2.1 Базовые определения

Определение 5 Пусть функция $f(x, y)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a(y), b(y)]$ при любом значении параметра $y \in Y$. Тогда соб-

ственный интеграл - $F(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y)dx$.

Теорема 11 (о непрерывности собственного интеграла, зависящего от параметра)

Пусть

1. $f(x, y)$ определена на $D = [a(y), b(y)] \times [c, d] = X \times Y$;
2. $a(y), b(y)$ непрерывны на $[c, d]$;

Тогда $F(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx$ непрерывна на $[c, d]$.

Доказательство. Покажем, что $\forall y_0 \in [c, d] : \lim_{y \rightarrow y_0} F(y) = F(y_0)$. Сделаем линейную замену $x = a(y) + (b(y) - a(y))t$, $dx = (b(y) - a(y))dt$. Тогда

$$F(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx = \int_0^1 f(a(y) + (b(y) - a(y))t, y) \cdot (b(y) - a(y)) dt$$

Обозначим $g(t, y) = f(a(y) + (b(y) - a(y))t, y) \cdot (b(y) - a(y))$. Эта функция непрерывна на $P = [0, 1] \times [c, d]$. Это множество - компакт, поэтому если функция непрерывна на компакте, то она и равномерно непрерывна на нем:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (t_1, y_1), (t_2, y_2) \in P : \sqrt{(t_2 - t_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} < \delta \implies \\ \implies |g(t_1, y_1) - g(t_2, y_2)| < \varepsilon \end{aligned}$$

Это означает, что

$$\begin{aligned} |F(y) - F(y_0)| &= \left| \int_0^1 (g(t, y) - g(t, y_0)) dt \right| \leq \int_0^1 |g(t, y) - g(t, y_0)| \leq \\ &\leq \varepsilon \cdot \int_0^1 dt = \varepsilon \end{aligned}$$

Этим доказано, что если $|y - y_0| < \delta$, то и $|g(t, y) - g(t, y_0)| < \varepsilon$, то есть $\lim_{y \rightarrow y_0} F(y) = F(y_0)$. \square

Теорема 12 (о предельном переходе под знаком собственного интеграла, зависящего от параметра)

Пусть

1. $f(x, y)$ определена и непрерывна на $D = [a(y), b(y)] \times [c, d]$;

2. $a(y), b(y) \in C[c, d]$;

Тогда

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx = \int_{\lim_{y \rightarrow y_0} a(y)}^{\lim_{y \rightarrow y_0} b(y)} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \int_{a(y_0)}^{b(y_0)} f(x, y_0) dx$$

Доказательство. Доказано в предыдущей теореме. \square

Теорема 13 (о дифференцируемости собственного интеграла, зависящего от параметра/ правило Лейбница)

Пусть $f(x, y)$

1. непрерывна на $P = [a, b] \times [c, d]$;

2. $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ непрерывна на P ;

Тогда:

1. $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ дифференцируема на $[c, d]$; 2. $F'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$

Доказательство. Пусть $y \in [c, d]$, $y + h \in [c, d]$. Рассмотрим $F(y + h) - F(y) = \int_a^b (f(x, y + h) - f(x, y)) dx$, значит, по теореме Лагранжа

это равно $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y + \theta h) h dx$, где $\theta \in (0, 1)$. Дифференцируем: $F'(y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(y+h) - F(y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y + \theta h) dx$. При $h \rightarrow 0$ делаем замену $u = y + \theta h$, $u \rightarrow y$. Тогда предел $\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, u) dx =$ по теореме о предельном

переходе $= \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$ \square

Следующая теорема обобщает правило Лейбница:

Теорема 14 (обобщенное правило Лейбница)

Пусть $f(x, y)$ непрерывна на $D = \{(x, y) \mid a(y) \leq x \leq b(y), c \leq y \leq d\}$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ непрерывна на D и $a'(y), b'(y)$ непрерывны на $[c, d]$. Тогда

$F(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx$ дифференцируема на $y \in [c, d]$, причем $F'(y) =$

$$\int_{a(y)}^{b(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx + f(b(y), y) \cdot b'(y) - f(a(y), y) \cdot a'(y).$$

Доказательство. $F(y) = F(y, a(y), b(y))$. По правилу производной сложной функции $\frac{dF}{dy} = \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial b} \cdot \frac{\partial b}{\partial y} = \int_{a(y)}^{b(y)} \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) dx + f(b(y), y) \cdot b'(y) - f(a(y), y) \cdot a'(y) \square$

Заметим, что по правилу Лейбница, $\frac{\partial F}{\partial y} = \int_{a(y)}^{b(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx, \frac{\partial F}{\partial b} f(b(y), y),$

$$\frac{\partial F}{\partial a} = \left(- \int_{b(y)}^{a(y)} f(x, y) dx \right)'_a = -f(a(y), y)$$

Теорема 15 (об интегрировании интеграла, зависящего от параметра)

Пусть $f(x, y)$ непрерывна на $P = [a, b] \times [c, d]$. Тогда

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

Доказательство. Введем функции $G(t) = \int_c^d dy \int_a^t f(x, y) dy, H(t) = \int_a^t dx \int_c^d f(x, y) dy$. Докажем, что $G(b) = H(b)$ (что доказывает требуемое утверждение). Введем функцию $g(t, y) = \int_a^t f(x, y) dx$, тогда $G(t) =$

$\int_c^d g(t, y) dy$ - применима теорема о дифференцировании сложной функции:

$\frac{\partial g}{\partial t} = \left(\int_a^t f(x, y) dx \right)'_t = f(t, y)$ - непрерывна на P по условию. Теперь докажем, что $g(t, y)$ непрерывна на P , для этого покажем, что $\lim_{\Delta t \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \Delta g =$

0. Имеем $\Delta g = g(t + \Delta t, y + \Delta y) - g(t, y) = \int_a^{t+\Delta t} f(x, y + \Delta y) dx -$

$\int_a^t f(x, y) dx = \int_a^t (f(x, y + \Delta y) - f(x, y)) dx + \int_t^{t+\Delta t} f(x, y + \Delta y) dx$. Так как $f(x, y)$ непрерывна на компакте P , то она равномерно непрерывна на P и ограничена константой M . Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Из равномерной непрерывности для

$$\frac{\varepsilon}{2(b-a)} > 0 \exists \delta_1 > 0 \forall (x_1, y_1) \in P \forall (x_2, y_2) \in P : \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} < \delta_1$$

$$\implies |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

Если $|\Delta y| < \delta$, то $|f(x, y + \Delta y) - f(x, y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$; тогда можно оценить интеграл:

$$\left| \int_a^t (f(x, y + \Delta y) - f(x, y)) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{t-a}{b-a} \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Если $|\Delta t| < \frac{\varepsilon}{2M}$, то

$$\left| \int_t^{t+\Delta t} f(x, y + \Delta y) dx \right| \leq \left| \int_t^{t+\Delta t} |f(x, y + \Delta y)| dx \right| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Пусть $\delta = \min\{\delta, \frac{\varepsilon}{2M}\}$, тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 \forall |\Delta t| < \delta \forall |\Delta y| < \delta : |\Delta g| < \varepsilon$$

Это означает, что $\lim_{\substack{\Delta t \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \Delta g = 0$. Заметим, что $g(t, y)$ непрерывна на P .

Применим теорему о дифференцировании к функции $G(t)$:

$$G'(t) = \int_c^d \frac{\partial g}{\partial t}(t, y) dy = \int_c^d f(t, y) dy$$

С другой стороны,

$$H'(t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_a^t dx \int_c^d f(x, y) dy \right) = \int_c^d f(t, y) dy$$

Итак, мы получили, что $G'(t) = H'(t)$, $G(a) = H(a) = 0$, откуда $G(t) = H(t) \implies G(b) = H(b)$. \square

Пример. $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln(x)} dx$, $0 < a < b$. Имеем $\int_a^b x^y dy = \frac{x^b - x^a}{\ln(x)}$, подынтегральная функция непрерывна на бруске $[0, 1] \times [a, b]$, тогда интеграл равен $\int_0^1 dx \int_a^b x^y dy = \int_a^b \frac{dy}{y+1} = \ln(b+1) - \ln(a+1)$.

Пример 2. Вычислить $\int_0^1 \sin(\ln(\frac{1}{x})) \frac{x^b - x^a}{\ln(x)} = \int_0^1 dx \int_a^b \sin(\ln(\frac{1}{x})) x^y dy$. Функция $f(x, y) = \sin(\ln(\frac{1}{x})) x^y$ непрерывна на $[0, 1] \times [a, b]$, $f(0, y) = 0$. Тогда

$$\int = \int_a^b dy \int_0^1 \sin(\ln(\frac{1}{x})) x^y dx = \begin{cases} t = \ln(\frac{1}{x}) = -\ln(x) \\ dx = -e^{-t} dt \end{cases} = \int_a^b dy \int_0^\infty \sin(t) e^{-ty} e^{-t} dt.$$

Внутренний интеграл возьмем по частям: $I = \int_0^\infty \sin(t) e^{-t(y+1)} dt = -\cos(t) e^{-t(y+1)} \Big|_0^\infty -$

$(y+1) \int_0^\infty \cos(t) e^{-t(y+1)} dt, \quad I = 1 - (y+1)^2 I.$ Значит, искомый интеграл

равен $\int_a^b \frac{dy}{(y+1)+1} = \operatorname{arctg} \left(\frac{a-b}{1+ab} \right)$ Домашка: тоже самое для косинуса.

2.2.2 Несобственные интегралы, зависящие от параметра

Рассмотрим семейство функций $f(x, y), \quad x \in X, y \in Y.$ Пусть $M \subset Y$ - множество сходимости.

Определение 6 $f(x, y)$ сходится поточечно к $\varphi(x)$ на M при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall y \in M \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon, y) \quad \forall x \in X \cap U_\delta^\circ(x_0) : |f(x, y) - \varphi(y)| < \varepsilon$$

Определение предела:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) \quad \forall x \in X : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение 7 $f(x, y)$ сходится равномерно к $\varphi(x)$ на E при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0 \quad \forall x \in X \cap U_\delta^\circ(x_0) \quad \forall y \in E : |f(x, y) - \varphi(x)| < \varepsilon$$

Пример. $f(x, y) = \sin(y^x)$ - непрерывен (??)

Определение 8 $\int_a^\infty f(x, y) dx$ сходится поточечно к $F(y)$ на M , если

$$\forall y \in M \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists b_0(\varepsilon, y) > a \quad \forall b > b_0 : \left| \int_b^\infty f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Обозначим $F(b, y) = \int_a^b f(x, y)dx$. Тогда $|F(b, y) - F(y)| = \left| \int_b^\infty f(x, y)dx \right|$. $F(b, y)$ сходится к $F(y)$ поточечно на M при $b \rightarrow \infty$. Обозначим остаток интеграла $R(b, y) = \int_b^\infty f(x, y)dx$. Остаток сходится поточечно $R(b, y) \rightarrow 0 \forall y \in N$ при $b \rightarrow \infty$.

Определение 9 Интеграл сходится равномерно к $F(y)$ на E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b_0(\varepsilon) \forall b > b_0 \forall y \in E : \left| \int_b^\infty f(x, y)dx \right| < \varepsilon$$

Как и с рядами, есть супремум-критерий.

Теорема 16 (супремум-критерий)

Несобственный интеграл $\int_a^\infty f(x, y)dx$, зависящий от параметра, сходится равномерно на E тогда и только тогда, когда

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \sup_{y \in E} \left| \int_b^\infty f(x, y)dx \right| = 0$$

Доказательство. Самостоятельно \square

Теорема 17 . (метод оценки остатка)

Пусть интеграл $\int_a^\infty f(x, y)dx$ сходится на E , и $r(b)$ - какая-то оценка остатка. Тогда если $|R(b, y)| \leq r(b) \forall y \in E$ и $r(b) \rightarrow 0$ при $b \rightarrow \infty$, тогда $\int_a^\infty f(x, y)dx$ сходится равномерно на E . Если же существует такая функция $y(b)$, что $R(b, y(b)) \rightarrow s \neq 0$, то интеграл не сходится равномерно на X .

Пример. $F(y) = \int_0^\infty ye^{-xy}dx$. Доказать, что сходимость равномерная при $[y_0, \infty)$, $y_0 \geq 0$, но на $(0, \infty)$ нет равномерной сходимости. Решение: пусть остаток $R(b, y) = \int_b^\infty ye^{-xy}dx = e^{-by}$. По методу оценки остатка при оценке $r(b) = e^{-by_0}$ имеем равномерную сходимость. Если мы возьмем $y = \frac{1}{b}$, то и $R(b, \frac{1}{b}) = e^{-1} \neq 0$, поэтому нет равномерной сходимости.

Пример. Пусть $f(x) > 0$ при $x \geq 0$, $\int_0^\infty f(x)dx$ сходится. Тогда $\forall \alpha > 0$ интеграл $\int_0^\infty f(y^\alpha x)dx$ сходится равномерно на $[y_0, \infty)$, $y_0 > 0$, и сходится неравномерно на $(0, \infty)$.

Решение. 1. Методом оценки остатка: $R(b, y) = \int_b^\infty f(y^\alpha x)dx = \frac{1}{y^\alpha} \int_b^\infty f(y^\alpha x)d(y^\alpha x) = \frac{1}{y^\alpha} \int_{by^\alpha}^\infty f(t)dt \leq \frac{1}{y_0^\alpha} \int_{by^\alpha}^\infty f(t)dt = r(b) \rightarrow 0$ при $b \rightarrow \infty$, так как $\int_0^\infty f(t)dt$ сходится.

2. Докажем неравномерную сходимость по супремум-критерию: $\sup_{y>0} \int_b^\infty f(y^\alpha x)dx = \sup_{y>0} \frac{1}{y^\alpha} \int_{by^\alpha}^\infty f(t)dt \geq \sup_{0<y\leq 1} \frac{1}{y^\alpha} \int_{by^\alpha}^\infty f(t)dt \geq \sup_{0<y\leq 1} \frac{1}{y^\alpha} \int_b^\infty f(t)dt = \infty$ при $y \rightarrow \infty$.

Тогда по супремум-критерию нет равномерной сходимости.

Пример. Интеграл Пуассона аналогично сходится равномерно на бесконечности, если интервал начинается не с нуля.

Свойства несобственных интегралов, зависящих от параметров

1. Равномерно сходящиеся интегралы образуют линейное пространство.
2. Если равномерно сходится на множестве, то сходится и на его подмножестве.
3. Сходится равномерно на конечном объединении областей, где сходится равномерно.

Пример. Покажем, что свойство 3 нельзя обобщить на объединения бесконечного числа множеств. Так, $\int_0^\infty e^{-x^2 y} dx$ сходится равномерно на $E_n = [\frac{1}{n}, \infty)$, но расходится на бесконечном объединении таких областей.

Теорема 18 (критерий Коши)

$\int_a^\infty f(x, y)dx$ сходится равномерно на Y тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b_0(\varepsilon) > a \forall b_1, b_2 > b_0 \forall y \in Y : \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y)dx \right| < \varepsilon$$

Доказательство. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Для

$$\frac{\varepsilon}{2} \exists b_0 > a \forall b > b_0 \forall y \in Y : \left| \int_{b_1}^{\infty} f(x, y) dx \right| < \left| \frac{\varepsilon}{2} \right|$$

$$\text{Пусть } b_1, b_2 > b_0, \text{ тогда } \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) dx \right| = \left| \int_{b_1}^{\infty} f(x, y) dx - \int_{b_2}^{\infty} f(x, y) dx \right| \leq \\ \left| \int_{b_1}^{\infty} f(x, y) dx \right| + \left| \int_{b_2}^{\infty} f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Обратно, для

$$\frac{\varepsilon}{2} \exists b_0 > a \forall b_1, b_2 > b_0 \forall y \in Y : \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) dx \right| < \left| \frac{\varepsilon}{2} \right|$$

$$\text{Тогда } \left| \int_{b_1}^{\infty} f(x, y) dx - \int_{b_2}^{\infty} f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \text{ Если } b_2 \rightarrow \infty, \text{ то}$$

$$\forall y \in Y : \int_{b_2}^{\infty} f(x, y) dx \rightarrow 0$$

(так как есть поточечная сходимость); $\left| \int_{b_1}^{\infty} f(x, y) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ Итак, выполняется определение. \square

Теорема 19 (метод граничной точки)

Пусть 1. $f(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty) \times [c, d)$

2. $\forall y \in (c, d)$ интеграл $\int_a^{\infty} f(x, y) dx$ сходится

3. $\int_a^{\infty} f(x, c) dx$ расходится.

Тогда $\int_a^{\infty} f(x, y) dx$ не сходится равномерно на (c, d)

Доказательство. Допустим, на (c, d) есть равномерная сходимость. Тогда по супремум-критерию Самостоятельно от противного. \square

2.2. СОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ, ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ПАРАМЕТРА 33

Теорема 20 (признак Вейерштрасса равномерной сходимости)

Пусть

1. $\forall x \geq a \forall y \in Y : |f(x, y)| \leq g(x);$

2. $\int_a^\infty g(x)dx$ сходится.

Тогда $\int_a^\infty f(x, y)dx$ сходится равномерно на Y .

Доказательство. Используем критерий Коши. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда интеграл сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b_0 > a \forall b_1, b_2 > b_0 : \left| \int_{b_1}^{b_2} g(x)dx \right| < \varepsilon$$

По условию $\forall y \in Y \forall x \geq a : |f(x, y)| \leq g(x)$, откуда $g(x) \geq 0$. Значит, $\left| \int_{b_1}^{b_2} g(x)dx \right| = \int_{b_1}^{b_2} g(x)dx$, поэтому $\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x)dx \right| \leq \left| \int_{b_1}^{b_2} |f(x)|dx \right| \leq \left| \int_{b_1}^{b_2} g(x)dx \right| < \varepsilon$. По критерию Коши, $\int_a^\infty f(x, y)dx$ сходится равномерно на

□

Теорема 21 (признак Дирихле равномерной сходимости несобственного интеграла, зависящего от параметра)

1. $\forall y \in Y f(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty)$

2. $\forall y \in Y \frac{\partial g}{\partial x}(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty)$

3. $\forall y \in Y g(x, y)$ монотонна по $x \in [a, \infty)$

4. $g(x, y) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$

5. $\exists M = \text{const} \forall y \in Y \forall x \geq a : \left| \int_a^x f(t, y)dt \right| \leq M.$

Тогда $\int_a^\infty f(x, y)g(x, y)dx$ сходится равномерно на Y .

Доказательство. По критерию Коши. Для

$$\frac{\varepsilon}{4M} > 0 \exists b_0(\varepsilon) > a \forall x > b_0 \forall y \in Y : |g(x, y)| < \frac{\varepsilon}{4M}$$

Возьмем $b_1, b_2 > b_0$. Тогда

$$\begin{aligned}
& \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) g(x, y) dx \right| = \left| \int_{b_1}^{b_2} g(x, y) d \left(\int_a^x f(t, y) dt \right) \right| = \\
& = \left| \left(g(x, y) \cdot \int_a^x f(t, y) dt \right) \Big|_{b_1}^{b_2} - \int_{b_1}^{b_2} \left(\int_a^x f(t, y) dt \right) \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) dx \right| \leq \\
& \leq |g(b_2, y)| \cdot \left| \int_a^{b_2} f(t, y) dt \right| + |g(b_1, y)| \cdot \left| \int_a^{b_1} f(t, y) dt \right| + \left| \int_{b_1}^{b_2} \left| \int_a^x f(t, y) dt \right| \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) dx \right| \leq \\
& \frac{\varepsilon}{4M} \cdot M + \frac{\varepsilon}{4M} \cdot M + M \cdot |g(b_2, y) - g(b, y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon
\end{aligned}$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b_0(\varepsilon) > a \forall b_1, b_2 > b_0 \forall y \in Y : \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) g(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Тогда по критерию Коши $\int_a^\infty f(x, y) g(x, y) dx$ сходится равномерно на Y .

□

Теорема 22 (*признак Абеля равномерной сходимости несобственного интеграла, зависящего от параметра*)

1. $\forall y \in Y$ $f(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty)$
2. $\forall y \in Y$ $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty)$
3. $\forall y \in Y$ $g(x, y)$ монотонна по $x \in [a, \infty)$
4. $\exists M = \text{const} \forall y \in Y \forall x \geq a : |g(x, y)| \leq M$.
5. $\int_a^\infty f(x, y) dx$ сходится равномерно на Y .

Тогда $\int_a^\infty f(x, y) g(x, y) dx$ сходится равномерно на Y .

Доказательство. По критерию Коши. Для

$$\frac{\varepsilon}{3M} > 0 \exists b_0(\varepsilon) > a \forall b_1, b_2 > b_0 \forall y \in Y : \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) dx < \frac{\varepsilon}{3M}$$

Возьмем $b_1, b_2 > b_0$. Тогда

$$\begin{aligned}
 & \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) g(x, y) dx \right| = \left| \int_{b_1}^{b_2} g(x, y) d \left(\int_{b_1}^x f(t, y) dt \right) \right| = \\
 & = \left| \left(g(x, y) \cdot \int_{b_1}^x f(t, y) dt \right) \right|_{b_1}^{b_2} - \int_{b_1}^{b_2} \left(\int_{b_1}^x f(t, y) dt \right) \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) dx \leq \\
 & \leq |g(b_2, y)| \cdot \left| \int_{b_1}^{b_2} f(t, y) dt \right| + \left| \int_{b_1}^{b_2} \left| \int_{b_1}^x f(t, y) dt \right| \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) dx \right| \leq \\
 & \leq \frac{\varepsilon}{3M} \cdot M + M \cdot |g(b_2, y) - g(b, y)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon
 \end{aligned}$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b_0(\varepsilon) > a \forall b_1, b_2 > b_0 \forall y \in Y : \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) g(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Тогда по критерию Коши $\int_a^\infty f(x, y) g(x, y) dx$ сходится равномерно на Y . \square

Пример. $\int_1^\infty \frac{y^2 \cos xy}{x+y^2}, y \in [0, \infty)$. Исследуем на равномерную сходимость. Пусть $f(x, y) = y \cos xy$, $g(x, y) = \frac{y}{x+y^2}$. Условия проверяются очевидным образом, интеграл сходится равномерно по Дирихле.

Теорема 23 (о непрерывности несобственного интеграла, зависящего от параметра)

1. $f(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty) \times Y$
2. $\int_a^\infty f(x, y) dx$ сходится равномерно на Y .

Тогда $\Phi = \int_a^\infty f(x, y) dx$ непрерывна на Y

Доказательство. Функция непрерывна, если она непрерывна в каждой точке. $\Phi(y)$ непрерывна в y_0 тогда и только тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in Y : |y - y_0| < \delta \implies |\Phi(y) - \Phi(y_0)| < \varepsilon$$

По второму условию, так как интеграл сходится равномерно, то для любого

$$\frac{\varepsilon}{3} > 0 \exists b_0 > a \forall b > b_0 \forall y \in Y : \left| \int_b^{\infty} f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \Phi(y) - \Phi(y_0) &= \int_a^{\infty} f(x, y) dx - \int_a^{\infty} f(x, y_0) dx = \\ &= \int_a^b f(x, y) dx + \int_b^{\infty} f(x, y) dx - \int_a^b f(x, y_0) dx - \int_b^{\infty} f(x, y_0) dx = \\ &= \left(\int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b f(x, y_0) dx \right) + \int_b^{\infty} f(x, y) dx - \int_b^{\infty} f(x, y_0) dx \end{aligned}$$

По теореме о непрерывности собственного интеграла, зависящего от параметра, для

$$\forall \frac{\varepsilon}{3} > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in Y : |y - y_0| < \delta \implies |F(y) - F(y_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Тогда

$$|\Phi(y) - \Phi(y_0)| \leq |F(y) - F(y_0)| + \left| \int_b^{\infty} f(x, y) dx \right| + \left| \int_b^{\infty} f(x, y_0) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Значит, $\Phi(y)$ непрерывна в любой точке на Y , то есть она непрерывна на Y . \square

Теорема 24 (о предельном переходе)

1. $f(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty) \times Y$
2. $\int_a^{\infty} f(x, y) dx$ сходится равномерно на Y .

Тогда

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{\infty} f(x, y) dx = \int_a^{\infty} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \int_a^{\infty} f(x, y_0) dx$$

Доказательство. Напишем его сами))) \square

Теорема 25 (об интегрировании несобственного интеграла, зависящего от параметра)

1. $f(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty) \times [c, d]$
2. $\int_a^\infty f(x, y) dx$ сходится равномерно на $[c, d]$.

Тогда

$$\int_c^d dy \int_a^\infty f(x, y) dx = \int_a^\infty dx \int_c^d f(x, y) dy$$

Доказательство. Обозначим $\Phi(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$. Эта функция непрерывна на $[c, d]$ по теореме о непрерывности несобственного интеграла, зависящего от параметра. Значит, $\Phi(y)$ интегрируема на $[c, d]$, то есть существует и конечен интеграл $\int_c^d dy \int_a^\infty f(x, y) dx = \text{const}$. Покажем, что несобственный интеграл справа сходится к этой константе, то есть при $b \rightarrow \infty$ имеет место $\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \rightarrow \int_c^d dy \int_a^\infty f(x, y) dx$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию, $\int_a^\infty f(x, y) dx$ сходится равномерно на $[c, d]$ Тогда для

$$\frac{\varepsilon}{d-c} > 0 \exists b_0(\varepsilon) \forall y \in [c, d] \forall b > b_0 : \left| \int_b^\infty f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{d-c}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy - \int_c^d dy \int_a^\infty f(x, y) dx \right| &\leq \int_c^d dy \left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^\infty f(x, y) dx \right| = \\ &= \int_c^d dy \left| \int_b^\infty f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{d-c} \cdot (d-c) = \varepsilon \end{aligned}$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b_0(\varepsilon) > a \forall b > b_0 \forall y \in Y : \left| \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy - \int_c^d dy \int_a^\infty f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

□

Теорема 26 (о дифференцировании несобственного интеграла, зависящего от параметра)

Пусть

1. $f(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty) \times Y$
2. $\int_a^\infty f(x, y) dx$ сходится $\forall y \in Y$.
3. $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ непрерывна на $[a, \infty) \times Y$.
4. $\int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$ сходится равномерно на Y .

Тогда $\forall y \in Y$

$$\left(\int_a^\infty f(x, y) dx \right)'_y = \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$$

Доказательство. Так как выполняются условия теоремы об интегрировании н.и.з.от п. для $\int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$, то зафиксируем $y_0 \in Y$, $y \in \tilde{Y}$ без крайних точек, и тогда

$$\int_{y_0}^y dy \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx = \int_a^\infty dx \int_{y_0}^y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dy = \int_a^\infty f(x, y) dx - \int_a^\infty f(x, y_0) dx$$

Второй интеграл равен числу, поэтому

$$\left(\int_{y_0}^y dy \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx \right)'_y = \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx = \left(\int_a^\infty f(x, y) dx \right)'_y$$

□

Пример. $\int_0^\infty \frac{\sin \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx$, где $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta \in 0$. Легко проверяются условия теоремы об интегрировании, и мы можем привести интеграл к виду $\int_0^\infty dx \int_0^\alpha \cos xy \cdot e^{-\beta x} dy$, который берется по частям, ответ $\arctg \frac{\alpha}{\beta}$. Так как арктангенс нечетный, то эта формула справедлива как для положительных, так и отрицательных α (при условии $\beta > 0$). Другой способ - по теореме о дифференцировании. Снова обозначим $\Phi(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\sin \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx$. $\Phi(x, \alpha)$ непрерывна на $[0, \infty) \times \mathbb{R}$. Доопределим функцию: $\Phi(0, \alpha) = \lim_{x \rightarrow +0} \Phi = \alpha$. Снова легко проверяются условия теоремы. Имеем $\Phi(\alpha) =$

$\int_0^{\infty} \cos \alpha x e^{-\beta x} dx = \frac{\beta}{\beta^2 + \alpha^2}$. Интегрируя и подставляя начально условие, снова получаем арктангенс

2.2.3 Вычисление некоторых классических интегралов

Интеграл Дирихле

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} \alpha$$

Пусть $\Phi(\beta) = \int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx$.

1) $\varphi(x, \beta) = \frac{\sin \alpha x}{x} e^{-\beta x}$ непрерывна на $[0, \infty) \times [0, \infty)$, $\varphi(0, \beta) = \alpha$.

2) Докажем, что $\Phi(\beta)$ сходится равномерно на $[0, \infty)$. Так как $\forall \alpha \in \mathbb{R} : \int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx$ сходится по признаку Дирихле, то сходимость исходного

интеграла равномерная (так как не зависит от β). Далее, $0 \leq e^{-\beta x} \leq 1$ при $\beta \geq 0, x \geq 0$. Значит, $e^{-\beta x}$ при данных условиях. По признаку Абеля $\Phi(\beta) = \int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx$ сходится равномерно. По теореме о предельном

переходе под знаком несобственного интеграла на $[0, \infty)$, имеем

$$\Phi(0) = \lim_{\beta \rightarrow 0} \Phi(\beta) = \lim_{\beta \rightarrow 0} \arctg \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} \alpha$$

Интеграл Лапласа

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos \alpha x}{1 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|}$$

Дифференцировать много раз не получится, так как мы придем к расходящемуся ряду. Нам нужен финт ушами, а именно прибавить $\frac{\pi}{2}$:

$$\Phi'(\alpha) + \frac{\pi}{2} = - \int_0^{\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1 + x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \int_0^{\infty} \frac{1 + x^2 - x^2}{x(1 + x^2)} \sin \alpha x dx$$

$$\Phi''(\alpha) = \left(\Phi'(\alpha) + \frac{\pi}{2} \right)' = \int_0^{\infty} \left(\frac{\sin \alpha x}{x(1 + x^2)} \right)'_{\alpha} dx$$

Внезапно, мы получили диффур $\Phi''(\alpha) = \Phi(\alpha)$. Общее решение $\Phi(\alpha) = C_1 e^{-\alpha} + C_2 e_6 \alpha$. Поскольку Φ ограничена, то $C_2 = 0$, а поскольку $\Phi(0) = \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$, то $C_1 = \frac{\pi}{2}$.

2.3 Функции Эйлера

2.3.1 Гамма-функция Эйлера

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} \cdot e^{-x} dx$$

На бесконечности сходится всегда, в нуле сходится при $s > 0$. Если проинтегрировать по частям, беря первообразную от экспоненты, получим $0 + \Gamma(x-1)$. Причем $\Gamma(1) = e^{-t} \Big|_0^{\infty} = 1$. В точке $1/2$ сам Бог велел делать замену $u = \frac{x^1}{2}$, и мы сведем к интегралу Пуассона.

Свойства гамма-функции

1. Область определения \equiv множество таких s , на котором $\Gamma(s)$ сходится: $s > 0$;
2. Равномерная сходимость на $[s_1, s_2]$, где $0 < s_1 < s_2 < \infty$;
3. $\Gamma(s)$ непрерывна при $s > 0$;
4. $\Gamma(s) > 0$ при $s > 0$;
5. $\boxed{\Gamma(s+1) = s \cdot \Gamma(s)}$;
6. $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(n+1) = n!$;
7. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \cdot \sqrt{\pi}$;
8. $\forall s > 1$: $\Gamma(s) = (s-1)(s-2)\dots(s-n)\Gamma(s-n)$, где $n = [s]$; любое значение гамма-функции можно выразить через её значения на $(0, 1]$
9. $\Gamma^{(n)}(s) = \Gamma(s)(\ln)^n$, причем сходится при $s > 0$, равномерно сходится там же, где и гамма-функция.
10. $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$ - формула дополнения
11. $\Gamma(x+1) = x^x e^{-x} \sqrt{2\pi x} (1 + \alpha(x))$ - асимптотическая формула.
12. График: $\lim_{s \rightarrow +0} \Gamma(s) = \lim_{s \rightarrow +0} \frac{\Gamma(s+1)}{s} = \frac{1}{+0} = \infty$. $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$. Сначала убывает, затем возрастает.
13. $\Gamma(s) = \frac{1}{se^{\gamma s}} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{s}{n}\right)^{-1} e^{\frac{s}{n}}$ - продолжение определения функции на отрицательные числа (кроме отрицательных целых).

Доказательство.

1. Докажем про область определения. Рассмотрим сумму интегралов $\Gamma(s) = \int_0^1 + \int_1^\infty$. Первый интеграл сходится при $s > 0$ и расходится при $s \leq 0$ по предельному признаку сравнения с интегралом $\int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx$. Второй интеграл: имеем

$$\forall s > \mathbb{R} \exists x(s) \forall x > x(s) : x^{s-1} \leq e^{\frac{x}{2}}$$

Значит, $\int_{x(s)}^\infty e^{-\frac{x}{2}} dx$ сходится, и исходный интеграл сходится по признаку сравнения при любом s . Значит, область определения гамма-функции - $s > 0$.

2. Докажем равномерную сходимость по признаку Вейерштрасса. Получаем, что $x^{s-1} \cdot e^{-x} \leq x^{s-1} \leq x^{s_1-1}$ при фиксированном $x \in [0, 1]$. При этом интеграл $\int_0^1 x^{s_1-1} dx$ сходится, поэтому интеграл сходится на $[s_1, s_2]$ равномерно. Если $x \geq 1$, то $x^{s-1} \cdot e^{-x} \leq x^{s_2-1} \cdot e^{-x}$, правая часть сходится и не зависит от s , значит, сходимость равномерная. Значит, на объединении $1 > s > 0$ и $s > 0$ сходимость непрерывная.

3. Непрерывность следует из равномерной сходимости интеграла и непрерывности подынтегральной функции по теореме о непрерывности несобственного интеграла, зависящего от параметра.

4. $\forall x > 0 \forall s > 0 : x^{s-1} \cdot e^{-x} > 0$ значит, $\Gamma(s) > 0 \forall s$.

5. Имеем $\Gamma(s+1) = \int_0^\infty x^s \cdot e^{-x} dx = - \int_0^\infty x^s d(e^{-x}) = -x^s \cdot e^{-x} \Big|_0^\infty + s \int_0^\infty x^{s-1} \cdot e^{-x} dx$, откуда $\Gamma(s+1) = s \cdot \Gamma(s)$.

6. $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x} dx = 1$. Факториальность следует по индукции из основного свойства.

7. $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ - интеграл Пуассона. Значит, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \int_0^\infty e^{-x} \frac{dx}{\sqrt{x}}$. Заменим $x = t^2$, откуда имеем $2 \int_0^\infty e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$. Общая формула для полуцелых чисел следует по индукции из основного свойства.

8. По индукции.

9. Докажем, что $\Gamma'(s) = \int_0^\infty x^{s-1} \cdot e^{-x} \ln x dx$. Для применения теоремы о дифференцировании надо доказать, что этот интеграл равномерно схо-

дится на $[s_1, s_2]$, $0 < s_1 < s < s_2 < \infty$. Рассмотрим $\int_0^\infty = \int_0^1 + \int_1^\infty$. В особой точке 0 при $s_1 \geq 1$ имеем $|x^{s-1} \cdot e^{-x} \ln x| \leq 1 \cdot 1 \cdot |\ln x| = -\ln x$. Интеграл $-\int_0^1 \ln x dx = -x \ln x|_0^1 + \int_0^1 dx = 1$ - сходится. Значит, гамма-функция сходится равномерно на $[s_1, s_2] < 1$ по признаку Вейерштрасса. Если же $s_1 < 1$, то $|x^{s-1} \cdot e^{-x} \ln x| \leq x^{s_1-1} \cdot \ln x$. Правая часть сходится, и интеграл сходится по признаку Вейерштрасса. Если $x > 1$, то $0 < x^{s-1} \cdot e^{-x} \ln x < x^{s_2-1} e^{-x} \ln x < e^{-\frac{x}{3}}$. Также сходится по Вейерштрассу. Поэтому в итоге он сходится на объединении областей. Поэтому можно дифференцировать.

10. Доказательство слишком длинное и использует комплексные числа. И прочие тоже.

2.3.2 Бета-функция

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

1. Область определения - $p > 0$ & $q > 0$;
2. Равномерная сходимость - $p \geq p_0 > 0$ & $q \geq q_0 > 0$.
3. $B(p, q)$ непрерывна на области определения
4. $B(p, q) > 0$ на области определения
5. $B(p, q) = B(q, p)$
6. $B(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} B(p-1, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1)$
7. Несобственный интеграл как первого, так и второго рода: $\int_0^\infty \frac{t^{p-1} dt}{(1+t)^{p+q}}$
8. $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$
9. $B(p, 1-p) = \frac{\pi}{\sin \pi n}$
10. Формула Лежандра: $B(p, p) = \frac{1}{2^{2p-1}} B\left(\frac{1}{2}, p\right)$. Или же: $\Gamma(p)\Gamma(p + \frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2p-1}} \Gamma(2p)$.

Доказательство.

1. Имеем $B(p, q) = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$. При $x \rightarrow 0$,

$x^{p-1}(1-x)^{q-1} \sim x^{p-1}$, и интеграл $\int_0^{\frac{1}{2}} x^{p-1} dx$ сходится при $p > 0$. При $x \rightarrow 1$, $x^{p-1}(1-x)^{q-1} \sim (1-x)^{q-1}$, аналогично сходится при $q > 0$.

2. Аналогично предыдущему пункту, $x^{p-1}(1-x)^{q-1} \leq x^{p_0-1}(1-x)^{(q_0-1)}$ - сходится равномерно по признаку Вейерштрасса.

3. Не на что сослаться, так как не было предела от двух переменных.

4. Очевидно.

5. Самостоятельно.

6. $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = -\frac{1}{q} \int_0^1 x^{p-1} d((1-x)^q) = -\frac{1}{q} x^{p-1}(1-x)^q \Big|_0^1 + \frac{1}{q} \int_0^1 (1-x)^q dx^{p-1} = \frac{p-1}{q} \int_0^1 x^{p-2}(1-x)^{q-1}(1-x) dx$. Отсюда $q \cdot$

$B(p, q) = (p-1) \left(\int_0^1 x^{p-2}(1-x)^{q-1} dx - \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx \right)$. Значит, $q \cdot$

$B(p, q) = (p-1) \cdot B(p-1, q) - (p-1) \cdot B(p, q)$, и в итоге получаем $B(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} B(p-1, q)$

7. Сделаем замену $x = \frac{t}{t+1}$. Изменим пределы: $0 \rightarrow 0, 1 \rightarrow \infty$. И тогда $1-x = \frac{1}{t+1}$, $dx = \frac{dt}{(t+1)^2}$. В итоге имеем $B(p, q) = \int_0^\infty \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p-1}} \cdot \frac{1}{(t+1)^{q-1}} \cdot \frac{dt}{(1+t)^2} = \int_0^\infty \frac{t^{p-1} dt}{(1+t)^{p+q}}$.

Пример. $\int_0^\infty x^{2n+1} e^{-x^2} dx$. Замена: $t = x^2$, $I = \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{n+\frac{1}{2}} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \Gamma(n+1) = \frac{1}{2} n!$

Пример. $\int_0^1 (\ln x)^n dx$. Берем $t = -\ln x$, откуда $I = \int_0^\infty (-t)^n e^{-t} dt = (-1)^n n!$

Пример. $\int_0^1 \sqrt{(1-x^2)^3} dx$. Положим $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$. Замена $t = x^2$, значит, $I = -\frac{1}{2} \int_0^1 (1-t)^{\frac{3}{2}} t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} B(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{5}{2}-1}{\frac{1}{2}+\frac{5}{2}-1} B(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = \dots = \frac{3\pi}{16}$

Пример. $\int_0^1 \frac{x^4 dx}{\sqrt[3]{t(1-x^3)^2}}$, Свести к бета-функции.

Пример. $\int_0^\infty \frac{\sqrt[5]{x} dx}{(1+x)^2}$. Свести к бета-функции.

Пример. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^p (\cos x)^q dx$. Сведем к бета-функции заменой $t =$

$\sin^2 x$, $dx = \frac{1}{2} \frac{dt}{t^{\frac{1}{2}}(1-t)^{\frac{1}{2}}}$, откуда $I = \frac{1}{2} B(\frac{p+1}{2}, \frac{q+1}{2})$

Пример. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\operatorname{tg} x)^{\frac{1}{4}} dx$ - то же самое.

Пример. Вычислить площадь фигуры $(x^2 + y^2)^6 = x^4 y^2$. Перейдя в полярку $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, имеем $r^6 = \cos^4 \varphi \sin^2 \varphi$. Значит, интегрируя, получаем $S = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} r(\varphi) d\varphi$.