

Zadanie 1. Podaj jawny wzór na wyznacznik macierzy wymiaru 1×1 , 2×2 , 3×3 , 4×4 .

Zadanie 2. Oblicz wyznaczniki:

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 2 & 8 & 1 \\ 3 & 9 & 2 \\ 4 & 10 & 3 \end{vmatrix}, \quad \text{b)} \begin{vmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 15 & 12 & 20 \\ 7 & 22 & 31 \end{vmatrix}, \quad \text{c)} \begin{vmatrix} 7 & 5 & 7 \\ 8 & 5 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{vmatrix}, \quad \text{d)} \begin{vmatrix} 2 & 8 & 10 \\ 3 & 9 & 12 \\ 4 & 10 & 14 \end{vmatrix}.$$

Zadanie 3. Oblicz wyznaczniki:

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 1 & 8 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 & 2 \\ 4 & 4 & 10 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{vmatrix}, \quad \text{b)} \begin{vmatrix} 1 & 8 & 7 & 8 \\ 1 & 8 & 9 & 42 \\ 2 & 16 & 110 & 5 \\ 3 & 24 & 6 & 81 \end{vmatrix}, \quad \text{c)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & 4 & 1 \\ 5 & 5 & 5 & 1 \end{vmatrix}.$$

Zadanie 4. Oblicz wyznaczniki:

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 5 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ 7 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix}, \quad \text{b)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Zadanie 5. Niech dane będą macierze A i B wymiaru 10×10 i niech $\det A = 2$ i $\det B = 3$. Określamy kolejne macierze następująco:

1. $C = [c_{ij}]$, $c_{1j} = 2a_{1j}$, $c_{ij} = a_{ij}$, $\forall i \neq 1$,
2. $D = [d_{ij}]$, $d_{i5} = 4a_{i5}$, $d_{ij} = a_{ij}$, $\forall j \neq 5$,
3. $E = [e_{ij}]$, $e_{i5} = 3b_{i5}$, $e_{i7} = 12b_{i7}$, $e_{ij} = b_{ij}$, $\forall j \neq 5, 7$.

Oblicz wyznaczniki macierzy $C, D, E, ACD, B^T ACE, CBA^{-1}, [(AB^{-1}CD^{-1}E)^{-1}]^T$.

Zadanie 6. Wykaż, że wyznacznik równa się zero:

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 2x+36y & x+y & 3x+37y \\ 3 & 9 & 12 \\ 4x-y & 10y & 4x+9y \end{vmatrix}, \quad \text{b)} \begin{vmatrix} x^2+1 & x & (x+1)^2 \\ y^7 & -\frac{1}{2} & (\sqrt[3]{y}-1)(\sqrt[3]{y}+1) \\ x^2 & 2xy+2y^2 & (x+2y)^2 \end{vmatrix},$$

$$\text{c)} \begin{vmatrix} \sin^2 x & \cos^2 x & x^y & 1 \\ (x+y)^2 & -2xy-y^2 & y^x & x^2 \\ 4 & 4 & 10 & 8 \\ \operatorname{tg} x & \operatorname{ctg} x & 6 & \frac{1}{\sin x \cos x} \end{vmatrix}.$$

Zadanie 7. Udowodnij, że wyznacznik macierzy diagonalnej jest iloczynem wyrazów na przekątnej. (Macierz diagonalna - macierz, zwykle kwadratowa, której wszystkie współczynniki leżące poza główną przekątną (główną diagonalą) są zerowe.)

Zadanie 8. Wyprowadź wzór na wyznacznik macierzy trójkątnej dolnej, (macierz trójkątna dolna - macierz kwadratowa, której wszystkie współczynniki leżące ponad główną diagonalą są zerowe).

Zadanie 9. Wyprowadź wzór na wyznacznik macierzy trójkątnej górnej (macierz trójkątna dolna - macierz kwadratowa, której wszystkie współczynniki leżące poniżej główną diagonalą są zerowe)

Zadanie 10. Oblicz wyznaczniki:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad \text{b)} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n+1 \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n+2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n & n+1 & \dots & \dots & 2n+1 \\ \frac{n(n+1)}{2} & \frac{n(2+n+1)}{2} & \dots & \dots & \frac{n(3n+2)}{2} \end{vmatrix}, \\ \text{c)} \quad & \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n+2 & n+3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 2^n & 3^n & \dots & \dots & (n+2)^n & (n+3)^n \\ 2^{n+1}-1 & \frac{1}{2}(3^{n+1}-1) & \dots & \dots & \frac{1}{n+1}((n+2)^{n+1}-1) & \frac{1}{n+2}((n+3)^{n+1}-1) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Zadanie 11. Znaleźć najmniejszą wartość wyznacznika:

$$\begin{vmatrix} x & 5x+6 \\ -1 & x \end{vmatrix}.$$

Zadanie 12. Wartością własną macierzy A nazywamy taką liczbę λ , dla której spełnione jest równanie:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Znaleźć wartości własne następujących macierzy:

$$\text{a)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \text{b)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{c)} \quad \begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 8 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Definicja 1. Niech A będzie dowolną macierzą wymiaru $m \times n$ i niech $k \in \mathbb{N}$, $k \leq \min\{m, n\}$. Minorem stopnia k macierzy A nazywamy wyznacznik utworzony z elementów tej macierzy stojących na przecięciu dowolnie wybranych k wierszy i k kolumn.

Definicja 2. Rzędem dowolnej macierzy A nazywamy taką liczbę naturalną r , że z macierzy A można wybrać przynajmniej jeden niezerowy minor stopnia r , natomiast wszystkie minory stopni większych od r , jeśli takie istnieją, są równe zero.

Uwaga 2 Operacje elementarne, które nie zmieniają rzędu macierzy:

- a) dodanie do dowolnego wiersza (kolumny) innego wiersza (kolumny) pomnożonego przez liczbę rzeczywistą,
- b) zamiana miejscami dwóch wierszy (kolumn),
- c) pomnożenie dowolnego wiersza (kolumny) przez liczbę różną od zera.

Zadanie 13. Wyznacz rzędy macierzy:

$$\text{a)} \quad \begin{bmatrix} 2 & 8 & 6 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 5 \\ 6 & 16 & 7 & 14 \end{bmatrix}, \quad \text{b)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 8 & 7 & 8 \\ 1 & 8 & 9 & 42 \\ 2 & 16 & 110 & 5 \end{bmatrix}, \quad \text{c)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 3 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad e) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 5 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ 7 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 14. Określ rząd macierzy w zależności od parametru k

$$\begin{bmatrix} 2 & k & 5 \\ 5 & 1 & k \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 15. Określ rząd macierzy w zależności od parametru:

$$\begin{bmatrix} m & m+1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 4 \\ 6 & 7 & 12 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{bmatrix}.$$

Zadanie 16. Wykaż, że dla macierzy kwadratowej wymiaru $n \times n$ jej rząd jest równy n wtedy i tylko wtedy, gdy $\det A \neq 0$.

Zadanie 17. Niech rząd macierzy wymiaru $n \times k$ wynosi p i niech prawdziwe będą zależności: $n < k$, $p < n$. Postępujemy następująco: po doprowadzeniu macierzy do postaci schodkowej skreślamy j ostatnich wierszy. Jak zmieni to rząd macierzy?

Zadanie 18. Sformułuj warunek na to, aby macierz diagonalna wymiaru $n \times n$ była rzędu p .

Zadanie 19. Wykaż, że jeśli pewna potęga macierzy kwadratowej $n \times n$ nie jest rzędu n , to macierz ta również nie jest rzędu n .

Odpowiedzi:

Zad.1. a) a_{11} , b) $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, c) $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$, d) $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$.

Zad.2. a) 0, b) -384 , c) 0, d) 0.

Zad.3. a) 280, b) 0, c) 0.

Zad.4. a) 945, b) 22.

Zad.5. Kolejno mamy 4, 8, 108, 64, 2592, 6, $\frac{1}{36}$.

Zad.6. a) $k_3 = k_1 + k_2$, b) $k_3 = k_1 + 2k_2$, c) $k_4 = k_1 + k_2$.

Zad.7. Pokażemy, że dla takiej macierzy $A_{n \times n}$ wymiaru $n \times n$ $\det A_{n \times n} = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$. Prowadzimy dowód indukcyjny ze względu na n - rozmiar macierzy. Dla $n = 2$ równość $\det A_{n \times n} = a_{11}a_{22}$ jest oczywista. Założmy zatem, że twierdzenie jest prawdziwe dla pewnego n . Wykażemy, że zachodzi także dla $n + 1$. Wówczas $\det A_{(n+1) \times (n+1)} = (-1)^{n+1+n+1} a_{n+1, n+1} \det A_{n, n}$ (rozwińcie Laplace'a względem ostatniej kolumny/wiersza - pozostałe składniki się zerują). Na mocy założenia indukcyjnego mamy $\det A_{(n+1) \times (n+1)} = a_{n+1, n+1} a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$. Na mocy zasady indukcji matematycznej twierdzenie zostało wykazane dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$.

Zad.8. Można wykazać analogicznie jak w zadaniu 7., że $\det A = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$.

Zad.9. Można wykazać analogicznie jak w zadaniu 7., że $\det A = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$.

Zad.10. a) $1 + (-1)^{n+1}$, b) 0, c) 0.

Zad.11. $-\frac{1}{4}$.

Zad.12. a) 1, 2, 3, b) $-1, 0, 3$, c) 5, $\frac{9-\sqrt{193}}{2}$, $\frac{9+\sqrt{193}}{2}$.

Zad.13. a) 3, b) 3, c) 3, d) 3, e) 5.

Zad.14. Dla $k \in \mathbb{R}$ rząd = 3; dla $k \in \mathbb{C} \setminus \{\frac{39i+7}{2}, \frac{-39i+7}{2}\}$ rząd = 3, dla $k \in \{\frac{39i+7}{2}, \frac{-39i+7}{2}\}$ rząd = 2.

Zad.15. Dla $k \neq 0$ i $m \neq 1$ rząd = 4. Dla $m = 1$ i $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ rząd = 3. Dla $k = 0$ i $m \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ rząd = 3. Dla $m = 1$ i $k = 0$ rząd = 2.

Zad.16. Wynika wprost z definicji 1 oraz 2.

Zad.17. Dla $j \leq n - p$ rząd się nie zmienia. Dla $j > n - p$ rząd wynosi $n - j$.

Zad.18. $a_{p+1,p+1} = a_{p+2,p+2} = \dots = a_{nn} = 0$.

Zad.19. Wskazówka: wykorzystaj twierdzenie Cauchy'ego o wyznaczniku.