

Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

*Сборник научных трудов
молодых ученых, аспирантов и студентов*

ВЫПУСК 18

Ярославль
ЯрГУ
2018

УДК 517.9+512.54+519.6(081)

ББК В1я43+3973.2я43

С 56

*Рекомендовано
редакционно-издательским советом ЯрГУ
в качестве научного издания. План 2018 года*

Современные проблемы математики и информатики :

С 56 сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов и студентов
/ Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2018.
— Вып. 18. — 64 с.
ISBN 978-5-8397-1158-7

В сборнике представлены работы молодых ученых, аспирантов и студентов.

В статьях рассматриваются различные проблемы теории динамических систем, информационных технологий, разработки программных средств и вычислительной математики.

Сборник подготовлен с использованием издательской системы L^AT_EX.

ББК В1я43+3973.2я43
УДК 517.9+512.54+519.6(081)

Редакционная коллегия:

канд. физ.-мат. наук Д. В. Глазков (отв. редактор)

канд. физ.-мат. наук И. С. Кащенко

канд. физ.-мат. наук П. Н. Нестеров

Содержание

<i>Есипова Е. М., Ухалов А. Ю.</i> Свойства экстремальных симплексов, связанные с отсекаемыми объемами	4
<i>Ионов П. Н.</i> Оценка временной сложности алгоритма поиска баланса кошелька в блокчейн-технологиях	18
<i>Лемешко Н. С.</i> Анализ безопасности протоколов LKK доверенной цифровой подписи	24
<i>Лютенков А. В.</i> Минимальные нормы интерполяционных проекторов	34
<i>Маслеников И. Н.</i> Исследование локальной динамики дифференциально-интегрального уравнения с запаздыванием	39
<i>Мигунов А. А.</i> Общие уравнения раздутий	46
<i>Федулов Д. Д.</i> Изучение методов отбора признаков для построения моделей машинного обучения на примере задачи типа бинарной классификации	51

И. Н. Маслеников

Исследование локальной динамики дифференциально-интегрального уравнения с запаздыванием

Для модели оптико-электронного осциллятора, описываемого дифференциально-интегральным уравнением, изучается устойчивость нулевого решения. Для этого строится характеристическое уравнение и анализируется положение его корней. В зависимости от значений параметров определяется устойчивость состояния равновесия. Выделяются критические значения параметров, при которых состояние равновесия меняет устойчивость. Строится асимптотическое приближение корней характеристического квазиполинома.

1. Постановка задачи

Рассмотрим дифференциально-интегральное уравнение с запаздыванием [1], которое представляет собой экспериментальную реализацию модифицированного уравнения Икеды с задержкой по времени:

$$\varepsilon \frac{dx}{dt} + x + \delta \int_{t_0}^t x(s) ds = \beta_1 F(x(t - \tau)). \quad (1)$$

Здесь $\varepsilon, \delta, \beta_1, t_0$ — некоторые параметры, τ — параметр запаздывания, вещественный и положительный. Функция F достаточно гладкая, не ограничивая общности, можно считать, что $F(0) = 0$. Таким образом, уравнение (1) имеет нулевое состояние равновесия, если это не так, то можно сделать соответствующую замену.

В работе [1] уравнение (1) исследовалось численными методами, строились сложные квазипериодические режимы, так называемые химеры. Для этого подбирались подходящие значения параметров ($\varepsilon = 0.005$ и $\delta = 0.016$) и начальные условия. В силу этого предполагаем, что параметры ε и δ малы ($0 < \varepsilon, \delta \ll 1$) и пропорциональны: $\varepsilon = k\delta$, $k > 0$.

Ставится задача исследования локальной динамики в окрестности нулевого состояния равновесия (1). В 2.1 строится характеристический многочлен. В 2.2 изучается характеристическое уравнение при малых

значениях параметра β , определяется устойчивость состояния равновесия. В последнем пункте строится асимптотическое приближения корней уравнения (1), выделяется вещественная часть для определения устойчивости или неустойчивости состояния равновесия.

Отметим, что в статье [2] рассмотрено похожее уравнение оптико-электронного осциллятора, в котором параметр δ не является малым.

2. Исследование устойчивости состояния равновесия

2.1. Построение характеристического квазиполинома

Сделаем замену $\dot{y}(t) = x(t)$ в уравнении (1), перенесем часть слагаемых в правую часть и перейдем к системе

$$\begin{cases} \varepsilon \dot{x} = \beta_1 F(x(t - \tau)) - x - \delta y, \\ \varepsilon \dot{y} = \varepsilon x. \end{cases} \quad (2)$$

Заметим, что $x = 0, y = 0$ является решением системы (2). Исследуем его устойчивость. Выделим линейную часть выражения $F(x(t - \tau))$.

$$F(z) = \dot{F}(0)z + O(z^2).$$

Введем параметр $\beta = \dot{F}(0) \cdot \beta_1$, $\beta - const$. Для исследования устойчивости линеаризуем (2) на нулевом состоянии равновесия:

$$\begin{cases} \varepsilon \dot{x} = -x - \delta y + \beta x(t - \tau), \\ \varepsilon \dot{y} = \varepsilon x. \end{cases} \quad (3)$$

Для построения характеристического уравнения системы (3) воспользуемся методом Эйлера. Будем искать решение (3) в виде

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} e^{\lambda t}, \quad \text{где } \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \text{нетривиальный вектор.}$$

Выполним подстановку и после очевидных преобразований получим

$$\begin{pmatrix} -1 + \beta e^{-\lambda \tau} - \varepsilon \lambda & -\delta \\ \varepsilon & -\varepsilon \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} e^{\lambda t} = 0. \quad (4)$$

Поскольку нас не интересует тривиальный вектор, нам нужно чтобы определитель матрицы (4) был равен нулю

$$\begin{vmatrix} -1 + \beta e^{-\lambda \tau} - \varepsilon \lambda & -\delta \\ \varepsilon & -\varepsilon \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Построим характеристический квазиполином. Используя условие $k\delta = \varepsilon$, получим

$$\varepsilon\lambda^2 + \lambda - \lambda\beta e^{-\lambda\tau} + \frac{\varepsilon}{k} = 0. \quad (5)$$

Нас интересует расположение корней уравнения (5) относительно мнимой оси [4]. Состояние равновесия будет устойчивым, если все корни будут иметь отрицательную вещественную часть, и неустойчивым, если хотя бы один корень будет иметь положительную вещественную часть.

2.2. Исследование характеристического квазиполинома при малых $|\beta|$

Рассмотрим характеристическое уравнение при $\beta = 0$ и малом $\varepsilon > 0$. Сделаем замену

$$\lambda = \frac{\mu}{\varepsilon}.$$

Заменим в характеристическом уравнении переменные, домножим на ε и перенесем в правую часть экспоненту:

$$\mu^2 + \mu + \frac{\varepsilon^2}{k} = \mu\beta e^{-\tau\frac{\mu}{\varepsilon}}. \quad (6)$$

При $\beta = 0$ уравнение становится квадратным, его корни

$$\mu_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\varepsilon^2}{k}}}{2}.$$

Нетрудно увидеть, что $\operatorname{Re}\mu_{1,2} < 0$. При нулевом β состояние равновесия устойчиво, все решения (1) из некоторой окрестности нуля стремятся к состоянию равновесия [5].

Исследуем характеристическое уравнение, когда $|\beta|$ мало, но не равно нулю.

Теорема 1. При $|\beta| < 1$ и достаточно малом ε , все корни (6) имеют отрицательные вещественные части.

Доказательство. Предположим обратное, что есть корень μ с неотрицательной вещественной частью, т. е. $\operatorname{Re}\mu \geq 0$. Разделим уравнение (6) на μ , это можно сделать, т. к. $\mu = 0$ не является корнем.

$$\mu + 1 + \frac{\varepsilon^2}{k\mu} = \beta e^{-\tau\frac{\mu}{\varepsilon}}. \quad (7)$$

Представим $\mu = \alpha + i\gamma$ и оценим модуль правой части:

$$|\beta e^{-\tau \frac{\alpha+i\gamma}{\varepsilon}}| = |\beta| |e^{-\tau \frac{\alpha+i\gamma}{\varepsilon}}| \leq |\beta| e^{-\tau \frac{\alpha}{\varepsilon}} \leq |\beta|.$$

Оценим левую часть:

$$\begin{aligned} |\mu + 1 + \frac{\varepsilon^2}{k\mu}| &= |\alpha + i\gamma + 1 + \frac{\varepsilon^2}{k(\alpha + i\gamma)}| = |\alpha + i\gamma + 1 + \frac{\varepsilon^2(\alpha - i\gamma)}{k(\alpha^2 + \gamma^2)}| = \\ &= \sqrt{\left(\alpha + 1 + \frac{\varepsilon^2\alpha}{k(\alpha^2 + \gamma^2)}\right)^2 + \left(\gamma - \frac{\varepsilon^2\gamma}{k(\alpha^2 + \gamma^2)}\right)^2}. \end{aligned}$$

Слагаемые под корнем при $\alpha \geq 0$ удовлетворяют неравенствам

$$\left(\alpha + 1 + \frac{\varepsilon^2\alpha}{k(\alpha^2 + \gamma^2)}\right)^2 \geq 1, \quad \left(\gamma - \frac{\varepsilon^2\gamma}{k(\alpha^2 + \gamma^2)}\right)^2 \geq 0.$$

Отсюда следует, что при $|\beta| < 1$ у характеристического уравнения (7) нет корней ни на мнимой оси, ни в правой комплексной полуплоскости. Теорема доказана. □

Таким образом, при $|\beta| < 1$ состояние равновесия устойчиво, и все решения (1) с начальными условиями из его некоторой окрестности стремятся к нулю [5].

2.3. Разложение критических корней по малому параметру

В предыдущем пункте мы определили $|\beta| < 1$, теперь рассмотрим $|\beta| = 1$, как это показано в [3].

Для определенности сначала найдем приближение корней (5) при $\beta=1$. Выделим первый член разложения асимптотического ряда

$$\lambda = \lambda_0 + o(1).$$

Подставим в уравнение (5) и всё, что будет иметь порядок малости больше чем $o(1)$ сгруппируем.

$$\lambda_0 e^{-\lambda_0 \tau} = \lambda_0 + o(1).$$

Выделяя главную часть, получаем

$$\lambda_0(e^{-\lambda_0 \tau} - 1) = 0.$$

У этого уравнения корнями являются

$$\lambda_0 = 0 \quad \text{и} \quad \lambda_{n0} = \frac{2\pi ni}{\tau}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Отметим, что нулевой корень имеет кратность 2. Уточним асимптотику при $\lambda_{n0} \neq 0$, чтобы определить вещественную часть каждого корня:

$$\lambda_n = \frac{2\pi ni}{\tau} + \varepsilon \lambda_{n1} + \varepsilon^2 \lambda_{n2} + o(\varepsilon^2).$$

Подставим это в уравнение (6):

$$\begin{aligned} \varepsilon \left(\frac{2\pi ni}{\tau} + \varepsilon \lambda_{n1} \right)^2 + \frac{2\pi ni}{\tau} + \varepsilon \lambda_{n1} + \varepsilon^2 \lambda_{n2} + \frac{\varepsilon}{k} + o(\varepsilon^2) = \\ = \left(\frac{2\pi ni}{\tau} + \varepsilon \lambda_{n1} + \varepsilon^2 \lambda_{n2} \right) e^{-\left(\frac{2\pi ni}{\tau} + \varepsilon \lambda_{n1} + \varepsilon^2 \lambda_{n2} + o(\varepsilon^2) \right) \tau}. \end{aligned}$$

Так как $\varepsilon \lambda_{n1} + \varepsilon^2 \lambda_{n2}$ мало, то разложим экспоненту в ряд Тейлора.

$$\begin{aligned} \varepsilon \left(\frac{-4\pi^2 n^2}{\tau^2} + \varepsilon \frac{4\pi ni}{\tau} \lambda_{n1} \right) + \frac{2\pi ni}{\tau} + \varepsilon \lambda_{n1} + \varepsilon^2 \lambda_{n2} + \frac{\varepsilon}{k} + o(\varepsilon^2) = \\ = \left(\frac{2\pi ni}{\tau} + \varepsilon \lambda_{n1} + \varepsilon^2 \lambda_{n2} \right) \left(1 - \tau \varepsilon \lambda_{n1} - \tau \varepsilon^2 \lambda_{n2} + \frac{\tau^2 \varepsilon^2}{2} \lambda_{n1}^2 + o(\varepsilon^2) \right). \end{aligned}$$

Раскроем скобки и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях малого параметра.

При ε^0 имеем верное тождество

$$\frac{2\pi ni}{\tau} = \frac{2\pi ni}{\tau}.$$

При ε^1 получим

$$\frac{-4\pi^2 n^2}{\tau^2} + \frac{1}{k} = -2\pi ni \lambda_{n1} \quad \text{при } n \neq 0. \quad (8)$$

При ε^2 – соотношение

$$\frac{4\pi ni}{\tau} \lambda_{n1} = -\tau \lambda_{n1}^2 + \frac{2\pi ni}{\tau} \left(-\tau \lambda_{n2} + \frac{\tau^2}{2} \lambda_{n1}^2 \right). \quad (9)$$

Из (8) и (9) последовательно выражаются λ_{n1} и λ_{n2} :

$$\lambda_{n1} = \frac{\left(\frac{-4\pi^2 n^2}{\tau^2} + \frac{1}{k} \right) i}{2\pi n} \quad \text{при } n \neq 0.$$

$$\lambda_{n2} = \frac{\left(\frac{4\pi ni}{\tau}\lambda_{n1} + \tau\lambda_{n1}^2\right)i}{2\pi n} + \frac{\tau}{2}\lambda_{n1}^2 \quad \text{при } n \neq 0. \quad (10)$$

Выделим действительную часть числа λ_{n2} и определим знак. Первое слагаемое (10) является чисто мнимым и не влияет на устойчивость, $\operatorname{Re}\lambda_{n2} = \frac{\tau}{2}\lambda_{n1}^2$.

Значит $\operatorname{Re}\lambda_{n2} \leq 0$, причем $\operatorname{Re}\lambda_{n2} = 0$ только, если k изначально будет подобрано определенным образом, и только при каком-то одном n это будет выполняться.

Теперь уточним асимптотику при $\lambda_0 = 0$. Возьмем разложение

$$\lambda = \sqrt{\varepsilon}\lambda_1 + \varepsilon\lambda_2 + \varepsilon^{\frac{3}{2}}\lambda_3 + o(\varepsilon^{\frac{3}{2}}).$$

По аналогии выполняем те же действия. В результате получаем

$$\lambda_1 = \frac{\pm i}{\sqrt{\tau k}} \quad \text{и} \quad \lambda_2 = \frac{-1}{2k}.$$

Теорема 2. При $\beta = 1$ корни характеристического уравнения допускают асимптотическое представление вида

$$\lambda_n = \lambda_{n0} + \varepsilon\lambda_{n1} + \varepsilon^2\lambda_{n2} + o(\varepsilon^2), \quad \text{при } n \neq 0, \quad \text{где}$$

$$\lambda_{n0} = \frac{2\pi ni}{\tau}, \quad \lambda_{n1} = \frac{\left(\frac{-4\pi^2 n^2}{\tau^2} + \frac{1}{k}\right)i}{2\pi n},$$

$$\lambda_{n2} = \frac{\left(\frac{4\pi ni}{\tau}\lambda_{n1} + \tau\lambda_{n1}^2\right)i}{2\pi n} + \frac{\tau}{2}\lambda_{n1}^2;$$

$$\lambda = \sqrt{\varepsilon}\lambda_1 + \varepsilon\lambda_2 + \varepsilon^{\frac{3}{2}}\lambda_3 + o(\varepsilon^{\frac{3}{2}}) \quad \text{при } \lambda_0 = 0, \quad \text{где}$$

$$\lambda_1 = \frac{\pm i}{\sqrt{\tau k}} \quad \text{и} \quad \lambda_2 = \frac{-1}{2k}.$$

Аналогичные построения можно провести и при $\beta = -1$.

Теорема 3. При $\beta = -1$ корни характеристического уравнения допускают асимптотическое представление вида

$$\lambda_n = \lambda_{n0} + \varepsilon\lambda_{n1} + \varepsilon^2\lambda_{n2} + o(\varepsilon^2), \quad \text{где}$$

$$\lambda_{n0} = \frac{2\pi ni + \pi i}{\tau}, \quad \lambda_{n1} = \frac{\left(\frac{-\pi^2(2n+1)^2}{\tau^2} + \frac{1}{k}\right)i}{\pi(2n+1)},$$

$$\lambda_{n2} = \frac{\left(\frac{2\pi(2n+1)i}{\tau} \lambda_{n1} + \tau \lambda_{n1}^2 \right) i}{\pi(2n+1)} + \frac{\tau}{2} \lambda_{n1}^2;$$
$$\lambda = \frac{-\varepsilon}{2k} + o(\varepsilon) \quad \text{при} \quad \lambda_0 = 0.$$

3. Заключение

Рассмотрена модель оптико-электронного осциллятора, найдено его состояние равновесия. Для изучения локальной динамики уравнения построен характеристический квазиполином. Определены критические значения параметра β , при которых меняется устойчивость состояния равновесия. Найдено асимптотическое представление корней характеристического квазиполинома при критическом значении параметра β . При этом оказывается, что кроме основной «цепочки» стремящихся к мнимой оси корней существует еще один близкий к нулю корень характеристического уравнения.

Литература

1. *Larger L., Maistrenko Y., Penkovskiy B.* Virtual Chimera States for Delayed-Feedback Systems // *Physical Review Letters*, 2013. Vol. 111. pp. 054103.
2. Григорьева Е. В., Кащенко С. А., Глазков Д. В. Особенности локальной динамики модели оптико-электронного осциллятора с запаздыванием // *Моделирование и анализ информационных систем*. Т. 25, №1, 2018, с. 71-82.
3. *Кащенко И. С.* Асимптотическое разложение решений уравнений: методические указания. Ярославль: ЯрГУ, 2011.
4. *Кащенко И. С.* Метод квазинормальных форм в уравнениях с запаздыванием: методические указания. Ярославль: ЯрГУ, 2011.
5. *Хейл Дж.* Теория функционально-дифференциальных уравнений. М.: Мир, 1984.

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова