ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

EFECTOS DE LA REHABILITACIÓN CARDÍACA BASADA EN EJERCICIO FÍSICO SOBRE LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN PERSONAS ADULTAS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA

Autores: Stefanny Cruz, Juan David Elejalde, Nicolas Lopez, Wendy Nicol Osorio, Andres Felipe Osorio, Lesly Yaritza Sánchez
· **Docente:** Diana Lucia Quiceno Osorio | **Curso:** Técnicas de Intervención en Fisioterapia 2 | Semestre: 7

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca es un síndrome en el que el corazón no bombea sangre suficiente para cubrir las necesidades del organismo. Puede causar disnea, fatiga e intolerancia al esfuerzo, dificultando actividades como caminar, subir escaleras y realizar tareas cotidianas.

Justificación

La rehabilitación cardíaca combina ejercicio físico individualizado, educación y seguimiento profesional. Estudiar sus efectos permite comprender cómo el ejercicio puede mejorar la capacidad funcional, la autonomía y la calidad de vida. Es un tema relevante para la fisioterapia porque aborda la evaluación, prescripción y progresión segura del ejercicio.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las personas con insuficiencia cardíaca pueden presentar fatiga, intolerancia al esfuerzo y limitaciones en sus actividades diarias. Aunque el ejercicio forma parte de la rehabilitación, los programas varían en modalidad e intensidad. Es necesario conocer qué beneficios funcionales reporta la evidencia y qué precauciones orientan una intervención segura.

Pregunta orientadora

¿Qué efectos tiene la rehabilitación cardíaca basada en ejercicio físico sobre la capacidad funcional de las personas adultas con insuficiencia cardíaca?

Objetivo general

Analizar la evidencia científica sobre los efectos de la rehabilitación cardíaca basada en ejercicio físico en la capacidad funcional de personas adultas con insuficiencia cardíaca.

Objetivos específicos

Identificar modalidades de ejercicio; describir cambios en 6MWT y VO_2 pico; reconocer beneficios y precauciones.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio

Revisión bibliográfica de estudios científicos sobre rehabilitación cardíaca basada en ejercicio en adultos con insuficiencia cardíaca.

Fuentes

PubMed, PubMed Central y Cochrane Library. Se priorizan revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos.

Búsqueda

“Heart failure”, “cardiac rehabilitation”, “exercise training”, “functional capacity”, “six-minute walk test” y “VO_2 peak”.

Selección

Estudios en adultos con insuficiencia cardíaca que evalúen programas de ejercicio y reporten capacidad funcional, capacidad aeróbica o calidad de vida.

Recolección y análisis

Registrar autor, año, diseño, participantes, tipo de ejercicio y resultados. Comparar los hallazgos en caminata de seis minutos (6MWT), VO_2 pico y calidad de vida.

RESULTADOS DE LA EVIDENCIA

Gore et al. (2023) – Physical Therapy

Revisión de 11 ensayos clínicos con 1.523 participantes. Reportó mejoras en la capacidad de ejercicio, incluida la distancia en la prueba de caminata de seis minutos (6MWT) y el consumo de oxígeno.

Molloy et al. (2024) – Cochrane

Revisión de 60 ensayos con 8.728 participantes. Encontró beneficios en calidad de vida y probable reducción de hospitalizaciones.

Yang et al. (2024) – Frontiers

Metaanálisis de 13 ensayos que comparó ejercicio interválico de alta intensidad (HIIT) con ejercicio continuo moderado (MICT), evaluando VO_2 pico y 6MWT.

Variables

Capacidad funcional, VO_2 pico, calidad de vida y hospitalizaciones. Estos son resultados publicados, no mediciones propias.

DISCUSIÓN

Interpretación

Los estudios respaldan la rehabilitación cardíaca basada en ejercicio como parte del manejo de la insuficiencia cardíaca. Las mejoras en 6MWT y VO_2 pico reflejan cambios en la tolerancia al esfuerzo y la capacidad aeróbica.

Aplicación en fisioterapia

El fisioterapeuta valora la capacidad funcional, selecciona ejercicio aeróbico y de fuerza, dosifica la intensidad y monitoriza la respuesta durante las sesiones.

Limitaciones y seguridad

Los estudios varían en población, gravedad de la enfermedad y protocolos. Por ello, los resultados no se aplican de igual manera a todos. El ejercicio requiere valoración clínica, progresión individual y seguimiento según el riesgo de cada persona.

CONCLUSIÓN

La evidencia consultada indica que la rehabilitación cardíaca basada en ejercicio puede mejorar la capacidad de ejercicio en adultos con insuficiencia cardíaca. Los indicadores más utilizados incluyen la distancia en la prueba de caminata de seis minutos y el VO_2 pico.

También se describen beneficios en calidad de vida y posibles reducciones de hospitalizaciones. El programa debe adaptarse a la condición clínica, la capacidad funcional y la respuesta individual.

Importancia para fisioterapia

El ejercicio prescrito y supervisado es una herramienta importante para favorecer la funcionalidad y la participación en las actividades cotidianas.

BIBLIOGRAFIA

1. Gore S, Khanna H, Kumar A. Effects of comprehensive outpatient cardiac rehabilitation on exercise capacity, functional status, and quality of life in people with heart failure: a systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2023;103(11):pzad119. doi:10.1093/ptj/pzad119.
2. Molloy C, Long L, Mordi IR, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with heart failure. Cochrane Database Syst Rev. 2024;3(3):CD003331. doi:10.1002/14651858.CD003331.pub6.
3. Yang C, Zhang L, Cheng Y, et al. High intensity interval training vs. moderate intensity continuous training on aerobic capacity and functional capacity in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. Front Cardiovasc Med. 2024;11:1302109. doi:10.3389/fcvm.2024.1302109.