ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Sedentarismo y salud cardiopulmonar: Importancia de interrumpir periodos prolongados de sedestación

Autores: Daniela Caicedo, Mercedes Castillo, Sara Castillo, Fredy Klinger y Lionard Rivas.
Docente: *Diana Lucia Quiceno*
Curso: *Técnicas de intervención en ft II* **Semestre:** VII

Introducción

El sedentarismo es un problema importante para la salud, ya que permanecer sentado durante períodos prolongados puede afectar la circulación sanguínea y favorecer la aparición de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Las actividades cotidianas, como estudiar, trabajar o utilizar dispositivos electrónicos, contribuyen a aumentar el tiempo de inactividad. Por esta razón, es importante incorporar pausas activas, caminatas cortas y movimientos durante el día. Desde la fisioterapia, promover estos hábitos permite prevenir riesgos para la salud.

Planteamiento del problema

La permanencia prolongada en posición sentada es una situación frecuente en los espacios académicos y laborales, donde la falta de pausas y el desconocimiento de sus consecuencias favorecen periodos continuos de inactividad. Esta situación puede relacionarse con alteraciones en los indicadores cardiovasculares y metabólicos, especialmente cuando se acompaña de niveles insuficientes de actividad física. Por esta razón, surge la necesidad de promover estrategias que permitan interrumpir estos periodos .

Metodología

Se realizó una revisión bibliográfica sobre sedentarismo, actividad física y salud cardiopulmonar y metabólica. Se consultaron las bases de datos PubMed, Scopus y Springer, identificando diez artículos científicos, de los cuales se seleccionaron seis según su pertinencia. Finalmente, se analizaron y compararon sus objetivos, intervenciones y principales resultados para identificar los efectos de interrumpir la sedestación y el papel de la fisioterapia en la promoción de hábitos saludables.

Resultados

La revisión de los seis artículos evidenció que reducir el tiempo sedentario y aumentar la actividad física se relaciona con una mejor capacidad cardiorrespiratoria. Asimismo, interrumpir la sedestación prolongada mediante pausas de movimiento genera efectos favorables en indicadores como la glucosa sanguínea, la presión arterial, los triglicéridos y la función vascular. También se encontró que la frecuencia de las pausas puede influir en algunos resultados metabólicos. Sin embargo, los beneficios varían según el indicador evaluado y la evidencia disponible presenta limitaciones en su calidad.

Discusión

Los seis artículos utilizados evidencian una relación entre el comportamiento sedentario, la actividad física y los indicadores de salud cardiovascular, metabólica y cardiorrespiratoria. Los hallazgos señalan que la sedestación prolongada se asocia con alteraciones en parámetros como la presión arterial, la glucosa sanguínea y la función vascular. Asimismo, las interrupciones mediante pausas activas y periodos breves de movimiento muestran efectos favorables resaltando la importancia de reducir el tiempo sedentario y promover hábitos activos desde la fisioterapia.

Conclusión

Interrumpir los periodos prolongados de sedestación mediante pausas activas y pequeños momentos de movimiento favorece el cuidado de la salud cardiovascular y metabólica. Por ello, la fisioterapia cumple un papel importante en la prevención y promoción de hábitos saludables, fomentando la reducción del sedentarismo y la actividad física regular. Sin embargo, se requieren más investigaciones para determinar los beneficios a largo plazo y las características ideales de estas pausas.