

# Cálculo diferencial e Integral I

## Semestre 2023-1

### Grupo 4031

Problemas de: números reales  
Torres Brito David Israel

August 20, 2022

1. Pruebe que si  $a, b \in \mathbb{R}$ , entonces  $-(a + b) = (-a) + (-b)$ .

**Demostración:**

$0 = 0 + 0$	Neutro aditivo
$= (a + (-a)) + (b + (-b))$	Neutro aditivo
$= (a + b) + ((-a) + (-b))$	Asociatividad

Debido a que el inverso aditivo es único, tenemos que  $(-a) + (-b) = -(a + b)$ . □

2. Pruebe que si  $a, b \in \mathbb{R}$  son tales que  $a - b = b - a$ , entonces  $a = b$ .

**Demostración:**

$a - b = b - a$	Hipótesis
$(a - b) + b = (b - a) + b$	Ley de la cancelación
$a = (b + b) - a$	Asociando
$a + a = b + b$	Ley de la cancelación
$2a = 2b$	Definición
$a = b$	Ley de la cancelación

□

3. Pruebe que si  $a, b \in \mathbb{R}$ , entonces  $-(a - b) = b - a$ .

**Demostración:**

$-(a - b) = -(a + (-b))$	Notación
$= (-a) + (-(-b))$	Por ejercicio 1
$= (-a) + (b)$	Unicidad del inverso aditivo
$= b - a$	Conmutatividad

□

4. Pruebe que si  $a, b \in \mathbb{R}$  son tales que  $ab = 0$ , entonces  $a = 0$  o  $b = 0$ .

**Demostración:** Primero demostraremos que si  $a \in \mathbb{R}$ , entonces  $a \cdot 0 = 0$ .

$a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$	Neutro aditivo
$= a \cdot 0 + (a + (-a))$	Neutro aditivo
$= a \cdot 0 + (a \cdot 1 + (-a))$	Identidad de la multiplicación
$= (a \cdot 0 + a \cdot 1) + (-a)$	Asociatividad
$= (a \cdot (0 + 1)) + (-a)$	P. Distributiva
$= a \cdot 1 + (-a)$	Neutro aditivo
$= a + (-a)$	Identidad de la multiplicación
$= 0$	Neutro aditivo

□

Ahora, demostramos el ejercicio 4. Supongamos que  $a \neq 0$ .

$b = b \cdot 1$	Identidad de la multiplicación
$= b \cdot (a \cdot a^{-1})$	Inverso multiplicativo
$= (b \cdot a) \cdot a^{-1}$	Asociatividad
$= (a \cdot b) \cdot a^{-1}$	Conmutatividad
$= 0 \cdot a^{-1}$	Por hipótesis
$= a^{-1} \cdot 0$	Conmutatividad
$= 0$	Probado arriba

□

5. Pruebe que si  $a, b \in \mathbb{R}$  son tales que  $a^2 = b^2$ , entonces  $a = b$  o  $a = -b$ .

**Demostración:**

$0 = b^2 - b^2$	Inverso aditivo
$= a^2 - b^2$	Por hipótesis
$= a \cdot a - b \cdot b$	Definición
$= (a \cdot a - b \cdot b) + 0$	Neutro aditivo
$= (a \cdot a - b \cdot b) + (a \cdot b - a \cdot b)$	Inverso aditivo
$= (a \cdot a - b \cdot b + a \cdot b) + (-a \cdot b)$	Asociatividad
$= (a \cdot a + a \cdot b - b \cdot b) + (-a \cdot b)$	Conmutatividad
$= (a \cdot a + a \cdot b) + (-b \cdot b - a \cdot b)$	Asociatividad
$= (a \cdot a + a \cdot b) + (-b \cdot b) + (-a \cdot b)$	Notación
$= (a \cdot a + a \cdot b) - (b \cdot b + a \cdot b)$	Por ejercicio 1
$= a(a + b) - b(b + a)$	P. Distributiva
$= (a + b) \cdot (a - b)$	P. Distributiva

Por el ejercicio 4, de la igualdad anterior tenemos que  $a + b = 0$  o  $a - b = 0$ . Sumando inverso aditivo de  $b$  tenemos  $a = -b$  o  $a = b$ .

□

6. Pruebe que si  $a, b \in \mathbb{R}$  son distintos de 0 y tales que  $ab^{-1} = ba^{-1}$ , entonces  $a = b$  o  $a = -b$ .

**Demostración:**

$ab^{-1} = ba^{-1}$	Por hipótesis
$ab^{-1} \cdot b = ba^{-1} \cdot b$	Ley de la cancelación
$a(b^{-1} \cdot b) = a^{-1}(b \cdot b)$	Asociando
$a = a^{-1}(b \cdot b)$	Identidad de la multiplicación
$a \cdot a = a^{-1}(b \cdot b) \cdot a$	Ley de la cancelación
$a \cdot a = (b \cdot b)(a^{-1} \cdot a)$	Asociando
$a \cdot a = b \cdot b$	Identidad de la multiplicación
$a^2 = b^2$	Definición

Por el ejercicio 5, la igualdad anterior implica que  $a = b$  o  $a = -b$ . □

7. Determine si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. Pruebe su respuesta.

- (a) Si  $a, b \in \mathbb{R}$ , entonces  $a < a + b$ .

**Respuesta:** Falso.

**Demostración:** Contraejemplo:  $b = 0$ . □

- (b) Si  $a, b \in \mathbb{R}$ , entonces  $a < a + b$  o  $b < a + b$ .

**Respuesta:** Falso.

**Demostración:** Sea  $a = b = 0$ ; tanto  $a < a + b$  como  $b < a + b$  fallan en cumplirse. □

- (c) Si  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  son tales que  $a + c < b + d$ , entonces  $a < b$  y  $c < d$ .

**Respuesta:** Falso.

**Demostración:** Sea  $a = 0$ ,  $b = 2$  y  $c = d = 1$ , tenemos que se cumple la hipótesis  $0 + 1 < 2 + 1$ , pero la proposición  $c < d$  es falsa. □

- (d) Si  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  son tales que  $ac < bd$ , entonces  $a < b$  y  $c < d$ .

**Respuesta:** Falso.

**Demostración:** Sea  $a = 1$ ,  $b = d = -1$  y  $c = 0$ , con lo que se cumple la hipótesis  $(1)(0) = 0 < 1 = (-1)(-1)$ , pero la proposición  $a = 1 < -1 = b$  y  $c = 0 < -1 = d$  es falsa. □

- (e) Si  $a, b \in \mathbb{R}$  son tales que  $ab = a$ , entonces  $b = 1$ .

**Respuesta:** Falso.

**Demostración:** Sea  $a = 0$  y  $b = -1$ . En el ejercicio 4 demostramos que  $ab = (0)(-1) = 0$ , con lo que se cumple la hipótesis  $0 = ab = a = 0$ , pero  $b \neq 1$ . □

- (f) Si  $a, b \in \mathbb{R}$  son tales que  $a^2 \leq b^2$ , entonces  $a \leq b$ .

**Respuesta:** Falso.

**Demostración:** Sea  $a = 2$  y  $b = -2$ , tenemos que la hipótesis se cumple  $a^2 = 4 \leq 4 = b^2$ , pero la proposición  $a = 2 \leq -2$  es falsa. □