

Cálculo diferencial e Integral I
Semestre 2023-1
Grupo 4031

Problemas de: inducción
Torres Brito David Israel

September 8, 2022

1. Pruebe que

$$\sum_{i=1}^n i(i+1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + i \cdot (i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

para toda $n \in \mathbb{N}$.

Demostración: Procederemos por inducción sobre n .

i) Se verifica para $n = 1$:

$$(1)(1+1) = \frac{1(1+1)(1+2)}{3}$$

$$(1)(2) = \frac{1(2)(3)}{3}$$

$$2 = \frac{6}{3}$$

$$2 = 2$$

ii) Supongamos que la fórmula se cumple para $n = k$, es decir, supongamos que

$$\sum_{i=1}^k i(i+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$$

iii) Demostraremos, a partir de (ii), que la fórmula se cumple también para $n = k + 1$. Es decir, probaremos que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i(i+1) &= \frac{(k+1)((k+1)+1)((k+1)+2)}{3} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \end{aligned}$$

En efecto, notemos que

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{k+1} i(i+1) &= \sum_{i=1}^k i(i+1) + (k+1)((k+1)+1) \\
 &= \sum_{i=1}^k i(i+1) + (k+1)(k+2) \\
 &= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1) \cdot (k+2) && \text{Por hipótesis de inducción} \\
 &= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + \frac{3(k+1) \cdot (k+2)}{3} \\
 &= k \cdot \frac{(k+1)(k+2)}{3} + 3 \cdot \frac{(k+1) \cdot (k+2)}{3} \\
 &= \frac{(k+1)(k+2)}{3} \cdot (k+3) \\
 &= \frac{(k+1)(k+2)}{3} \cdot \frac{3(k+3)}{3} \\
 &= \frac{(k+1)(k+2) \cdot 3(k+3)}{3 \cdot 3} \\
 &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}
 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\sum_{k=1}^n k(k+1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n \cdot (n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

para toda $n \in \mathbb{N}$. □

2. Pruebe que

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

Para toda $n \in \mathbb{N}$.

Demostración: Procederemos por inducción sobre n .

i) Se verifica para $n = 1$:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{(2(1)-1)(2(1)+1)} &= \frac{1}{2(1)+1} \\
 \frac{1}{(2-1)(2+1)} &= \frac{1}{2+1} \\
 \frac{1}{(1)(3)} &= \frac{1}{3} \\
 \frac{1}{3} &= \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

ii) Supongamos que la fórmula se cumple para $n = k$, es decir, supongamos que

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

iii) Demostraremos, a partir de (ii), que la fórmula se cumple también para $n = k + 1$. Es decir, probaremos que

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} &= \frac{k+1}{2(k+1)+1} \\ &= \frac{k+1}{2k+2+1} \\ &= \frac{k+1}{2k+3}\end{aligned}$$

En efecto, notemos que

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} + \frac{1}{(2(k+1)-1)(2(k+1)+1)} \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} + \frac{1}{(2k+2-1)(2k+2+1)} \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \quad \text{Hip. Ind.} \\ &= \frac{k(2k+3)}{(2k+1)(2k+3)} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k(2k+3)+1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{(2k^2+3k)+1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{(2k^2+k+2k)+1}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{(2k^2+k)+(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k(2k+1)+(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{(2k+1)(k+1)}{(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{k+1}{2k+3}\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

Para toda $n \in \mathbb{N}$.

□

3. Pruebe que $4^n - 1$ es un múltiplo de 3 para toda $n \in \mathbb{N}$.

Demostración: Procedemos por inducción sobre n .

i) Se verifica para $n = 1$.

$$\begin{aligned} 4^{(1)} - 1 &= 4 - 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

ii) Supongamos que la proposición es válida para $n = k$, es decir, suponemos que $\exists p \in \mathbb{N}$ tal que

$$4^k - 1 = 3p$$

iii) Probaremos que la proposición es válida para $n = k + 1$, es decir, probaremos que $\exists q \in \mathbb{N}$ tal que $4^{k+1} - 1 = 3q$.

Recordemos que

$$a^k - b^k = (a - b) \sum_{i=0}^{k-1} a^{k-1-i} b^i \quad \text{Demostrado en clase}$$

Por lo que,

$$\begin{aligned} 4^{k+1} - 1 &= 4^{k+1} - 1^{k+1} \\ &= (4 - 1) \sum_{i=0}^k 4^{k-i} \cdot 1^i \\ &= 3 \sum_{i=0}^k 4^{k-i} \\ &= 3q, q \in \mathbb{N} \quad \text{Por hipótesis de inducción} \end{aligned}$$

Por tanto, $4^n - 1$ es un múltiplo de 3 para toda $n \in \mathbb{N}$. □

4. Pruebe que $5^n - 3^n$ es un número par para todos $n \in \mathbb{N}$.

Demostración: Procedemos por inducción sobre n .

i) Se verifica para $n = 1$.

$$\begin{aligned} 5^{(1)} - 3^{(1)} &= 5 - 3 \\ &= 2 \end{aligned}$$

ii) Supongamos que la proposición es válida para $n = k$, es decir, suponemos que $\exists p \in \mathbb{N}$ tal que

$$5^k - 3^k = 2p$$

iii) Probaremos que la proposición es válida para $n = k + 1$, es decir, probaremos que $\exists q \in \mathbb{N}$ tal que $5^{k+1} - 3^{k+1} = 2q$.

Recordemos que

$$a^k - b^k = (a - b) \sum_{i=0}^{k-1} a^{k-1-i} b^i \quad \text{Demostrado en clase}$$

Por lo que,

$$\begin{aligned}
 5^{k+1} - 3^{k+1} &= (5 - 3) \sum_{i=0}^k 4^{k-i} \cdot 3^i \\
 &= 2 \sum_{i=0}^k 4^{k-i} \cdot 3^i \\
 &= 2q, q \in \mathbb{N}
 \end{aligned}$$

Por tanto, $5^n - 3^n$ es un número par para todos $n \in \mathbb{N}$. □

5. Pruebe que todo número natural $n \geq 7$ es igual a la suma de dos números; uno múltiplo de 3 y el otro múltiplo de 4.

Demostración: Procedemos por inducción sobre n .

- i) Verificamos que se cumple para $n = 7$.

$$7 = 3 + 4$$

- ii) Supongamos que la proposición es válida para $n = k > 7$, es decir, suponemos que $\exists p, q \in \mathbb{Z}$ tales que $k = 3q + 4p$.

- iii) Probaremos que la proposición es válida para $n = k + 1 > 7$, es decir, probaremos que $\exists s, t \in \mathbb{Z}$ tales que $k + 1 = 3s + 4t$. En efecto, por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned}
 k + 1 &= 3q + 4p + 1 \\
 &= 3q + 4p + 4 - 3 \\
 &= 3q - 3 + 4p + 4 \\
 &= 3(q - 1) + 4(p + 1) \\
 &= 3s + 4t
 \end{aligned}
 \qquad s = q - 1 \text{ y } t = p + 1.$$

□

6. Pruebe que si $a \in \mathbb{R}$ es tal que $a \geq -1$, entonces $(1 + a)^n \geq 1 + na$ para toda $n \in \mathbb{N}$. (Esta desigualdad es conocida como *desigualdad de Bernoulli*).

Demostración: Por inducción sobre n .

- i) Verificamos que la desigualdad se cumple para $n = 1$.

$$\begin{aligned}
 (1 + a)^1 &\geq 1 + (1)a \\
 1 + a &\geq 1 + a
 \end{aligned}$$

- ii) Supongamos que se cumple para $n = k$. Es decir, supongamos que

$$(1 + a)^k \geq 1 + ka$$

- iii) Demostraremos a partir de (ii) que

$$(1 + a)^{k+1} \geq 1 + (k + 1)a$$

Notemos que

$$\begin{aligned}
 (1 + a)^{k+1} &= (1 + a)^k \cdot (1 + a) \\
 &\geq (1 + ka) \cdot (1 + a) && \text{Hipótesis de inducción} \\
 &= (1 + a) + ka(1 + a) \\
 &= 1 + a + ka + ka^2 \\
 &= 1 + (1 + k)a + ka^2
 \end{aligned}$$

Debido a que $k \in \mathbb{N}$ y $a^2 \geq 0$, sigue que $ka \geq 0$, entonces, de la igualdad anterior sigue que $1 + (1+k)a + ka^2 \geq 1 + (k+1)a$, y por transitividad, $(1+a)^{k+1} \geq 1 + (k+1)a$. \square

7. Pruebe que

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{2n}$$

Demostración: Procederemos por inducción sobre n .

i) Verificamos que la desigualdad se cumple para $n = 1$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{1^2} &< 2 - \frac{1}{2(1)} \\ \frac{1}{1} &< 2 - \frac{1}{2} \\ 1 &< \frac{3}{2} \end{aligned}$$

ii) Supongamos que la desigualdad es válida para $n = k$, es decir, suponemos que

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{2k}$$

iii) Demostraremos a partir de (ii) que la desigualdad se cumple para $n = k + 1$, osea

$$\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{2(k+1)}$$

Notemos que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} \\ &< 2 - \frac{1}{2k} + \frac{1}{(k+1)^2} \end{aligned} \quad \text{Hipótesis de inducción}$$

8. Pruebe que todo conjunto con n elementos tiene 2^n subconjuntos (diferentes), para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Demostración:

i) Verificamos que se cumple para $n = 1$. En efecto, los únicos subconjuntos que un conjunto de cardinalidad $n = 1$ son el vacío y el mismo, esto es $2^{(1)} = 2$.

ii) Supongamos que la proposición es válida para $n = k$.

iii) Sea A un conjunto, y $n = k + 1$ la cardinalidad de A . Consideremos el conjunto $A' = A \setminus \{a\}$, donde $a \in A$. Vemos que la cardinalidad de A' es k , es decir, $|A'| = k$.