

# Gnidosz blotny

Dasher

7 listopada 2017

# Spis Tresci

Gnidosz blotny

Morfologia

Lodyga

Liscie

Kwiaty

Owoc

Korzen

Biologia i ekologia

Zmiennosc

Zagrozenia i ochrona

# Gnidosz blotny

(*Pedicularis palustris* L.) — gatunek należący do rodziny zarzawowatych. Występuje w Europie, na Kaukazie i w Kanadzie. W Polsce dość częsty na całym nizinach.



Rysunek: Gnidosz blotny

# Lodyga

Wzniesiona, prosta, o wysokości 20—60 cm, góra rozgaleziająca się. Jest prawie naga, w środku pusta.

# Liscie

Pierzastodzielne, o lancetowatych i karbowanych odcinkach, siedzące, żółtozielonego koloru.

# Kwiaty

Zebrane w luzne grono. Są to kwiaty grzbieciste, wyrastają w kątach liści na krótkich szypułkach. Mają dwuwargowy rozdęty kielich z pierzastowciętymi i odgiętymi do tyłu łatkami. Jest to kielich trwały, pozostający po przekwitnięciu. Purpurowa lub różowa korona o rurce dłuższej od kielicha, orzesiona na bokach. Dolna warga zamyka wejście do gardzieli korony, górna, dwusłupkowa warga jest ściśnięta po bokach. 1 słupek, 4 dwusilne pręciki ukryte pod górną wargą. Miodniki umieszczone u podstawy słupka, ale dostęp do nich utrudniają włoski pręcików.

Dwukomorowa, otoczona kielichem, okrągła torebka.

# Korzen

Posiada ssawki, którymi wrasta w korzenie sąsiadujących roślin.



# Biologia i ekologia

Roslina jednoroczna lub dwuletnia, hemikryptofit. Jest polpasozytem. Na użytkowanych łąkach uznawana za chwast, gdyż osłabia sąsiednie rośliny wysysając z nich wodę i sole mineralne. Roślina miododajna, owadopylna, kwitnie od maja do lipca. Zapyłana jest przeważnie przez trzmiele. Roślina trująca. Rosnie na mokrych łąkach i torfowiskach. W górach występuje po regiel dolny. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Scheuchzerio-Caricetea nigrae.

# Zmiennosc

Występuje w 2 podgatunkach:

- ▶ *Pedicularis palustris* L. subsp. *opsiantha* (Ekman) Almquist z Uznamu — o koronie średnicy ok. 15 mm i rozgalezieniach łodygi o grubości prawie równej ich długości.
- ▶ *Pedicularis palustris* L. subsp. *palustris*

W latach 2004-2014 roślina była objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, od 2014 roku podlega ochronie częściowej. Roślina została umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Roslin jako gatunek narażony na wymarcie (kategoria zagrożenia VU). Ta sama kategoria zagrożenia otrzymała w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006, 2016). Zagrożeniem jest zanikanie stanowisk wynikające z osuszania terenów podmokłych i przekształcania ich w łąki i inne tereny użytkowe. Wiele stanowisk znajduje się na obszarach chronionych, m.in. w Białowieżskim, Wielkopolskim i Tatrzańskim Parku Narodowym.