Abschlussbericht
Kulturpflanzen- und Entwicklungsstadiumsklassifikation

Domänenprojekt 2
Team: AE-ROOT

Stand: 23. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Domäne **3**

1.1 Aufgabe und Motivation 3

1.2 Hyperspektrale Messungen und Kulturentwicklung 3

1.3 Untersuchungsziele und Abgrenzung 3

2 Daten und explorative Analyse **5**

2.1 Datengrundlage und Zielgrößen 5

2.2 Zentrale Befunde und Konsequenzen 5

3 Methodik und Validierung **5**

3.1 Datenaufbereitung und Merkmalsbildung 5

3.2 Evaluationsprotokoll und Reproduzierbarkeit 5

4 Modellvergleich und Auswahl **5**

4.1 Baseline und untersuchte Strategien 5

4.2 Vergleich und finales Modell 5

5 Datenreduktion **5**

6 Ergebnisse und Interpretation **5**

6.1 Vorhersageleistung und Fehleranalyse 5

6.2 Fachliche Einordnung und Erklärbarkeit 5

7 Modellkarte **5**

7.1 Identität und vorgesehene Nutzung 5

7.2 Ein- und Ausgaben, Daten und Leistung 5

7.3 Annahmen, Grenzen und Risiken 5

8 Fazit und Ausblick **5**

A Ergänzende Ergebnisse und Reproduktion **6**

1 Ziel und Domäne

1.1 Aufgabe und Motivation

Ziel des Projekts ist die gemeinsame Vorhersage der Kulturart (`Crop`) und ihres Entwicklungsstadiums (`Stage`) aus hyperspektralen Satellitenmessungen. Die Aufgabe wird als Challenge bearbeitet, in der alle Teams dieselbe Klassifikationsaufgabe untersuchen. Neben der Vorhersageleistung verlangt die Aufgabenstellung einen begründeten Vergleich verschiedener Modellierungsstrategien und eine Untersuchung des Zielkonflikts zwischen Datenreduktion und Klassifikationsleistung [1].

Die Kulturart beschreibt, was auf einer Fläche wächst; das Entwicklungsstadium ordnet die Beobachtung in den saisonalen Verlauf ein. Solche Informationen können landwirtschaftliches Monitoring, Agrarstatistik und die Planung von Bewirtschaftungsmaßnahmen unterstützen. Fernerkundung ermöglicht dabei die wiederholte Beobachtung großer oder schwer zugänglicher Gebiete und kann Feldbegehungen ergänzen [2]. Das vorliegende Projekt untersucht jedoch die Klassifikationsleistung auf den bereitgestellten Daten. Ob daraus ein praktischer Nutzen etwa für Bewässerung, Düngung oder Ernteplanung entsteht, wird nicht nachgewiesen.

1.2 Hyperspektrale Messungen und Kulturentwicklung

Ein Spektrum beschreibt die Reflexion einer Oberfläche über verschiedene Wellenlängen. Hyperspektrale Sensoren erfassen viele schmale Spektralbänder und können dadurch feine Unterschiede im Reflexionsverhalten abbilden. Grundlage der Aufgabe sind Messungen des Sensors Hyperion an Bord des Satelliten Earth Observing-1 (EO-1). Hyperion erfasste 220 Bänder im Bereich von etwa 400 bis 2.500 nm bei einer nominellen räumlichen Auflösung von 30 m [3]. Davon zu unterscheiden sind die 198 bereitgestellten Bandspalten zwischen 427 und 2.395 nm. Ihre Reihenfolge beschreibt die Wellenlängenachse einer Beobachtung, keine Zeitreihe.

Bei grüner Vegetation absorbieren Blattpigmente vor allem blaues und rotes Licht. Der starke Anstieg zum nahen Infrarot wird als Red Edge bezeichnet; die hohe Reflexion im nahen Infrarot hängt wesentlich mit der inneren Blattstruktur zusammen. Im kurzwelligen Infrarot beeinflussen unter anderem der Wassergehalt und trockene Pflanzenbestandteile das Signal. Mit der Kulturentwicklung verändern sich außerdem Blattfläche, Bodenbedeckung und Pflanzenhöhe. Diese Zusammenhänge motivieren die Klassifikation anhand spektraler Signaturen, garantieren aber keine eindeutige Trennung: Bodenanteile, Aufnahmebedingungen und Unterschiede innerhalb einer Kultur können ebenfalls zum gemessenen Spektrum beitragen.

Unterschieden werden Mais, Sojabohne, Winterweizen, Baumwolle und Reis sowie sechs Stadienkategorien: `Emerge_VEarly`, `Early_Mid`, `Critical`, `Late`, `Mature_Senesc` und `Harvest`. Diese Labels werden als vorgegebene Kategorien behandelt, nicht als bestätigte Zuordnung zu standardisierten phänologischen Skalen. Zusätzlich stehen die agroökologische Zone (`AEZ`) und der Aufnahmemonat (`Month`) als Kontextmerkmale zur Verfügung. Agroökologische Zonen gruppieren Gebiete nach natürlichen Anbaubedingungen wie Klima, Böden und Vegetationsperiode [1].

1.3 Untersuchungsziele und Abgrenzung

Die Modellierung muss ungleiche Klassenhäufigkeiten, seltene Crop-Stage-Paare und mögliche spektrale Überlappungen berücksichtigen. Kulturart und Stadium sind dabei keine unabhängigen Zielgrößen: Stadien können sich je nach Kultur unterschiedlich im Spektrum ausdrücken. Nicht beobachtete Kombinationen belegen allerdings nicht, dass diese fachlich unmöglich sind. Vor diesem Hintergrund leiten drei Fragen die Untersuchung:

1. Welche Modellierungsstrategie sagt Kulturart und Entwicklungsstadium unter vergleichbaren Evaluationsbedingungen am zuverlässigsten vorher?
2. Welchen zusätzlichen Nutzen liefern AEZ, Aufnahmemonat und abgeleitete Merkmale gegenüber den Spektralbändern allein?
3. Wie weit lässt sich der Eingabeumfang reduzieren, und welcher Verlust an Klassifikationsleistung entsteht dabei?

Die primäre Bewertungsmetrik ist die Balanced Accuracy, die den Recall gleichgewichtet über die Klassen mittelt. Ergänzend werden Macro-F1 und Samples-F1 betrachtet. Kulturart und Stadium werden jeweils separat ausgewertet; die gemeinsame Vorhersage wird zusätzlich untersucht [1]. Die Ergebnisse gelten zunächst für die untersuchte Datenbasis. Eine Übertragbarkeit auf andere Regionen, Jahre oder Sensoren und die Eignung für einen operativen Einsatz sind damit nicht belegt.

2 Daten und explorative Analyse

2.1 Datengrundlage und Zielgrößen

2.2 Zentrale Befunde und Konsequenzen

3 Methodik und Validierung

3.1 Datenaufbereitung und Merkmalsbildung

3.2 Evaluationsprotokoll und Reproduzierbarkeit

4 Modellvergleich und Auswahl

4.1 Baseline und untersuchte Strategien

4.2 Vergleich und finales Modell

5 Datenreduktion

6 Ergebnisse und Interpretation

6.1 Vorhersageleistung und Fehleranalyse

6.2 Fachliche Einordnung und Erklärbarkeit

7 Modellkarte

7.1 Identität und vorgesehene Nutzung

7.2 Ein- und Ausgaben, Daten und Leistung

7.3 Annahmen, Grenzen und Risiken

8 Fazit und Ausblick

Literatur

[1] Domänenprojekt 2 (2026). *Beschreibung Domänenprojekt 2, Vorabversion 2026/27; Kickoff-Folien zur Aufgabenbeschreibung.* Bereitgestellte Projektunterlagen.

[2] Mulla, D. J. (2013). Twenty five years of remote sensing in precision agriculture: Key advances and remaining knowledge gaps. *Biosystems Engineering*, 114(4), 358–371. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.08.009.

[3] NASA (2025). *Earth Observing-1.* NASA Earth Observatory. https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/earth-observing-1.

A Ergänzende Ergebnisse und Reproduktion