

Definanse M y E de la siguiente manera:

$$M = \sup \{|f(x)| \mid x \in [a, b]\}$$

$$E = \{x \in [a, b] \mid f(x) \text{ no es continua}\}$$

Dado $\varepsilon > 0$, como α es continua en E , se pueden tomar intervalos disjuntos que cubren a E de la siguiente forma:

Para cada $e_i \in E$, se toman u_i, v_i tales que $\alpha(v_i) - \alpha(u_i) < \varepsilon$.

Sea P una partición de $[a, b]$ tal que:

$$(\forall i \mid 1 \leq i \leq |E| : u_i, v_i \in P \wedge (\forall x \mid x \in (u_i, v_i) : x \notin P))$$

En $[a, b] - \bigcup_{i=1}^{|E|} (u_i, v_i)$, que es un conjunto compacto, f es continua y por ende, uniformemente continua, por lo que existe $\delta > 0$ tal que:

$$\left(\forall x, y \mid x, y \in [a, b] - \bigcup_{i=1}^{|E|} (u_i, v_i) : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon \right)$$

Sea V el conjunto de todos los v_i . Se condiciona la partición P para que también cumpla que:

$$(\forall i \mid 1 \leq i \leq n : x_i \notin V \Rightarrow \Delta x_i < \delta)$$

$$U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha)$$

=

$$\sum_{i=1}^n (M_i^f - m_i^f) \Delta \alpha_i$$

=

$$\sum_{\substack{i=0 \\ x_i \notin V}}^n (M_i^f - m_i^f) \Delta \alpha_i + \sum_{\substack{i \geq 1 \\ x_i \in V}} (M_i^f - m_i^f) \Delta \alpha_i$$

< $\langle f \leq 2M, f \text{ es uniformemente continua} \rangle$

$$[\alpha(b) - \alpha(a)]\varepsilon + 2|E|M\varepsilon$$