

Cálculo Integral

Contenido de clase

David Gabriel Corzo Mcmath

2019-09-20 08:07

Índice general

I WebAssign	4
1. Sustitución	5
2. Área Entre Curvas	12
3. Volúmenes	20
4. Longitud de arco	30
II Laboratorios	36
5. Laboratorio #1	37
6. Laboratorio #2	44
7. Laboratorio #3	50
8. Laboratorio #4	59
9. Laboratorio #5	66
10. Laboratorio #6	72
11. Laboratorio #8	78
III Cortos	86
12. Examen Corto # 1	87
13. Examen Corto # 2	89
14. Examen Corto # 3	91
15. Examen Corto # 4	93
16. Examen Corto # 5	94
17. Examen Corto # 6	96
18. Examen Corto # 7	100
19. Examen Corto # 8	102

20.Examen Corto # 9	105
IV Simulacros	107
21.Parcial Simulacro I	108
22.Simulacro primer intento de terminarlo	110
23.Simulacro segundo intento para estudiar	116
24.Simulacro bota parcial	120
V Parciales	122
25.Parcial I	123
VI Actividades especiales	136
26.Actividad de pts. Extra #1	137
27.Actividad de pts. Extra #2	139
28.Actividad de pts. Extra #3, problemas varios de integración	141
VII Documentos de Apoyo	145
29.Identidades trigonométricas	146
30.Integrales indefinidas básicas	148
31.Teorema fundamental del cálculo	150
VIII Notas de prueba de DM para entrada a la UFM, pts.extra en Cálculo Integral	152
IX Honores del curso	159
32.Agradecimientos por programa en Python	160

Parte I

WebAssign

Capítulo 1

Sustitución

Webassign

Sustitución

①

$$\int \cos(6x) dx = \frac{1}{6} \int \cos(u) du = \frac{\sin(u)}{6} + C$$
$$u = 6x$$
$$\frac{du}{6} = dx$$

②

$$\int x^2 \sqrt{x^3 + 13} dx = \int \sqrt{u} \cdot \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int u^{3/2} = \frac{1}{3} \frac{(x^3 + 13)^{3/2}}{3/2}$$
$$u = x^3 + 13$$
$$du = 3x^2 + 0 dx$$
$$\frac{du}{3} = x^2 dx$$
$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{(x^3 + 13)^{3/2}}{\frac{2}{3}} =$$
$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{2(x^3 + 13)^{3/2}}{3}$$

③

$$\int \sin^3 \theta \cos \theta d\theta = u = \sin \theta$$
$$u = \sin \theta$$
$$du = \cos \theta d\theta$$
$$= \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C$$
$$= \frac{\sin^4 \theta}{4} + C$$

④

$$\int \frac{x^3}{x^4 - 2} dx = \int \frac{du}{u} = \ln(u) + C$$
$$u = x^4 - 2$$
$$du = 4x^3 - 0 dx$$
$$\frac{du}{4} = x^3 dx$$
$$= \frac{\ln|x^4 - 2|}{-4} + C$$

$$\begin{aligned}
 ⑤ \int (4 - 4x)^7 dx &= \int u^7 \cdot -\frac{du}{4} = -\frac{1}{4} \int u^7 du = -\frac{1}{4} \cdot \frac{u^8}{8} \\
 u &= 4 - 4x \\
 du &= -4 dx \\
 -\frac{du}{4} &= dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{(4-4x)^8}{8 \cdot 4} + C \\
 &= -\frac{(4-4x)^8}{32} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ⑥ \int \sin(t) \sqrt{1 + \cos(t)} dt &= -\int \sqrt{u} du \\
 u &= 1 + \cos(t) \\
 du &= (\theta - \sin(t)) dt \\
 -du &= \sin(t) dt
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{u^{3/2}}{3/2} + C \\
 &= -\frac{(1 + \cos(t))^{3/2}}{3/2} \\
 &= -\frac{2(1 + \cos(t))^{3/2}}{3} + C
 \end{aligned}$$

$\sin \theta$ \sqrt{u} $\cos \theta$
 $\tan \theta$ 1 $\sec \theta$
 $\csc \theta$

$$\begin{aligned}
 ⑦ \int \frac{e^u}{(1 - e^u)^2} du &= -\int \frac{1}{(u)^2} du = -\int u^{-2} du \\
 \bar{u} &= 1 - e^u \\
 d\bar{u} &= \theta - e^u du \\
 -d\bar{u} &= e^u du
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\left\{ \frac{u^{-1}}{-1} \right\} \\
 &= -\left\{ \frac{1}{u} \right\} \\
 &= \frac{1}{u} + C \\
 &= \frac{1}{(1 - e^u)} + C
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{8} \quad \int \frac{a + bx^7}{\sqrt{8ax + bx^8}} dx = \frac{1}{8} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{1}{8} \int u^{-1/2} du$$

$$u = 8ax + bx^8$$

$$du = 8a + 8bx^7$$

$$du = 8(a + bx^7)$$

$$\frac{du}{8} = a + bx^7$$

$$= \frac{1}{8} \left\{ \frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} \right\}$$

$$= \frac{1}{8} \left\{ 2u^{1/2} \right\}$$

$$= \frac{1}{8} \cdot \cancel{x} u^{1/2}$$

$$= \frac{\sqrt{8ax + bx^8}}{4} + C$$

$$K = \frac{u^{1/2}}{4} + C$$

$$\textcircled{9} \quad \int \frac{\ln(x)^{16}}{x} dx = \int \ln(x)^{16} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{x} dx \right)}_{du}$$

$$u = \ln(x)$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$= \int u^{16} du = \frac{u^{17}}{17} + C = \frac{\ln^{17}(x)}{17} + C$$

$$\textcircled{10} \quad \int \sec^2 \theta \tan^3 \theta d\theta = \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C$$

$$u = \tan \theta$$

$$du = \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{\tan^4 \theta}{4} + C$$

$$\textcircled{11} \quad \int e^x \sqrt{7 + e^x} dx = \int u du$$

$$u = 7 + e^x$$

$$du = e^x dx$$

$$= \frac{u^2}{2} + C$$

$$= \frac{(7 + e^x)^2}{2} + C$$

$$(12) \int \frac{dx}{tx+g} = \frac{1}{t} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{t} \ln|tx+g| + C$$

$$u = tx+g$$

$$du = (t+0) dx$$

$$\frac{du}{t} = dx$$

$$(18) \int \tan^8(\theta) \sec^2 \theta d\theta = \int u^8 du = \frac{u^9}{9} + C = \frac{\tan^9(\theta)}{9} + C$$

$$u = \tan(\theta)$$

$$du = \sec^2 \theta d\theta$$

$$(17) \int \frac{x^5 dx}{1+x^{12}} = \frac{1}{6} \int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{6} \int \frac{1}{1+u^2} du$$

$$u = x^6$$

$$du = 6x^5 dx$$

$$\frac{du}{6} = x^5 dx$$

$$= \frac{1}{6} \tan^{-1}(u) + C$$

$$= \frac{1}{6} \tan^{-1}(x^6) + C$$

$$(16) \int \cot(18x) dx = \int \frac{\cos(18x)}{\sin(18x)} dx$$

$$u = \sin(18x)$$

$$du = \cos(18x) 18 dx$$

$$\frac{du}{18} = \cos(18x) dx$$

$$= \frac{1}{18} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{18} \ln|u| + C$$

$$= \frac{1}{18} \ln|\sin(18x)| + C$$

(15)

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{\sin(2x)}{28 + \cos^2 x} dx = \int \frac{\sin(2x)}{28 + \frac{1 + \cos(2x)}{2}} dx \\
 &= \int \frac{\sin(2x)}{\frac{57}{2} + \frac{1}{2} + \frac{\cos(2x)}{2}} dx \\
 &= \int \frac{\frac{\sin(2x)}{2}}{\frac{57 + \cos(2x)}{2}} dx = \int \frac{2\sin(2x)}{57 + \cos(2x)} dx = -\frac{2}{2} \int \frac{du}{57 + u} \\
 &= - \int \frac{1}{57 + u} du \\
 &= - \ln |57 + \cos(2x)| + C
 \end{aligned}$$

$u = \cos(2x)$
 $du = -\sin(2x) \cdot 2 dx$
 $-\frac{du}{2} = \sin(2x) dx$

(14)

$$\int (\underbrace{\cot(x)}_u)^{\frac{1}{30}} \underbrace{\csc^2(x)}_{dv} dx = - \int u^{\frac{1}{30}} du = -\frac{(\cot x)^{\frac{31}{30}}}{\frac{31}{30}} + C$$

$u = \cot x$
 $du = -\csc^2 x dx$
 $-du = \csc^2 x dx$

$$\frac{1}{30} + \frac{30}{30} = \frac{31}{30}$$

(13)

$$\int \frac{\cos\left(\frac{\pi}{x^{12}}\right)}{x^{12}} dx = \frac{1}{\pi} \int \cos(u) du = -\frac{1}{\pi} \sin(u) + C$$

$$u = \frac{\pi}{x^{12}} = \pi \cdot x^{-12}$$

$$= -\frac{1}{12\pi} \sin\left(\frac{\pi}{x^{12}}\right) + C$$

$$du = -12\pi x^{-12} dx$$

$$du = -\frac{\pi}{x^{12}}$$

$$-\frac{du}{12\pi} = \frac{1}{x^{12}}$$

(11)

$$\int e^x \sqrt{7+e^x} dx = \int \sqrt{u} du = \frac{u^{3/2}}{3/2} + C$$

$$u = 7 + e^x$$

$$du = e^x dx$$

$$= \frac{2(7+e^x)^{3/2}}{3} + C$$

Capítulo 2

Área Entre Curvas

2019-09-21

Uebassign área entre curvas.

①

$$y_1 = \sqrt[3]{x} \quad y_2 = \frac{1}{x} \quad x = 8$$

$$I_{y_1} = I_{y_2} \text{ en } (1, 1)$$

$$A = \int_1^8 \left[\sqrt[3]{x} - \frac{1}{x} \right] dx = \left[\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} - \ln(x) \right]_1^8 =$$

$$= \left\{ \frac{3}{4}(8)^{\frac{4}{3}} - \ln(8) \right\} - \left\{ \frac{3}{4} - 0 \right\} = \frac{3}{4}(\sqrt[3]{8})^4 - \ln(8) - \frac{3}{4}$$

$$= \frac{3}{4}(2)^4 - \ln(8) - \frac{3}{4} = \frac{16}{4} \cdot 3 - \ln(8) - \frac{3}{4}$$

$$= 4 \cdot 3 - \ln(8) - \frac{3}{4} = 12 - \ln(8) - \frac{3}{4}$$

② $x = y^2 - 4$

$$y = \pm 1$$

$$x = e^y$$

$$A = 2 \int_0^1 [e^y - y^2 + 4] dy = \left[e^y - \frac{1}{3}y^3 + 4y \right]_0^1 =$$

$$= 2 \left[\left\{ e - \frac{1}{3} - 4 \right\} - \{ 0 \} \right]$$

$$\textcircled{3} \quad y = e^x, \quad y = x^2 - 1, \quad x = -1, \quad x = 1$$

$$A = \int_{-1}^1 e^x - (x^2 - 1) dx = \left[e^x - \frac{1}{3}x^3 + x \right]_{-1}^1 =$$

$$= \left\{ e - \frac{1}{3} + 1 \right\} - \left\{ e^{-1} + \frac{1}{3} - 1 \right\}$$

$$= e - \frac{1}{3} + 1 - e^{-1} - \frac{1}{3} + 1$$

$$e - e^{-1} - \frac{2}{3} + \frac{2 \cdot 3}{3}$$

$$e - e^{-1} + \frac{4}{3}$$

$$\text{mcd}(5, 2)$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 + 0$$

$$2 = 2 + 0$$

$$(2, 0)$$

$$\text{mcd}(205, 100)$$

$$205 = 100 \cdot 2 + 5 \quad 10, 3$$

$$100 = 5 \cdot 20 + 0$$

$$\text{mcd}(20, 5)$$

$$3 \cdot 3 + 1$$

$$3, 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0$$

$$(3, 0)$$

$$10 = 3 \cdot 3 + 1$$

$$3 = 3 + 0$$

$$\text{mcd}(3, 0)$$

(2)

$$x = y^2 - 4 \quad x = e^y$$

$$A = \int_{-1}^1 e^y - y^2 + 4 \, dy = \left[e^y - \frac{1}{3}y^3 + 4y \right]_{-1}^1 =$$

$$= \left\{ e^{-\frac{1}{3}} + 4 \right\} - \left\{ e^{-1} + \frac{1}{3} - 4 \right\} =$$

$$= e^{-\frac{1}{3}} + 4 - e^{-1} - \frac{1}{3} + 4$$

$$e^{-\frac{1}{3}} - e^{-1} - \frac{2}{3} + 8 = e^{-\frac{1}{3}} + \frac{22}{3}$$

(3)

$$y_1 = e^x \quad y_2 = x^2 - 1 \quad , \quad x = \pm 1$$

$$A = \int_{-1}^1 e^x - (x^2 - 1) \, dx = \int_{-1}^1 e^x - x^2 + 1 \, dx = \left[e^x - \frac{1}{3}x^3 + x \right]_{-1}^1$$


$$= \left\{ e^{-\frac{1}{3}} + 1 \right\} - \left\{ e^{-1} + \frac{1}{3} - 1 \right\} = e^{-\frac{1}{3}} + 1 - e^{-1} - \frac{1}{3} + 1$$

$$= e^{-\frac{1}{3}} - e^{-1} - \frac{2}{3} + 2 = e^{-\frac{1}{3}} + \frac{4}{3}$$

$$\cdot \frac{2}{3} + \frac{2 \cdot 3}{3} = \frac{-2 + 6}{3} = \frac{4}{3}$$

④ By parts:

$$x = 54 - 6y^2 \quad x = 6y^2 - 54$$



• with respect to $-y$:


$$\begin{aligned} A &= \int_{-3}^3 (54 - 6y^2) - (6y^2 - 54) \, dy \\ &= \int_{-3}^3 54 - 6y^2 - 6y^2 + 54 \, dy \\ &= \int_{-3}^3 108 - 12y^2 \, dy \\ &= 12 \int_{-3}^3 (9 - y^2) \, dy = 12 \left[\left(9y - \frac{1}{3}y^3 \right) \right]_{-3}^3 = \end{aligned}$$

$$= 24 \left[\left(9(3) - \frac{1}{3}(3)^3 \right) - (0) \right] = 24 (27 - 9) = 24 \cdot 18 = \underline{\underline{432}}$$

$$\begin{aligned} 0 &= 54 - 6y^2 \\ 0 &= 6(9 - y^2) \\ 0 &= 9 - y^2 \\ -9 &= -y^2 \\ 9 &= y^2 \\ \pm\sqrt{9} &= y \\ \pm 3 &= y \\ \boxed{x = 54 - 0} \\ x = 54 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 &= 6y^2 - 54 \\ 0 &= 6(y^2 - 9) \\ 0 &= y^2 - 9 \\ +9 &= y^2 \\ \pm\sqrt{9} &= y \\ \pm 3 &= y \\ x = \dots - 54 \end{aligned}$$

$$y_1 = \frac{4}{x} ; y_2 = 16x ; y_3 = \frac{1}{4}x , x > 0$$



$$A_2 = \int_{1/2}^4 \left(\frac{4}{x} - \frac{1}{4}x \right) dx = \int_{1/2}^4 \left(4 \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{4} \cdot x \right) dx =$$

$$= 4 \ln(4) - 4 \ln(1/2) + \frac{1}{4} \cdot 2 =$$

$$= \left[\left(4 \ln(x) - \frac{1}{4} \cdot x^2 \right) \right]_{1/2}^4 =$$


$$= \left[\left(4 \ln(4) - \frac{1}{8} (16) \right) - \left(4 \ln(1/2) - \frac{1}{8} (\frac{1}{2})^2 \right) \right] =$$

$$= \left[4 \ln(4) - 2 - 4 \ln(1/2) + \frac{1}{16} \right] =$$

$$= 4 \ln(4) - 4 \ln(1/2) - 2 + \underbrace{\frac{1}{16}}_{\textcircled{1}} + \frac{31}{16}$$

$$\cancel{4(\ln(4) - \ln(1/2))}$$

(6)



$$A_1 = \int_0^{\pi/4} (\cos(x) - \sin(x)) dx = \left[(\sin x + \cos x) \right]_0^{\pi/4} =$$

$$= \left[\left(\underbrace{\sin(\pi/4)}_{\frac{\sqrt{2}}{2}} + \underbrace{\cos(\pi/4)}_{\frac{\sqrt{2}}{2}} \right) - \left(\underbrace{\sin(0)}_0 + \underbrace{\cos(0)}_1 \right) \right]$$

$$= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} - 1$$

$$A_2 = \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin(x) - \cos(x)) dx = \underbrace{\frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} - 1}_{x} = \sqrt{2} - 1$$

$$= \left[(-\cos x - \sin x) \right]_{\pi/4}^{\pi/2} = \left[\left(-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) - \left(-\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \right]$$

$$= \left[(-0 - 1) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right] = \left[-1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] =$$

$$= -1 + \sqrt{2} + \sqrt{2} - 1 = \boxed{-2 + 2\sqrt{2}}$$


Capítulo 3

Volúmenes

Webassign 6.2-6.3 Volumenes

①

$$y = x + 1 ; \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = 5$$



integral suspeito de x

$$V = \pi \int_0^5 (x+1)^2 dx$$

$$= \pi \int_0^5 x^2 + 2x + 1 dx$$


$$= \pi \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x \right]_0^5 =$$

$$= \pi \left[\left(\frac{5^3}{3} + 5^2 + 5 \right) \right]$$

$$= \pi \frac{215}{3}$$

②

$$y = \sqrt{x-1}, y=0; x=9; \text{ about } x\text{-axis}$$



$$V = \pi \int_{1}^{9} (\sqrt{x-1})^2 dx = \pi \int_{1}^{9} (x-1) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^9 =$$

$$= \pi \left[\left(\frac{1}{2}(9)^2 - 9 \right) - \left(\frac{1}{2}(1)^2 - 1 \right) \right]$$

$$= \pi \left[\left(\frac{80}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} \right) \right] = \pi [32]$$

③

$$x = 2\sqrt{5y}, x = 0; y = 3$$

$$\frac{x}{2} = \sqrt{5y}$$

$$\frac{y^2}{20} = 3$$


$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 = 5y$$

$$x^2 = 60$$

$$\frac{x^2}{4 \cdot 5} = y$$

$$x = \sqrt{60}$$

$$\frac{x^2}{20} = y$$




$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^3 (2\sqrt{5y})^2 dy \\
 &= \pi \int_0^3 4(5y) dy = \pi \int_0^3 20y dy \\
 &= 20\pi \int_0^3 y dy = 20\pi \left[\frac{1}{2}y^2 \right]_0^3 \\
 &= 20\pi \left[\left(\frac{1}{2}(3)^2 \right) - \left(\frac{1}{2}(0)^2 \right) \right] \\
 &= 20\pi \cdot \frac{9}{2} = 10 \cdot 9\pi = \underline{90\pi}
 \end{aligned}$$

④ Step by step =

$$\begin{aligned}
 V &= 36\pi \int_0^1 (x^2 - x^{12}) dx \\
 &= 36\pi \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{13}x^{13} \right]_0^1 \\
 &= 36\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{13} \right) = 36\pi \left(\frac{10}{39} \right) = \frac{360}{39}\pi = \frac{120}{13}\pi
 \end{aligned}$$

⑤ $y = 2 + \sec(x)$, $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$, $y = 4$



⑥

$$h = 5e^{-x^2} \quad r_{\text{int}} = x$$


$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 (x)(5e^{-x^2}) dx = 10\pi \int_0^1 x e^{-x^2} dx \\ u &= -x^2 \\ du &= -2x dx \\ -\frac{du}{2} &= x dx \\ &= 2\pi \int_0^1 5e^u \cdot -\frac{du}{2} = -\frac{2.5\pi}{2} \int_0^1 e^u du \\ &= -5\pi \int_0^1 e^u du = -5\pi [e^u]_0^1 = \\ &= -5\pi \left[(e^{-1^2}) - (e^{-0^2}) \right] \\ &= -5\pi \left[e^{-1} - e^0 \right] \\ &= -5\pi \left[e^{-1} - 1 \right] \\ &= \underline{\underline{-\frac{5\pi}{e}}} + 5\pi \end{aligned}$$

$$-2\pi \int_{-2}^2 12 e^{-x^2} x dx = 2\pi \cdot 12 \cdot -\frac{1}{2} \int_{-2}^2 e^u du$$

$$u = -x^2 \quad -24\pi \cdot \frac{1}{2}$$

$$-\frac{du}{2} = x dx \quad -12\pi e^u + C$$

$$-12\pi \left[e^{-1} - e^0 \right]$$



$$y_1 = 3x^2$$

$$y_2 = 18x - 6x^2$$

$$3x^2 = 18x - 6x^2$$

$$3x^2 = 6(3x - x^2)$$

$$\frac{3x^2}{6} = 3x - x^2$$

$$\frac{1}{2}x^2 - 3x + x^2 = 0$$

$$n = (18x - 6x^2) - (3x^2)$$

$$n = 18x - 9x^2$$

$$3x/\frac{1}{2}x - 3x = 0$$

$$\frac{1}{2}x - 1 = 0$$

$$\boxed{x=0}$$

$$3(0)^2$$

$$\boxed{\frac{1}{2}x=1}$$

$$(18x - 6x^2)$$


$$18 - 12x = 0$$

$$-12x = -18$$

$$x = \frac{18}{12} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$$V = 2\pi \int_0^2 x (18x - 6x^2) dx$$

$r = x$




$$= 2\pi \int_0^2 x (18x - 6x^2) dx$$

$$= 18\pi \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx = 18\pi \left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^2$$

$$= 18\pi \left[\left(\frac{2}{3}(2)^3 - \frac{(2)^4}{4} \right) - (0) \right] = 18\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{72}{3}\pi = 24\pi$$

(b)

$$V = 2\pi \int_a^b r h \, dx$$




$$V = 2\pi \int_0^2 (2-y)(4-4y^2) \, dy$$

$$\begin{aligned} A &= 2\pi r h \\ r &= 4y \\ h &= 4 - 4y^2 \\ V &= 2\pi \int_0^2 (4y - 8y^3 - 8y^2 - 4y + 4y^3) \, dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2\pi \int_0^2 \left(4y - \frac{4}{3}y^3 - \frac{8}{3}y^2 - 4y + 4y^3 \right) \, dy \\ &= 2\pi \int_0^2 \left(\frac{8}{3}y^3 - 8y^2 - 4y \right) \, dy \\ &= 2\pi \left[\frac{8}{12}y^4 - 8y^3 - 4y^2 \right]_0^2 \\ &= 2\pi \left[\frac{2}{3}y^4 - 8y^3 - 4y^2 \right]_0^2 \\ &= 2\pi \left[\frac{2}{3}(16) - 8(8) - 4(4) \right] \\ &= 2\pi \left[\frac{32}{3} - 64 - 16 \right] \\ &= 2\pi \left[\frac{32}{3} - 80 \right] \\ &= 2\pi \left[\frac{32}{3} - \frac{240}{3} \right] \\ &= 2\pi \left[-\frac{208}{3} \right] \\ &= -\frac{416\pi}{3} \end{aligned}$$

(a)

$$x = 4y^2, \quad y \geq 0, \quad x = 4; \quad \text{about } y = 2$$
$$h = \sqrt{1/4x}$$
$$V = 2\pi \int_0^4 r h dy$$



$$4y^2 = 4$$
$$y^2 = 1$$
$$4(y^2 - 1) = 0$$

$$y = \pm \sqrt{1}$$

$$y = \pm 1$$

$$y = \pm 1$$

Capítulo 4

Longitud de arco

Webassign Longitud de arco

①

$$y = 5x - 1 ; \quad -1 \leq x \leq 3 ;$$

$$y' = 5 = (y')^2 = 25$$

$$\begin{aligned} L &= \int_{-1}^3 \sqrt{1 + 25} dx = \int_{-1}^3 \sqrt{26} dx = \left[\sqrt{26}x \right]_{-1}^3 = \\ &= \sqrt{26} \left[(3) - (-1) \right] = \sqrt{26} [4] = 4\sqrt{26} \end{aligned}$$

②

$$y = \sqrt{2-x^2} ; \quad 0 \leq x \leq 1 ;$$

$$y'(x) = \frac{1}{2} (2-x^2)^{-1/2} \cdot -2x = -\frac{2x}{\sqrt{2-x^2}}$$

$$(y'(x))^2 = \left(-\frac{2x}{\sqrt{2-x^2}} \right)^2 = \frac{(-2x)^2}{(\sqrt{2-x^2})^2} = \frac{4x^2}{2-x^2} = 4 \left(\frac{x^2}{2-x^2} \right)$$

$$L = 4 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2-x^2}} dx = 4 \left[\int_0^1 \frac{1}{2-x^2} dx - \int_0^1 1 dx \right] =$$

$$\frac{x^2}{2-x^2} = \frac{x^2}{2-x^2} + \frac{2-x^2}{2-x^2} - 1$$

$$\frac{x^2 + 2 - x^2}{2-x^2} - 1 = \frac{2}{2-x^2} - 1$$

$$= 4 \left[\int_0^1 \frac{2}{2-x^2} dx - \int_0^1 1 dx \right]$$

$$③ y = \ln(\sec x) ; \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$$

$$y' = \frac{\sec x \tan x}{\sec x} = (\tan x)^2 = \tan^2 x$$

$$L = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \int_0^{\pi/4} \sqrt{\sec^2 x} dx =$$

$$= \int_0^{\pi/4} \sec x dx = \left[-\ln |\sec x + \tan x| \right]_0^{\pi/4} =$$

$$= \ln \left| \sec \left(\frac{\pi}{4} \right) + \tan \left(\frac{\pi}{4} \right) \right| - \ln \left| \sec(0) + \tan(0) \right|$$

$$\boxed{\sec \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\cos \left(\frac{\pi}{4} \right)} = \frac{2}{\sqrt{2}}}$$

$$\boxed{\frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4}} = 1}$$

$$= \ln \left| \frac{2}{\sqrt{2}} + 1 \right| - \ln |1| = \ln \left| \frac{2}{\sqrt{2}} + 1 \right|$$

$$\textcircled{2} \quad y = \sqrt{2 - x^2} ; \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$y'(x) = \frac{1}{2}(2-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot -2x = \frac{-x}{\sqrt{2-x^2}} = \left(\frac{-x}{\sqrt{2-x^2}}\right)^2 = \frac{x^2}{2-x^2}$$

$$(y'(x))^2 = \frac{x^2}{2-x^2}$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{x^2}{2-x^2}} dx =$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{1}{(2-x^2)} + \frac{x^2}{(2-x^2)}} \\ &= \sqrt{\frac{2}{2-x^2}} = \sqrt{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2-x^2}} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \Big|_0^1 \end{aligned}$$

$$\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) - \arcsin(0)$$

(4)

$$y = 8 + \frac{1}{2} \cosh(2x); \quad 0 \leq x \leq 2$$

$$y'(x) = 0 + \frac{1}{2} \sinh(2x) \cdot 2 = (\sinh(2x))^2 = \underbrace{\sinh^2(2x)}_{(y'(x))^2}$$

$$J = \int_0^2 \sqrt{\sinh^2(2x) + 1} dx \quad \begin{aligned} \sinh^2(x) - \cosh^2(x) &= 1 \\ \sinh^2(x) + 1 &= \cosh^2(x) \end{aligned}$$

$$w = 2x$$

$$dw = 2dx \Rightarrow \frac{1}{2} du$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{\sinh^2(w) + 1} dw = \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{\cosh^2(w)} du = \frac{1}{2} \int_0^2 \cosh(u) du$$

$$= \left[\frac{1}{2} \sinh(w) \right]_0^2 = \left[\frac{1}{2} \sinh(2x) \right]_0^2$$

$$= \frac{1}{2} \left[(\sinh(2 \cdot 2)) - (\sinh(2 \cdot 0)) \right] = \frac{1}{2} (\sinh(4))$$

⑤

$$y = \ln(1 - x^2) \quad ; \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{8}$$

$$y'(x) = \frac{2x}{1-x^2} = \left(\frac{2x}{1-x^2}\right)^2 = \frac{4x^2}{(1-x^2)^2}$$

$$L = \int_0^{\frac{1}{8}} \sqrt{\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{4x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{(1-x^2)^2}{(1-x^2)^2}}$$

$$\sqrt{\frac{4x^2 + 1 - 2x^2 + x^4}{(1-x^2)^2}} = \sqrt{\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{x^4 + 2x^2}} =$$

$$= \frac{\sqrt{(x^2+1)^2}}{\sqrt{(1-x^2)^2}} = \frac{x^2+1}{1-x^2} = \frac{x^2+1}{1-x^2} + \frac{1-x^2}{1-x^2} - 1$$

$$= \frac{x^2+1+1-x^2}{1-x^2} - 1 = \frac{2}{1-x^2} - 1 = \frac{2}{-(x+1)(x-1)} - 1$$

$$L = \int_0^{\frac{1}{8}} -\frac{2}{(x+1)(x-1)} - 1$$

Parte II

Laboratorios

Capítulo 5

Laboratorio #1

Laboratorio # 1

29/07/2019

20190432

David Corzo

a) $\int (\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 2)(x + 4) dx$

$$\int (x - 4)(x + 4) dx$$

$$\int (x^2 - 16) dx$$

$$\int x^2 dx - \int 16 dx$$

$$\frac{x^{2+1}}{2+1} - 16x = \frac{x^3}{3} - 16x + C$$

6pts

b) $\int \frac{3x^{3/2} + x + 3\sqrt{x}}{x^2} dx$

$$\int \frac{3x^{3/2}}{x^2} + \frac{x}{x^2} + \frac{3\sqrt{x}}{x^2} dx$$

$$\frac{3}{2} - \frac{4}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\int \left[3x^{-1/2} + \frac{1}{x} + 3x^{-3/2} \right] dx$$

$$\left\{ 3 \int x^{-1/2} dx \right\} + \left\{ \int x^{-1} dx \right\} + \left\{ 3 \int x^{-3/2} dx \right\}$$

$$\frac{3 \cdot x^{1/2}}{1/2} + \frac{x^0}{2} + \frac{3 \cdot x^{-1/2}}{-1/2} = 6\sqrt{x} + \ln(x) - 6x^{-1/2} + C$$

6pts

$$\begin{aligned}
 c) & \int (e^{\pi} \sin(x) + \tan(s) \sinh(x) - s \cdot \pi^x) dx \\
 &= \left\{ e^{\pi} \int \sin(x) dx \right\} + \left\{ \tan(s) \int \sinh(x) dx \right\} - \left\{ s \int \pi^x dx \right\} \\
 &\quad \text{cos } x = -\sin x \\
 &\quad \sin x = \cos x \\
 &= -e^{\pi} (\cos(x)) + \tan(s) \cosh(x) - s \cdot \frac{\pi^x}{\ln(\pi)} + C
 \end{aligned}$$


6pts

$$\begin{aligned}
 d) & \int_{1/2}^1 \frac{4u + u^2}{u^4} du \\
 &= \int_{1/2}^1 \frac{4u}{u^4} + \frac{u^2}{u^4} du \\
 &= \int_{1/2}^1 \frac{4u}{u^4} du + \int_{1/2}^1 \frac{u^2}{u^4} du \quad \frac{1}{u^2} = \frac{u^{-2+1}}{-2} = \frac{u^{-1}}{-1} \Big|_{1/2}^1 = -\frac{1}{u} \Big|_{1/2}^1 = \left[-\frac{1}{(1)^2} - \left(-\frac{1}{(1/2)^2} \right) \right] \\
 &= 4 \cdot u^{-3} \Big|_{1/2}^1 + u^{-2} \Big|_{1/2}^1 \quad \text{6} \\
 &= \frac{4}{-2} \Big|_{1/2}^1 \left\{ \left(\frac{4}{(1)^2} \cdot -2 \right) - \left(\frac{4}{(1/4)^2} \cdot -2 \right) \right\} + \left\{ \left(\frac{4}{-2} \right) - \left(\frac{4}{1} \right) \right\} \\
 &\quad \text{7} \\
 &= (-2) - \left(\frac{4}{-2} \right) = -2 - \left(\frac{8}{-2} \right) = -2 + \frac{8}{2}
 \end{aligned}$$

6pts

$$2.) \int_{-1}^0 \sqrt{1-x^2} dx + \int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx + \int_4^8 (16-2x) dx$$

② Realizar la gráfica indicando intersecciones




$$\begin{aligned} y = 0 &: x = 0 \\ \sqrt{1-x^2} &= y \\ \sqrt{1-0^2} &= y \\ \pm 1 &= y \\ \sqrt{1-x^2} &= 0 \\ 1-x^2 &= 0 \\ -x^2 &= -1 \\ x &= \sqrt{1} \\ x &= \pm 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y = 0 &: x = 0 \\ \sqrt{16-x^2} &= y \\ \sqrt{16-0^2} &= y \\ \pm 4 &= y \\ \sqrt{16-x^2} &= 0 \\ 16-x^2 &= 0 \\ x^2 &= 16 \\ x &= \sqrt{16} \\ x &= \pm 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x = 0 &; y = 0 \\ 16-2x &= y \\ 16 &= y \\ 16-2x &= 0 \\ -2x &= -16 \\ x &= -16 \\ &\quad \cancel{-2} \\ x &= 8 \end{aligned}$$

b)



$$\text{Círculo} = \pi r^2$$
$$AC = \pi(-1)^2$$

$$A.C. = \pi$$
$$AC_1 = \frac{1}{4}\pi$$

$$\text{Círculo} = \pi r^2$$
$$AC_2 = \frac{1}{4}\pi(4)^2$$

$$AC_2 = \frac{16}{4}\pi$$
$$AC_2 = 4\pi$$

triángulo

$$T = \frac{1}{2}bh$$

$$T = \frac{1}{2}(2)(4)$$

$$T = \frac{8}{2}$$


$$T = 4$$

$$\frac{1}{4}\pi + 4\pi + 4$$

10pts

e) $\int_0^{\pi/4} \frac{\sec \theta \cot \theta}{\sin \theta} d\theta$

$$\theta = x$$



$$\frac{\frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta}}{\sin \theta} = \left[\frac{\frac{1}{\sin \theta}}{\sin \theta} \right] = \frac{1}{\sin^2 \theta} = \csc^2 \theta$$

$$\int_0^{\pi/4} \csc^2 \theta d\theta = -\cot \theta \Big|_0^{\pi/4}$$

$$[-\cot(\pi/4)] - [-\cot(0)] = \text{indefinida}$$

8pts

f) $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \sec t (\sec t + \tan t) dt$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sec^2 t)^{1/2} (\sec t \cdot \tan t) dt$$

$$(\tan(t)) + (\sec t) \Big|_{\pi/4}^{\pi/2}$$


$$\underbrace{\left[\frac{\sin(\pi/2)}{\cos(\pi/2)} + \frac{1}{\cos(\pi/2)} \right]}_{\text{indefinida}}$$

$$- \left[\frac{\sin(\pi/4)}{\cos(\pi/4)} + \frac{1}{\cos(\pi/4)} \right] = \text{indefinida}$$

8pts

$$\textcircled{3} \quad f(x) = 4 - |x-3| ; \quad x = 1 \quad \& \quad x = 7$$

$$|x-3| = \begin{cases} x-3 & x \leq 3 \\ -(x-3) & x \geq 3 \end{cases}$$



$$f(x) = 4 - (-x + 3)$$

$$f(x) = \int (x+1) dx = \int x dx + \int 1 dx$$

$$\left[\frac{x^2}{2} + x \right]_1^3 = \left[\frac{3^2}{2} + 3 \right] - \left[\frac{1^2}{2} + 1 \right]$$

$$\int (x+1) dx = 6$$

$$f(x) = 4 - (x-3)$$

$$f(x) = \int (-x+7) dx = \int -x dx + \int 7 dx$$

$$\left[-\frac{x^2}{2} + 7x \right]_3^7 = -\frac{7^2}{2} + 7(7) - \left[-\frac{3^2}{2} + 3(3) \right]$$

15pts

$$\frac{9}{2} + 3 - \frac{1}{2} - 1$$

$$\frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4 + 2 = 6$$

Capítulo 6

Laboratorio #2

Laboratorio # 2 David Gabriel Corzo Mcmath
 20190432 - 2019/08/05

① a) $f(x) = \int_1^x \frac{1}{t^3+1} dt = \frac{1}{\cancel{t^3+1}} \cdot 1$ 110 pts *

b) $h(r) = \int_{-100}^r \sqrt{x^2+4} dx = \frac{\sqrt{x^2+4} \cdot 1}{\cancel{x}} \cancel{5}$

c) $i(x) = \int_0^x \cos^2(\theta) d\theta = \cos^2(x^4) \cdot 4x^3 \cancel{5}$

d) $j(x) = \int_{\sec x}^{\tan x} \sqrt{t + \sqrt{t}} dt =$
 $\sqrt{(\tan x) + \sqrt{(\tan x)^2}} \cdot \sec^2 x - \sqrt{\sec x + \sqrt{\sec x^2}} \cdot \sec x \tan x \cancel{10}$

e) $k(x) = \int_{x^3-x}^{x^4+x} \frac{u^3}{1+u^2} dt =$
 $\left\{ \frac{(x^4+x)^3}{1+(x^4+x)^2} \cdot (4x^3+1) \right\} - \left\{ \frac{(x^3-x)^3}{1+(x^3-x)^2} \cdot (3x^2-1) \right\} \cancel{10}$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \int_0^x \sin\left(\frac{\pi}{2} t^2\right) dt ; \quad \text{recta tangente en } x = 1$$

ecuación

$$f'(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} x^2\right) \cdot 1$$

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1)$$

$$y = 0.4382591 + 1(x - 1)$$

$$y = x - 1 + 0.4382591$$

$$y = x - 0.5617409$$

$$\textcircled{3} \quad C'(x) = 3000 + 2x + \frac{3}{70}x^2$$

$$\int_{10}^{20} C'(x) dx = \int_{10}^{20} 3000 + 2x + \frac{3}{70}x^2 dx$$

$$\int_{10}^{20} C'(x) dx = \int_{10}^{20} 3000 dx + \int_{10}^{20} 2x dx + \int_{10}^{20} \frac{3}{70}x^2 dx$$

$$C(x) = 3000x + \frac{2x^2}{2} + \frac{3}{10} \cdot \frac{x^3}{3}$$

$$C(x) = 3000x + x^2 + \frac{x^3}{10} + C$$

$$\left\{ 3000(20) + (20)^2 + \frac{(20)^3}{10} \right\} - \left\{ 3000(10) + (10)^2 + \frac{(10)^3}{10} \right\}$$

$$61200 - 30200 = 31000 \text{ de aumento}$$

~~x~~ cuando se incrementa
de 10 a 20 yardas

$$(4) P^3(t) = 40 \sqrt[3]{t}$$

$$\begin{aligned} \int_0^8 P^3(t) dt &= \int_0^8 40 \sqrt[3]{t} dt \\ &= 40 \int_0^8 \frac{(t)^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} dt \\ &= 40 \cdot \frac{t^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} \\ &= \frac{40 \cdot 3 (t^{\frac{4}{3}})}{4} \\ &= \frac{40 \cdot 10 \cdot 3 (t^{\frac{4}{3}})}{4} \\ &= 30 (t^{\frac{4}{3}}) \Big|_0^8 = \left\{ 30 (8^{\frac{4}{3}}) \right\} - \left\{ 30 (0^{\frac{4}{3}}) \right\} \end{aligned}$$

15

$$= 480 \text{ megalitres de reervoir}$$

$$(5) v(t) = 3t - 6, \quad 0 \leq t \leq 3$$

$$\begin{aligned} a) I_x; y=0 &\quad I_y; x=0 \\ 3t - 6 = 0 &\quad 2(0) - 6 = y \\ 3t = 6 &\quad -6 = y \\ t = \frac{6}{3} = 2 & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 3t - 6 dt &= 3 \int_0^3 t dt - \int_0^3 6 dt = \\ &= \left. \frac{3t^2}{2} - 6t \right|_0^3 = \left\{ \frac{3}{2}(3)^2 - 6(3) \right\} - \left\{ \frac{3}{2}(0) - 6(0) \right\} \\ &= -\frac{9}{2} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

b) $\int 3t - 6 \ dt$

$$d = \frac{3t^2}{2} - 6t$$


$$d = \left[-\frac{3t^2}{2} + 6t \right]_0^2 + \left[\frac{3t^2}{2} - 6t \right]_2^3$$

$$\left\{ \left[-\frac{3(2)^2}{2} + 6(2) \right] - [0] \right\} + \left\{ \left[\frac{3(3)^2}{2} - 6(3) \right] - \left[\frac{3(2)^2}{2} - 6(2) \right] \right\}$$

$$\left\{ -\frac{12}{2} + 12 \right\} + \left\{ \frac{27}{2} - 18 - \frac{12}{2} + 12 \right\}$$

$$6 + \frac{3}{2} = \frac{15}{2} \text{ m}$$

6)



$$\textcircled{6} \quad a) \quad f(x) = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \left(\frac{3}{5} (x^3 + x)^5 - 2x^4 \sin x \right) dx$$

\cancel{S}

$$= 0 \quad \text{pasmittet der Winkel.}$$

$$b) \quad g(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\frac{1}{\pi} \left[\tan^{-1}(x) \right]_0^{\sqrt{3}} = \left\{ \frac{1}{\pi} \tan^{-1}(\sqrt{3}) \right\} - \left\{ 0 \right\} * 2$$

$$\frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{3} * \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

\cancel{S}

Capítulo 7

Laboratorio #3

Laboratorio #3

NOMBRE ¿? 2019-08/15

David Corzo

110

$$\textcircled{1} \quad \int \operatorname{sech}^2(\log_2 x) \frac{1}{x} dx = \text{La derivada está presente.}$$

Inclinación por sustitución

$$\log_2 x = \frac{\log x}{\log(2)}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(\frac{\log x}{\log(2)}\right) \frac{1}{x} dx = \int \operatorname{sech}^2(u) \frac{du}{\log(2)}$$

$$u = \frac{\log x}{\log(2)} \quad = \frac{1}{\log(2)} \int \operatorname{sech}^2(u) du$$

$$du = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\log(2)} \quad = \frac{1}{\log(2)} \tanh(u) + C$$

$$= \frac{1}{\log(2)} \cdot \tanh\left(\frac{\log x}{\log(2)}\right) + C$$

$$\textcircled{2} \quad 72 \int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^4} dx = 72 \int_1^2 \ln(x) \cdot \frac{1}{x^4} dx$$

$$= -\ln(x) \cdot \frac{1}{3x^3} - \underbrace{\int -\frac{1}{3x^3} \frac{1}{x} dx}_{\text{Integrando}}$$

$$72 \left(-\frac{\ln(x)}{3x^3} - \frac{1}{9x^3} \right) \Big|_1^2$$

$$u = \ln(x) \quad dv = x^{-4} dx$$

$$du = \frac{1}{x} \quad v = \frac{x^{-3}}{-3}$$

$$-\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} -\frac{1}{3} \cdot x^{-3} \cdot x^{-1} dx$$

$$\left\{ \frac{72 \ln(2)}{3(2)^3} - \frac{72}{9(2)^3} \right\} - \left\{ \frac{72 \ln(1)}{3(1)^3} - \frac{72}{9(1)^3} \right\} + \frac{1}{3} \cdot \frac{x^{-3}}{-3}$$

$$-\frac{24 \ln(2)}{8} - \frac{72}{72} - \left(-\frac{24(0)}{3(1)} - 8 \right)$$

$$-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot x^{-3}$$

$$-3 \ln(2) - 1 + 0 + 8.$$

$$-\frac{1}{9x^3}$$

$$\underline{-3 \ln(2) + 7}$$

$$\textcircled{3} \quad \int \sec^2 \theta \tan^3 \theta \, d\theta = \tan^3 \theta = 3 \tan^2 \theta \cdot \sec^2 \theta$$

$$\begin{aligned} u &= \tan \theta & \int u^3 \, du &= \frac{u^4}{4} + C \\ du &= \sec^2 \theta \, d\theta & &= \frac{\tan^4(\theta)}{4} + C \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \quad \int (x-1) \sin(\pi x) \, dx =$$

$$\begin{aligned} u &= x-1 & dv &= \sin(\pi x) \, dx \\ du &= 1 \, dx & v &= -\frac{\cos(\pi x)}{\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\frac{(x-1) \cos(\pi x)}{\pi} &- \underbrace{\int \frac{-\cos(\pi x)}{\pi} \, dx}_{\text{substitution}} \\ -\frac{1}{\pi} \int \cos(\pi x) \, dx &= \left(-\frac{1}{\pi} \cdot 1\right) \int \cos(u) \, du \end{aligned}$$

$$u = \pi x \quad \frac{du}{dx} = \pi \quad \frac{1}{\pi} \frac{du}{dx} = \frac{1}{\pi} \sin(u) = \frac{1}{\pi^2} \sin(\pi x)$$

$$\frac{du}{\pi} = dx$$

$$-\frac{(x-1) \cos(\pi x)}{\pi} + \frac{\sin(\pi x)}{\pi^2} + C$$

(5)

$$\int e^{-\theta} \cos(2\theta) d\theta = \cos(2\theta) = 1 - \sin^2 u$$

$$u = \cos(2\theta) \quad dv = e^{-\theta} d\theta$$

$$du = -2\sin(2\theta) d\theta \quad v = -e^{-\theta}$$

$$: \underbrace{u v}_{-\cos(2\theta) e^{-\theta}} - \underbrace{\int v du}_{-\int -e^{-\theta} \cdot -2\sin(2\theta)}$$

$$- \frac{\cos(2\theta)}{e^\theta} - \int 2e^{-\theta} \sin(2\theta) d\theta$$

$$= 2 \int e^{-\theta} \sin(2\theta) d\theta$$

$$u = \sin(2\theta) \quad dv = e^{-\theta} d\theta$$

$$du = 2\cos(2\theta) d\theta \quad v = -e^{-\theta}$$

$$\underbrace{\sin(2\theta) \cdot -e^{-\theta}}_u - \int \underbrace{-e^{-\theta} \cdot 2\cos(2\theta)}_v d\theta$$

$$2 \left\{ -\frac{\sin(2\theta)}{e^\theta} - \int -2e^{-\theta} \cos(2\theta) d\theta \right\}$$

$$- \frac{2\sin(2\theta)}{e^\theta} - 2 \cdot -2 \int e^{-\theta} \cos(2\theta) d\theta$$

$$- \frac{2\sin(2\theta)}{e^\theta} + 4 \int e^{-\theta} \cos(2\theta) d\theta$$

$$w = \int e^{-\theta} \cos(2\theta) d\theta$$

variable cíclica

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{\cos(2\theta)}{e^\theta} - \left(\frac{-2\sin(2\theta)}{e^\theta} + \frac{4}{e^\theta} \right) \\
 &= -\frac{\cos(2\theta)}{e^\theta} - \frac{-2\sin(2\theta)}{e^\theta} + \frac{4}{e^\theta} \\
 &= \frac{-\cos(2\theta) + 2\sin(2\theta)}{e^\theta} + \frac{4}{e^\theta} \\
 &= -\cos(2\theta) \cdot e^{-\theta} + 2\sin(2\theta) \cdot e^{-\theta} + \frac{4}{e^\theta} \\
 &\quad \text{---} \\
 &= -\cos(2\theta) \cdot e^{-\theta} + 2\sin(2\theta) \cdot e^{-\theta} + \frac{4}{e^\theta} \\
 &\quad \text{---} \\
 &= 4w = -\cos(2\theta) \cdot e^{-\theta} + 2\sin(2\theta) \cdot e^{-\theta} + \frac{4}{e^\theta} \\
 &\quad \text{---} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

$$⑥ \int e^{\tan(x + \tan^{-1}x)} \cdot \sec^2(x + \tan^{-1}(x)) \left(1 + \frac{1}{1+x^2}\right) dx =$$

sustitución

$$w = \tan(x + \tan^{-1}(x))$$

$$dw = \sec^2(x + \tan^{-1}(x)) \cdot \left(1 + \frac{1}{1+x^2}\right)$$

$$= \int e^w dw$$

$$= e^w + C$$

$$= e^{\tan(x + \tan^{-1}(x))} + C$$

$$\textcircled{3} \quad \int s^t \sin(s^t) dx = \frac{1}{\ln(s)} \int \sin(u) du = \frac{1}{\ln(s)} \left[-\cos(u) \right] = -\frac{\cos(s^t)}{\ln(s)} + C$$

$$w = s^t$$

$$du = s^t \cdot \ln(s) dt$$

$$\frac{du}{\ln(s)} = s^t dt$$

\textcircled{4}

$$\int_0^2 x \sin \pi x dx = -\frac{x \cos(\pi x)}{\pi} - \int -\frac{\cos(\pi x)}{\pi} dx = -\frac{x \cos(\pi x)}{\pi} - \frac{1}{\pi} \left[\int -\cos(\pi x) dx \right]$$

$$w = x$$

$$dw = \sin(\pi x) dx$$

$$du = 1 dx$$

$$v = -\frac{\cos(\pi x)}{\pi}$$

$$\frac{du}{\pi}$$

\equiv

$$\frac{-x \cos(\pi x)}{\pi} - \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\sin(\pi x)}{\pi} \right) + C$$

$$\equiv -\sin(w)$$

$$\frac{-x \cos(\pi x)}{\pi} + \frac{\sin(\pi x)}{\pi^2} + C$$

$$\left\{ -\frac{2 \cos(\pi x)}{\pi} + \frac{\sin(\pi x)}{\pi^2} \right\} - \left\{ -\frac{2 \cos(\pi 0)}{\pi} + \frac{\sin(\pi 0)}{\pi^2} \right\}$$

$$\left\{ -\frac{2(1)}{\pi} \right\} = -\frac{2}{\pi}$$

7

$$\int_{-13}^{+13} \frac{4x}{\sqrt[3]{(1+2x^2)^2}} dx$$

Sustitución

$$u = 1 + 2x^2$$

$$du = 4x dx$$

$$du = 4x dx$$

$$\int_{-13}^{13} \frac{du}{\sqrt[3]{(u)^2}} = \int_{-\frac{2}{3} + \frac{3}{2}}^{-\frac{2}{3} + \frac{3}{2}} u^{-\frac{2}{3}} du$$

$$u^{-\frac{2}{3}} + \frac{3}{2} = \frac{-2+3}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{4(-x)}{\sqrt[3]{1+2(-x)^2}} \\ &= -\frac{4x}{\sqrt[3]{1+2x^2}} \\ &= \left[3w^{\frac{1}{3}} = 3(1+2x^2)^{\frac{1}{3}} + C \right]_{-13}^{13} \\ &\quad \text{impar} \\ &= 3\sqrt[3]{1+2(13)^2} - 3\sqrt[3]{1+2(-13)^2} \end{aligned}$$

$$\frac{w^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}} = \left[\frac{-w}{\frac{1}{3}} \right] = \frac{3w^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}} = 3w^{\frac{1}{3}}$$

$$= 3\sqrt[3]{1+2(13)^2} - 3\sqrt[3]{1+2(-13)^2}$$

$$= 3\sqrt[3]{339} - 3\sqrt[3]{339}$$

$$= \cancel{0}$$

$$\textcircled{10} \quad \int \frac{e^y / (y+1)}{(y+1)^2} dy = \int \frac{\frac{y}{(y+1)}}{\frac{e^{(y+1)}}{(y+1)^2}} dy$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y}{y+1} \right) = \frac{1 \cdot (y+1) - y \cdot 1}{(y+1)^2} = \frac{y+1 - y}{(y+1)^2} = \frac{1}{(y+1)^2}$$

$$\frac{f'g - fg'}{(g')^2}$$

$$w = \frac{y}{y+1}$$

$$dw = \frac{1}{(y+1)^2} dy$$

$$\int e^w dw = e^w$$

$$= \frac{y}{(y+1)} + C$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Q1} \quad \int \frac{x e^{2x}}{(1+2x)^2} dx = \int x e^{2x} (1+2x)^{-2} \\
 & w = 1+2x \quad u^{-2} du = \int u^{-2} \frac{du}{2} \\
 & dw = 2 dx \quad \frac{du}{2} = dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 w &= x e^{2x} \quad du = (1+2x)^{-2} \\
 dw &= e^{2x} + x e^{2x} \cdot 2 dx \quad v = -\frac{1}{2+4x}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \left[\underbrace{x e^{2x}}_w \cdot \underbrace{\frac{1}{2+4x}}_v - \int -\frac{1}{2+4x} \cdot e^{2x} + x e^{2x} \cdot 2 dx \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-2(1+2x)} \\
 & = \frac{1}{-2-4x}
 \end{aligned}$$

$$-\frac{e^{2x}}{4}$$


$$\begin{aligned}
 & \left[\frac{e^{2x} + x e^{2x} \cdot 2}{2+4x} dx - \frac{x e^{2x}}{2+4x} + \frac{e^{2x}}{4} + C \right] \\
 & \frac{e^{2x}(1+2x)}{2(1+2x)} dx \\
 & \frac{e^{2x}}{2} dx \longrightarrow \frac{e^{2x}}{4}
 \end{aligned}$$

Capítulo 8

Laboratorio #4

Laboratorio # 4

$$\textcircled{1} \quad \int \frac{\sin^3(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = \int \sin^3[(x)^{1/2}] \cdot (x)^{-1/2} dx$$



$$u = \sqrt{x} = (x)^{1/2}$$

$$du = \frac{1}{2}(x)^{-1/2} dx$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$2du = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$\int \sin^3(u) \cdot 2 du$$

$$= 2 \int \sin^3(u) du$$

$$= 2 \int \sin^2(u) \cdot \sin(u) du$$

$$= 2 \cdot \int [1 - \cos^2(u)] \cdot \sin(u) du$$

$$uv = \cos(u)$$

$$du = -\sin(u) \quad -du = \sin(u)$$

$$= 2 \int [1 - u^2] \cdot -du$$

$$= 2 \cdot -1 \int [1 - u^2] \cdot du$$

$$= -2 \left\{ \int 1 du - \int u^2 du \right\}$$


$$= -2 \left\{ u - \frac{u^3}{3} \right\}$$

$$= -2uv + \frac{2u^3}{3} \quad \text{sustituir } uv \text{ por correspondiente}$$

$$= -2 \cos(u) + \frac{2 \cos^3(u)}{3}$$

$$= -2 \cos(\sqrt{x}) + \frac{2 \cos^3(\sqrt{x})}{3} + C$$

$$\textcircled{2} \quad \int \cos^4(\theta) \tan^2(\theta) d\theta = \int (\cos^2 \theta)^2 \tan^2 \theta d\theta$$



$$\sin^2 + \cos^2 = 1$$

$$1 + \cot^2 = \csc^2$$

$$\tan^2 + 1 = \sec^2$$

$$\rightarrow \tan^2 = \sec^2 - 1$$

$$\text{or} \quad \rightarrow \cos^2 = 1 - \sin^2$$

$$= \int \cos^2 \theta \cdot \sin^2 \theta d\theta = \int \cos^2 \theta \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta$$

$$= \int \left[\frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right] \left[\frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \right] d\theta$$

$$= \int \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \quad \text{simplifying } (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

$$= \int \left(\frac{1}{2} \right)^2 - \left(\frac{\cos(2\theta)}{2} \right)^2 d\theta = \int \frac{1}{4} d\theta - \int \frac{\cos^2(2\theta)}{4} d\theta$$

$$= \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \underbrace{\int \cos^2(2\theta) d\theta}_{\begin{array}{l} \alpha = 2\theta \\ d\alpha = d\theta \\ \frac{d\alpha}{2} \end{array}} = \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \int \cos^2(\alpha) d\alpha$$

$$= \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \left\{ \int \frac{1}{2} + \frac{\cos^2(2\alpha)}{2} d\alpha \right\}$$

$$= \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2} \int \cos^2(2\alpha) d\alpha \right]$$

$$= \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2} \int \cos(4\alpha) d\alpha \right) \right]$$

$$= \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{4}\alpha + \frac{1}{8} \int \cos(4\alpha) d\alpha \right]$$

$$= \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \left[\frac{3}{4}\alpha + \frac{1}{8} \int \cos(4\alpha) d\alpha \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \left\{ \int \frac{1}{2} d\alpha + \frac{1}{2} \int \cos^2(2\alpha) d\alpha \right. \\
 &= \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \cdot \int \frac{1}{2} d\alpha + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \int \cos(4\theta) d\alpha \\
 &= \frac{\theta}{4} - \frac{\theta}{8} + \frac{1}{8} \sin(4\theta) \cdot \frac{1}{4} + C \\
 &= \frac{2\theta - \theta}{8} + \frac{1}{32} \sin(4\theta) + C \\
 &= \frac{\theta}{8} + \frac{\sin(4\theta)}{32} + C \\
 &= \frac{1}{8} \left(\theta - \frac{\sin(4\theta)}{4} \right) + C
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad \int \cos^3(\sin \theta) \sin^4(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta$$

$\left. \begin{array}{l} u = \sin \theta \\ du = \cos \theta \, d\theta \end{array} \right\} \therefore \int \cos^3(u) \sin^4(u) \, du$

$$= \int \cos^3(u) \sin^4(u) \, du$$

$$= \int (1 - \sin^2(u)) \sin^4(u) \cos(u) \, du$$

$$= \int \sin^4(u) \cos(u) - \sin^6(u) \cos(u) \, du$$

$$= \int \sin^4(u) \cos(u) \, du - \int \sin^6(u) \cos(u) \, du$$

$$u = \sin(u)$$

$$du = \cos(u) \, du$$

$$\underbrace{\int u^4 \, du}$$

$$u = \sin(u)$$


$$du = \cos(u) \, du$$

$$\underbrace{\int u^6 \, du}$$

$$= \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + C$$

$$= \frac{\sin^5(u)}{5} - \frac{\sin^7(u)}{7} + C$$

$$= \frac{\sin^5(\sin \theta)}{5} - \frac{\sin^7(\sin \theta)}{7} + C$$



$$\sin^2 + \cos^2 = 1$$

$$\cos^2 = 1 - \sin^2$$

(1)

(4)

$$\int \tan^5(x) \sec^4(x) dx =$$

$$= \int \tan^5(x) \sec^2(x) \sec^2(x) dx$$

$$= \int \tan^5(x) (\tan^2 x + 1) \sec^2(x) dx$$

$$u = \tan x$$


$$du = \sec^2 x dx$$

$$= \int u^5 (u^2 + 1) du = \int u^7 + u^5 du$$

$$= \int u^7 du + \int u^5 du$$

$$= \frac{u^8}{8} + \frac{u^6}{6} + C$$

$$= \frac{\tan^8(x)}{8} + \cancel{\frac{\tan^6(x)}{6}} + C$$



$$\tan^2 + 1 = \sec^2$$

$$⑤ \int \sec^4(x) dx =$$

$$= \int \sec^2(x) [\tan^2 + 1] dx$$

$$= \int \sec^2(x) \tan^2(x) + \sec^2(x) dx$$

$$= \int \sec^2(x) \tan^2(x) dx + \int \sec^2(x) dx$$


$$u = \tan(x) + \tan(x)$$

$$du = \sec^2(x)$$

$$= \int u^2 du + \tan(x)$$

$$= \frac{u^3}{3} + \tan(x) + C.$$

$$= \frac{\tan^3(x)}{3} + \tan(x) + C$$



$$\tan^2 + 1 = \sec^2$$

Capítulo 9

Laboratorio #5

Laboratorio # 5

David Corzo
20190432


2019-08-21

$$\textcircled{3} \quad \int \frac{72}{(36+x^6)^{3/2}} \cdot 3x^2 dx = \int \frac{72 \cdot 3x^2}{\sqrt[2]{(36+x^6)^3}} \quad \textcircled{100}$$

$$= 72 \int \frac{3x^2}{\sqrt{(36+x^6)^3}} dx = 72 \int \frac{du}{\sqrt{(36+u^3)^3}} = C = \frac{A}{u}$$

$$u = x^3 \\ du = 3x^2 dx$$

$$\sin(\theta) = \frac{u}{\sqrt{36+u^2}}$$



$$\tan \theta = \frac{u}{6}$$

$$6 \tan \theta = u$$

$$6 \sec^2 \theta d\theta = du$$

$$= 72 \int \frac{6 \sec^2 \theta d\theta}{(\sqrt{36+36\tan^2\theta})^3} = 72 \int \frac{6 \sec^2 \theta}{216 \sec^3 \theta} d\theta = \frac{72 \cdot 6}{216} \int \frac{\sec^2 \theta}{\sec^3 \theta} d\theta$$


$$= 2 \int \frac{1}{\sec \theta} d\theta = 2 \int \cos \theta d\theta$$

$$= 2 \sin \theta + C$$

$$= 2 \cdot \frac{u}{\sqrt{36+u^2}} + C$$

$$= \frac{2x^3}{\sqrt{36+x^6}} + C$$

$$\begin{aligned}
 ④ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 6x + 10}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{(x+3)^2 + 1}} dx \quad \left(\frac{6}{2} \right)^2 = \frac{36}{2} = 18 \\
 &= \int \frac{1}{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}} \sec^2 \theta d\theta \\
 &= \int \frac{1}{\sec \theta} \sec^2 \theta d\theta
 \end{aligned}$$



$$\tan \theta = x + 3$$


$$3 \cdot \sec^2 \theta d\theta = 1 dx$$

$$= \int \sec \theta d\theta$$


$$= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

$$\sec \theta = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{A}} + \frac{1}{1}} = \sqrt{\frac{A+1}{A}}$$

$$= \ln |\sqrt{(x+3)^2 + 1} + x+3| + C$$



$$\textcircled{1} \quad \int 5^{\theta} x^7 \sqrt{4-25x^2} dx =$$



$$\sin \theta = \frac{sx}{2}, \quad 2 \cos \theta = \sqrt{4-25x^2}$$

$$2 \sin \theta = sx$$

$$\frac{2 \sin \theta}{2} = x$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{4-25x^2}}{2}$$

$$\frac{2}{2} \cos \theta d\theta = dx$$

$$= 5^{\theta} \int \frac{2^7}{5^7} \sin^7 \theta \cdot 2 \cos \theta \cdot \frac{2}{3} \cos \theta d\theta$$

$$= 5^{\theta} \int \frac{2^9}{5^8} \sin^7 \theta \cos^2 \theta d\theta = \frac{5^{\theta} \cdot 2^9}{5^8} \int \underbrace{\sin^7 \theta \cos^2 \theta d\theta}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$(\sin^2 \theta)^3 = (1 - \cos^2 \theta)^3$$

$$= \int \sin^6 \theta \cos^2 \theta \sin \theta d\theta$$

$$= \int (1 - \cos^2 \theta)^3 \cdot \cos^2 \theta \cdot \sin \theta d\theta$$

$$= 512 \left\{ - \left[-\frac{u^9}{9} \right] + \left[\frac{3u^7}{7} \right] - \left[\frac{3u^5}{5} \right] + \left[\frac{u^3}{3} \right] \right\}$$

$$u = \cos \theta$$

$$du = -\sin \theta d\theta$$

$$-du = \sin \theta d\theta$$

$$= 512 \left\{ \frac{u^9}{9} - \frac{3u^7}{7} + \frac{3u^5}{5} - \frac{u^3}{3} \right\}$$


$$= - \int (1 - u^2)^3 u^2 du$$

$$= 512 \left\{ \frac{\cos^9 \theta}{9} - \frac{3 \cos^7 \theta}{7} + \frac{3 \cos^5 \theta}{5} - \frac{\cos^3 \theta}{3} \right\}$$

$$= - \int -u^8 + 3u^6 - 3u^4 + u^2 du$$

$$= 512 \left\{ \frac{\left(\frac{\sqrt{4-25x^2}}{2}\right)^9}{9} - \frac{3\left(\frac{\sqrt{4-25x^2}}{2}\right)^7}{7} + \frac{3\left(\frac{\sqrt{4-25x^2}}{2}\right)^5}{5} - \frac{\left(\frac{\sqrt{4-25x^2}}{2}\right)^3}{3} \right\} + C$$

$$(2) \int_0^{\frac{1}{2}} \theta \sqrt{1 - \theta^4} d\theta =$$



$$\cos(\alpha) = \sqrt{1 - \theta^4}$$

$$\sin(\alpha) = \theta^2$$

$$\cos(\alpha) d\alpha = 2\theta d\theta$$

$$\underline{\cos(\alpha) d\alpha} = \underline{\theta d\theta}$$

$$\sin(\alpha) = 1$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$\sin(\alpha) = \theta$$

$$\alpha = \theta$$


$$= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(\alpha) \cos(\alpha)}{2} d\alpha = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \alpha d\alpha$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} + \cos(2\alpha) d\alpha = \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{1}{2}\alpha + \frac{\sin(2\alpha)}{2} \right\} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[\left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\sin(\pi)}{2} \right\} - \left\{ \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{\sin(0)}{2} \right\} \right]$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[\left\{ \frac{\pi}{4} \right\} \right] = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} \quad \int_{0}^{\ln(\sqrt{2})} \frac{e^{4x}}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx = \int_{0}^{\ln(\sqrt{2})} \frac{\sec^3 \theta}{\tan \theta} \sec \theta \tan \theta d\theta = \int_{0}^{\ln(\sqrt{2})} \sec^4 \theta d\theta$$



$$\sec \theta = e^x \quad e^x dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$\sqrt{e^x - 1} = \tan \theta d\theta$$

$$e^{\ln(\sqrt{2})} = \sqrt{2}$$

$$\tan(\sqrt{2}) = \frac{\pi}{4}$$

$$e^{\theta} = 1 \\ \theta = 0$$

$$= \int_0^{\pi/4} \sec^4 \theta d\theta = \int_0^{\pi/4} (1 + \tan^2 \theta) \sec^2 \theta d\theta = \int_0^1 (1 + u^2) du = u + \frac{u^3}{3}$$

$$u = \tan \theta \\ du = \sec^2 \theta$$

$$\left[\tan \theta + \frac{\tan^3(\theta)}{3} \right]_0^{\pi/4}$$

$$\left\{ 1 + \frac{1}{3} \right\} - \left\{ 0 + \frac{0^3}{3} \right\}$$

$$\frac{3+1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3+1}{3} = \frac{4}{3}$$

Capítulo 10

Laboratorio #6

Laboratorio # 6

2019-09-11
David Carzo 20190432

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1a} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{9+x^6} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{9+u^2} \cdot \frac{1}{3} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{3dv}{9+9v^2} \cdot \frac{1}{3} = \boxed{100} \\
 & u = x^3 \quad u = 3v \\
 & du = 3x^2 dx \quad dv = 3dv \\
 & \frac{du}{3} = x^2 dx \\
 & = \frac{1}{9} \tan^{-1}\left(\frac{u}{3}\right) = \frac{1}{9} \tan^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) \\
 & = \frac{1}{9} \tan^{-1}\left(\frac{1}{9} \tan^{-1}(a^3/3)\right) \\
 & = \left\{ \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{9} \tan^{-1}\left(\frac{t^3}{3}\right) \right) \right\} - \left\{ \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{9} \tan^{-1}\left(\frac{a^3}{3}\right) \right) \right\} \\
 & = \left(\frac{1}{9} \cdot \frac{\pi}{2} \right) - \left(-\frac{1}{9} \cdot \frac{\pi}{2} \right) \\
 & = \frac{\pi}{18} + \frac{\pi}{18} = \frac{\pi}{9} \quad \square
 \end{aligned}$$

- ① La integral converge por que al ser evaluada en ∞ y $-\infty$ que da una constante.
- ② Es impropia por los límites ser infinitos

①(b) $\int_{-2}^3 \frac{dx}{\sqrt[4]{x+2}} =$

① asíntota en -2
 $x + 2 = 0$
 $x = -2$

$\int_{-2}^3 (x+2)^{\frac{1}{4}} dx = (x+2)^{-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} \Big|_{-2}^3$
 $= \frac{4}{3} (x+2)^{\frac{3}{4}} \Big|_{-2}^3$

$= \left\{ \frac{4}{3} \sqrt[4]{(3+2)^3} \right\} - \left\{ \cancel{\frac{4}{3} \sqrt[4]{(-2+2)^3}} \right\}$

$$\frac{4}{3} \sqrt[4]{5^3}$$

② convergente por que existe

①②. $\int_0^\infty \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = -2 \int_0^\infty e^u du = -2 \cdot e^u \Big|_0^\infty = -2 e^{\sqrt{x}} \Big|_0^\infty$

$u = -(x)^{\frac{1}{2}} \quad u(0) = 0 \quad = \underbrace{\lim_{a \rightarrow \infty} (-2 e^{-\sqrt{a}})}_0 - \underbrace{\lim_{a \rightarrow 0} (-2 e^{-\sqrt{0}})}_0$

$du = -\frac{1}{2} (x)^{-\frac{1}{2}} dx \quad = -2 \cdot 0 - (-2) = 2$


$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

① La integral converge
 ② es impropia por el límite superior ser infinito & A.V. en 0

$$-2 du = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

① ②

$$\int_2^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-4}} dx =$$



$$\begin{aligned}c^2 &= a^2 + b^2 \\-a^2 &= -c^2 + b^2 \\a^2 &= c^2 - b^2\end{aligned}$$

① Se indifire en $x=2$ y está evaluada en infinito por eso es impropia.

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{A}{H} T \frac{0}{A} \right)$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2}$$

$$\sec \theta = \frac{x}{2} \quad \theta = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$2\tan \theta = \sqrt{x^2 - 4}$$

$$2\sec \theta = x$$

$$= \int_2^\infty \frac{2\sec \theta \tan \theta}{2\sec \theta 2\tan \theta} d\theta = \int_2^\infty \frac{2}{4} d\theta = \int_2^\infty \frac{1}{2} d\theta = \frac{1}{2} \int_2^\infty 1 d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \theta \Big|_1^\infty = \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) \Big|_1^\infty = \left\{ \lim_{\theta \rightarrow \infty} \underbrace{\left(\frac{1}{2} \sec^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right)}_{\theta^2} \right\} - \left\{ \lim_{\theta \rightarrow 0} \underbrace{\left(\frac{1}{2} \sec^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right)}_{1} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right\} - \left\{ 0 \right\}$$

$$\frac{1}{\cos(\theta)} = 1$$

$$= \frac{\pi}{4} \quad \square$$

② convergente

$$\textcircled{e} \quad \int_0^2 z^2 \ln(z) dz =$$

② es impropias por $\ln(0)$
esta indefinida

$$u = \ln(z) \quad dv = z^2$$

$$du = \frac{1}{z} dz \quad v = \frac{z^3}{3}$$

$$= \ln(z) \frac{z^3}{3} - \int_0^2 \frac{z^3}{3} \cdot \frac{1}{z} dz$$

$$= \ln(z) \frac{z^3}{3} - \left[\frac{z^2}{3} \right]_0^2 = \ln(z) \frac{z^3}{3} - \frac{1}{3} \frac{z^3}{3} = \ln(z) \frac{z^3}{3} - \frac{z^3}{9} \Big|_0^2 =$$

$$\stackrel{\text{con } 0}{=} \left\{ \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\ln(z) \frac{z^3}{3} \right) \right\} - \left\{ \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{z^3}{9} \right) \right\}$$

$$\frac{1}{3} \frac{\ln(z)}{z^3} \stackrel{LH}{=} \frac{1}{3} \left[\frac{\frac{1}{z}}{-3z^2} \right] = \frac{1}{3} \frac{z^4}{z} = \frac{z^3}{3} = 0$$

$$\stackrel{\text{con } 0}{=} \{0 - 0\}$$

$$\stackrel{\text{con } 2}{=} \left\{ \ln(z) \frac{8}{3} - \frac{8}{9} \right\} - \{0\}$$

$\therefore \ln(2) \frac{8}{3} - \frac{8}{9}$ ~~② la integral es convergente~~

(2)

$$F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$$

(a) $f(t) = e^t$

$$F(s) = \int_0^\infty e^t e^{-st} dt$$

$$F(s) = \int_0^\infty e^t e^{-st} dt$$

$$F(s) = \int_0^\infty e^{t(1-s)} dt = \left[\frac{e^{t(1-s)}}{1-s} \right]_0^\infty$$

$\lim_{a \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{e^{a(1-s)}}{1-s}}_{\text{como } s > 1 \text{ es mayor a uno}} - \underbrace{\frac{e^0}{1-s}}_0 = \frac{1}{s-1}$

(b) $f(t) = t$

$$F(s) = \int_0^\infty t e^{-st} dt = \int_0^\infty -\frac{u}{s} \cdot e^u \cdot -\frac{du}{s} = \int_0^\infty \frac{u e^u du}{s^2}$$

$$-\frac{u}{s} = t \quad u = -st \quad = \frac{1}{s^2} \int_0^\infty u e^u du$$

$$du = -s dt \quad dt$$

$$-\frac{du}{s} = dt$$

$$\begin{aligned} \beta &= u & d\beta &= e^u \\ d\beta &= du & \beta &= e^u \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{s^2} \left[-st e^{-st} - e^{-st} \right]_0^\infty$$

$$\frac{1}{s^2} \left\{ \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-st e^{-st} \right) - \lim_{a \rightarrow \infty} (e^{-st}) \right\}_0^\infty$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{-s}{e^{st}} \cdot s \Big|_0^\infty$$

$$u e^u - \int e^u du$$

$$\frac{1}{s^2} \left[u e^u - e^u \right]_0^\infty =$$

$$\frac{1}{s^2} (0) - \frac{1}{s^2} \left(-s(0)e^{s(0)} - e^{-s(0)} \right) = -\frac{1}{s^2} \cdot -1 = \frac{1}{s^2}$$

Capítulo 11

Laboratorio #8

Laboratorio 3


David Gabriel Gorzo Monnett

20190432

2019-09-24

- ① rotar eje-x ; $y = \sqrt{x}$; $y = 0$; $x = 4$

120



Primero encontrar el área de la curva \sqrt{x}


$$A = \pi r^2$$

como r es en este caso y la fórmula queda así:

$$A = \pi y^2$$

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \left[\left(\frac{4^2}{2} \right) - \left(\frac{0^2}{2} \right) \right] = \pi \left[\left(\frac{16}{2} \right) - (0) \right] = \frac{\pi 8}{2} = \cancel{\frac{\pi 8}{2}}_{w+s}$$

② eje -y es el eje de rotación $y = \ln(x)$; $y = 1$ y $y = 2$; $x =$



$$\ln(x) = 2$$

$$x = e^2$$

el radio siempre será $\ln(x)$


$$\begin{aligned} A &= \pi r^2 \\ \therefore A &= \pi (\ln^2(x)) \end{aligned}$$

hacerlo respecto a y:

$$V = \pi \int_1^2 e^{2y} dy = \pi \left[\frac{1}{2} e^{2y} \right]_1^2 = \begin{aligned} y &= \ln(x) \\ e^{2y} &= x \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[(e^{2 \cdot 2}) - (e^{2 \cdot 1}) \right] = \frac{\pi}{2} (e^4 - e^2)$$

X/ no



Región 1:

$$\text{Radio Externo} = x^2$$

$$\text{Radio Interno} = x$$

haremos anillos de $x=0$ a $x=1$
y posteriormente de $x=1$ a
 $x=2$

$$V_1 = \pi \int_0^1 [(2-x^2)^2 - (2-x)^2] dx$$

$$V_1 = \pi \int_0^1 [(2)^2 - 2(2)(x^2) + (x^2)^2] - [(2)^2 - 2(2)(x) + (x)^2] dx$$

$$= \pi \int_0^1 [4 - 4x^2 + x^4 - (4 - 4x + x^2)] dx$$

$$= \pi \int_0^1 (4 - 4x^2 + x^4 - 4 + 4x - x^2) dx$$

$$= \pi \int_0^1 (x^4 - 5x^2 + 4x) dx = \pi \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{5}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^1$$

$$= \pi \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{5}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^2 = \pi \left[\left(\frac{1}{5} - \frac{5}{3} + 2 \right) - (0) \right]$$

$$= \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{5}{3} + 2 \right) = \pi \left(\frac{3 - 25 + 30}{15} \right) = \pi \frac{8}{15}$$

$$V_1 = \pi \frac{8}{15} \cancel{x} \cancel{x}^{204}$$

Región 2: se divide en dos. uno para $x = 1$ & $x = \sqrt{2}$
rad. ext. = x

$$\text{rad. int.} = x^2$$

$$V_{2.1} = \pi \int_1^{\sqrt{2}} \left[(2-x)^2 - (2-x^2)^2 \right] dx \quad V_{2.2} = \pi \int_{\sqrt{2}}^2 \left[(2-x)^2 \right] dx$$

$$V_{2.1} = \pi \int_1^{\sqrt{2}} \left[(2)^2 - 2(2)(x) + (x)^2 \right] - \left[(2)^2 - 2(2)(x^2) + (x^2)^2 \right] dx$$

$$\begin{aligned} & 4 - 4x + x^2 - [4 - 4x^2 + x^4] \\ & \overline{(4 - 4x + x^2 - 4 + 4x^2 - x^4)} \end{aligned}$$

$$V_{2.1} = \pi \int_1^{\sqrt{2}} -x^4 + 5x^2 - 4x^2 dx$$

$$= \pi \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{5}{3}x^3 - 2x^2 \right]_1^{\sqrt{2}}$$

$$= \pi \left[\left(-\frac{1}{5}(2)^{5/2} + \frac{5}{3}(2)^{3/2} - 2(\sqrt{2}) \right) - \left(-\frac{1}{5} + \frac{5}{3} - 2 \right) \right]$$

$$= \pi \left(-\frac{\sqrt{32}}{5} + \frac{5\sqrt{8}}{3} - 2\sqrt{2} + \frac{1}{5} - \frac{5}{3} + 2 \right) = \frac{\pi(38\sqrt{2} - 52)}{15}$$


$$\begin{aligned}
&= \pi \int_{\sqrt{2}}^2 ((z)^2 - 2(z)(x) + (x)^2) dx = \\
&= \pi \int_{\sqrt{2}}^2 (4 - 4x + x^2) dx = \pi \int_{\sqrt{2}}^2 (x^2 - 4x + 4) dx \\
&= \pi \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \right]_{\sqrt{2}}^2 = \\
&= \pi \left[\left(\frac{1}{3}(2)^3 - 2(2)^2 + 4(2) \right) - \left(\frac{1}{3}(\sqrt{2})^3 - 2(\sqrt{2})^2 + 4(\sqrt{2}) \right) \right] \\
&= \pi \left[\left(\frac{8}{3} - 8 + 8 \right) - \left(\frac{\sqrt{2}}{3} - 4 + 4\sqrt{2} \right) \right] \\
&= \pi \left[\frac{8}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} + 4 - 4\sqrt{2} \right] = \pi \left(\frac{20 - 14\sqrt{2}}{3} \right)
\end{aligned}$$

Para sacar el volumen neto se suman $V_1 + V_{2,1} + V_{2,2} = V_m$

$$\begin{aligned}
V_m &= \left[\left(\frac{\pi \cdot 8}{15} \right) + \left(\frac{\pi (38\sqrt{2} - 52)}{15} \right) + \left(\frac{\pi (20 - 14\sqrt{2})}{3} \right) \right] \\
&= \frac{8}{15}\pi + \frac{38\sqrt{2} - 52}{15}\pi + \frac{20 - 14\sqrt{2}}{3}\pi \\
&= \pi \left(\frac{8}{15} + \frac{38\sqrt{2} - 52}{15} + \frac{20 - 14\sqrt{2}}{3} \right) \\
&= \pi \left(\frac{56 - 32\sqrt{2}}{15} \right) \quad \cancel{x}
\end{aligned}$$

$$y = e^{-x^2}; \quad y = 0; \quad x = -1; \quad x = 1$$

a) eje de rotación eje y :



cilindros:

$$A = \pi r h$$

$$V = \pi \int_{-1}^1 r^2 h dx$$

$$r = x$$

$$h = y = e^{-x^2}$$

$$V = 2\pi \int_0^1 x e^{-x^2} dx$$

$$u = -x^2$$

$$du = -2x dx$$

$$\frac{du}{2} = x dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 e^{-u} \cdot \frac{du}{2} = \frac{2\pi}{2} \int_0^1 e^{-u} du$$

$$= \pi \int_0^1 e^{-u} du = \pi \left[-e^{-u} \right]_0^1$$

$$= -\pi e^{-x^2} \Big|_0^1 =$$

$$= -\pi \left(\left[e^{-(1)^2} \right] - \left[e^{-(0)^2} \right] \right) = -\pi (e^{-1} - e^0)$$


$$= -\pi (e^{-1} - 1), \text{ no } \cancel{x}$$

$$= \pi (1 - e^{-1})$$

Poner todo en términos de y así el radio es x .

hay un cilindro en $y = -1; x = 1$
 $(1, e^{-1})$

② alrededor de eje de rotación $y = -1$ $x = -1 ; x = 1$



radio interior:

$$r_{\text{int}} = 1$$

radio exterior:

$$r_{\text{ext}} = 1 + e^{-x^2}$$

$$A = \pi r^2$$

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-1}^1 (1 + e^{-x^2})^2 - (1)^2 \, dx = \\
 &= 2\pi \int_{-1}^1 1^2 + 2e^{-x^2} + (e^{-x^2})^2 - 1^2 \, dx \\
 &= 2\pi \int_0^1 2e^{-x^2} + (e^{-x^2})^2 \, dx \\
 &= 2\pi \int_0^1 e^{-x^2}(2 + e^{-x^2}) \, dx
 \end{aligned}$$

~~ω~~

Parte III

Cortos

Capítulo 12

Examen Corto # 1

100 pts

Corto #1 Cálculo Integral (20 min)

Nombre: David Gabriel Corzo Mruñafli Carnet: 20190432

1. Evalúe las siguientes integrales

$$(a) \text{ (30 pts.) } \int \left(x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4x} - \frac{2}{x^2} \right) dx = \int [x^2] dx - \frac{1}{2} \int [x] dx + \frac{1}{4} \int \left[\frac{1}{x} \right] dx - 2 \int \left[\frac{1}{x^2} \right] dx$$

$$= \frac{x^{2+1}}{2+1} - \left(\frac{1}{2} \right) \frac{x^{1+1}}{1+1} + \left(\frac{1}{4} \right) \ln(x) - (2) \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C$$

$$= \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{4} + \frac{\ln(x)}{4} + C$$

30 pts

$$\sin x = \cos x$$

$$\cos x = -\sin x$$

$$(b) \text{ (30 pts.) } \int_0^{\pi/4} (2 \sin x - 4 \cos(x)) dx$$

$$2 \int \sin x dx - 4 \int \cos x dx = 2 \left[-\cos x \right]_0^{\pi/4} - 4 \left[\sin x \right]_0^{\pi/4}$$


$$\begin{aligned} & \left\{ -2 \cos(\pi/4) - 4 \sin(\pi/4) \right\} - \left\{ -2 \cos(0) - 4 \sin(0) \right\} \\ & = \left\{ -2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} - \left\{ -2 \right\} = -\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 2 \end{aligned}$$

30 pts

2. Considere la región entre $f(x) = |x-5|$, el eje-x, y las rectas verticales $x=0$, $x=10$.

(a) (20 pts.) Trace la gráfica de la región.

(b) (20 pts.) Encuentre el área de la región utilizando geometría.



Capítulo 13

Examen Corto # 2

55pts

Corto #2 Cálculo Integral (15 min)

Nombre: David Gabriel Corzo Monatti Carnet: 20190432

1. (50 pts.) ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a $h(x) = 2 + \int_1^x \cos^3 \theta d\theta$ en $x = 0$?

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$y = 3 + 1(x - 0) \quad \times$$

20pts

$$h(x) = 2 + \int \cos^3 \theta d\theta \quad x = 0$$

devivo

$$h'(x) = 0 + \cos^3(e^x) \cdot e^x$$

$$h'(0) = 1 + \cos^3(1) e^0$$

$$h(0) = 2 + \cos^3(0)$$

$$= 2 + 1 = 3$$

2. (50 pts.) Un resorte sin amortiguamiento y sujeto a una fuerza externa tiene aceleración $a(t) = 2t - 4 \cos t + 5 \sin t$, velocidad y posición iniciales de 2 m/s y 0 m.

- (a) (25 pts.) Encuentra la función de velocidad del resorte

$$\ddot{x}(0) = 0^2 - 4 \sin 0 - 5 \cos 0 + C_1$$

$$a''(t) = 2t - 4 \cos t - 5 \sin t$$

$$a'(t) = 2t - 4 \int \cos t - 5 \int \sin t$$

$$a'(t) = \frac{2t^2}{2} - 4 \sin t - 5 \cos t$$

$$a'(t) = t^2 - 4 \sin t - 5 \cos t + C_1 \quad \times$$

$$y = 0 - 0 - 5 + C_1$$

$$y = -5 + C_1$$

$$C_1 = -5$$

- (b) (25 pts.) Encuentra la función de desplazamiento del resorte.

$$a''(t) = t^2 - 4 \sin t - 5 \cos t$$

$$a(t) = \int t^2 - 4 \int \sin t - 5 \int \cos t$$

$$a(t) = \frac{t^3}{3} + 4 \cos t - 5 \sin t + C_1 + C_2 \quad \times$$

$$\sin 3 = \cos$$

$$\cos 3 = -\sin$$

$$a(0) = \frac{0^3}{3} + 4 \cos 0 - 5 \sin 0 + (-s) + C_2$$

$$a(0) = 0 + 4 - 0 - s + C_2$$

$$a(0) = 4 - s + C_2$$

$$a(0) = -4 + C \quad 90$$

$$C_2 = -4$$

Capítulo 14

Examen Corto # 3

90pts

Corto #3 Cálculo Integral (20 min)


Nombre: David Corzo Carnet: 20190432

Resuelva las siguientes integrales:

1. (50 pts.) $\int \tan^5 \theta \sec^4 \theta d\theta$

$$= \int \tan^5 \theta \sec^2 \theta (\tan^2 \theta + 1) d\theta$$

$$= \left[\tan^7 \theta \sec^2 \theta \right] + \int \tan^5 \sec^2 \theta d\theta$$



$$\int d\theta \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

$$u = \tan \theta$$

$$du = \sec^2 \theta d\theta$$

$$u = \tan \theta$$

$$du = \sec^2 \theta d\theta$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos(2x))$$

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

$$\therefore \int u^7 du + \int u^5 du$$

$$= \frac{u^8}{8} + \frac{u^6}{6} + C$$

$$= \frac{\tan^8 \theta}{8} + \frac{\tan^6 \theta}{6} + C$$

X 40pts

2. (50 pts.) $\int e^{x^8+1} (x^8 + 1) 16x^7 dx$

$$u = x^8 + 1$$

$$du = 8x^7 dx$$

$$2(du) = 16x^7 dx$$

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} [2(x^8 + 1) \cdot e^{x^8+1}] \\ & 2(x^8 + 1) \cdot 2e^{x^8+1} + 2e^{x^8+1} \cdot 8x^7 \\ & 2x^8 + 2 + 16x^7 \end{aligned}$$

$$2 \int e^u (u) du$$

$$u = v \quad dv = e^v$$

$$dv = 1 du \quad v = e^u$$

$$u = e^v - \int e^v du$$

$$2 \left[u \cdot e^u - e^u + C \right]$$

$$2 \left[(x^8 + 1)(e^{x^8+1}) - (e^{x^8+1}) + C \right]$$

$$2 \left[(x^8 + 1) (e^{x^8+1}) - (e^{x^8+1}) + C \right]$$

50pts

Capítulo 15

Examen Corto # 4

Capítulo 16

Examen Corto # 5

100

Corto #5 Cálculo Integral (10 min)

Nombre: David Gabrial Corzo Navarro Carnet: 20190432

Determine si la integral es convergente o divergente. Evalúe si es convergente. Utilice la regla de L'Hospital para evaluar límites con formas indeterminadas.

1. (100 pts.) $\int_{-\infty}^0 xe^x dx$

$$\begin{aligned} u &= x & dv &= e^x \\ du &= dx & v &= e^x \end{aligned}$$

$$= xe^x - \int_{-\infty}^0 e^x dx = xe^x - \left[e^x \right]_{-\infty}^0$$

$$= \left\{ \lim_{a \rightarrow 0} (xe^x - e^x) \right\} - \left\{ \lim_{a \rightarrow -\infty} (xe^x - e^x) \right\}$$

$0 \cdot e^0 = 0$
 $-\infty e^{-\infty} = 0$
Forma indeterminada

$$\underbrace{\lim_{a \rightarrow -\infty} (xe^x)} - \underbrace{\lim_{a \rightarrow -\infty} (e^x)}$$

$$\underbrace{\lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{e^x} \right)} - \underbrace{\lim_{a \rightarrow -\infty} (e^{-\infty})}$$

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^x}{x} \right) \stackrel{\text{L'Hopital}}{\downarrow} = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{e^x}{1} \right) =$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{e^a} \right) = 0$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} (e^{-\infty}) = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{e^a} \right) = 0 \quad \therefore \left\{ \lim_{a \rightarrow -\infty} (xe^x - e^x) \right\} = 0$$

en conclusión

∴

$$= \{ 0 \cdot e^0 - e^0 \} - \{ 0 \} = \{ 0 - 1 \} - \{ 0 \}$$

$$= \{ -1 \} - 0 = -1 - 0$$

$$= -1$$

Convergente por
la respuesta ser
-1

Capítulo 17

Examen Corto # 6

Corto #6 Cálculo Integral (20 min)

Nombre: David Gabriel Corzo Carnet: 20100432

1. Considera la región limitada por las curvas $y_1 = x^2 - 4x + 4$ y $y_2 = 10 - x^2$.


a) Dibuja las regiones acotadas por cada una de las curvas dadas. (40 pts.)
Para su información $\sqrt{10} \approx 3.2$.

b) Plantea la integral para encontrar el área de la región. (40 pts.)

c) Encuentra el área de la región. (20 pts.)

d) BONO: Encuentra las inversas de y_1 y y_2 . (10 pts.)

e) BONO: Plantea las integrales para encontrar el área de la región integrando en el eje-y. (20 pts.)



$$2x - 4 = 0$$

$$x = \frac{4}{2} = 2$$

$$x^2 - 4x + 4 = 10 - x^2$$

$$x^2 + x^2 - 4x + 4 = 10$$

$$2x^2 - 4x + 6 = 0$$

$$2(x^2 - 2x - 3) = 0$$

$$2(x - 3)(x + 1) = 0$$

$$\text{interceptos: } x = 3 \quad x = -1$$

$$y_2(3) = 3^2 - 4(3) + 4$$

$$= 9 - 12 + 4$$

$$= -3 + 4$$

$$= 1$$

$$y_2(-1) = 10 - (-1)^2$$

$$10 - 1 = 9 \quad y_1(-1) = 1 + 4 + 4$$

$$9 \quad y_1(-1) = 9$$

$$y_1(2) = 4 - 8 + 4$$

$$y_1(1) = 1 - 4 + 4 = -8$$

$$= 1$$

$$A = \int_{-\frac{1}{3}}^3 (10 - x^2) - (x^2 - 4x + 4) dx \quad \cancel{u0}$$

$$= \int_{-\frac{1}{3}}^3 10 - x^2 - x^2 + 4x - 4 dx$$

$$= \int_{-1}^3 -2x^2 + 4x + 6 dx$$

$$= \left[-\frac{2}{3}x^3 + \frac{4}{2}x^2 + 6x \right]_{-1}^3 = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 6x \right]_1^3$$

$$= \left\{ -\frac{2}{3}(3)^3 + 2(3)^2 + 6(3) \right\} - \left\{ -\frac{2}{3}(1)^3 + 2(1)^2 + 6(1) \right\}$$

$$= -\frac{2}{3} \cdot 3^2 \cdot 3 + 18 + 18 - \left\{ -\frac{2}{3} + 2 + 6 \right\}$$

$$= -18 + 18 + 18 + \frac{2}{3} - 2 - 6$$

$$= 18 + \frac{2}{3} - 8 = \frac{18 \cdot 3}{3} + \frac{2}{3} - \frac{8 \cdot 3}{3} = \frac{18 \cdot 3 + 2 - 8 \cdot 3}{3}$$

$$= \frac{54 + 2 - 24}{3} = \frac{56 - 24}{3} = \frac{32}{3} \quad \cancel{10} \quad \frac{18}{3} \\ \cancel{A} \quad \frac{54}{3}$$

BONOS INVERSAIS

$$y_1 = x^2 - 4x + 4$$

$$y = (x-2)(x-2)$$

$$y = (x-2)^2$$

$$\pm \sqrt{y} = x-2$$

$$\pm \sqrt{y} - 2 = x$$

$$x_{1,1} = -\sqrt{y} - 2$$

$$x_{1,2} = \sqrt{y} - 2$$

$$A = \int_{10}^a \sqrt{-y+10} + \sqrt{-y+10} dy + \int_a^{-1} \sqrt{-y+10} - (\sqrt{y}-2) dy + \dots$$

$$\dots + \int_{-8}^{-1} (\sqrt{y}-2) - (-\sqrt{y}-2) dy$$

$$A = \int_{-1}^a \sqrt{-y+10} + \sqrt{-y+10} dy + \int_a^{-1} \sqrt{-y+10} - (\sqrt{y}-2) dy + \dots$$

$$+ \int_{-1}^{10} (\sqrt{y}-2) - (-\sqrt{y}-2) dy$$

X 10

DAVID CORRÓ

$$y_2 = 10 - x^2$$

$$y - 10 = -x^2$$

$$-y + 10 = x^2$$

$$\pm \sqrt{-y+10} = x_2$$

Capítulo 18

Examen Corto # 7


60

Corto #7 Cálculo Integral (20 min)

Nombre: David CorzoCarnet: 20190432

Un sólido se obtiene al girar $x_1 = \sqrt{y}$, $x_2 = 0$ y $y_1 = 4$, alrededor de la recta $x = -1$.

- Grafique la región, indicando curvas, intersecciones y el eje de rotación. (50 pts.)
- Planteé la integral de volumen. (50 pts.)
- Calcule el volumen resolviendo la integral. (20 pts. extra)



$$x_1 = \sqrt{y}$$

$$x^2 = y$$

$$x^2 = 16$$

$$x = 4$$

intercepto x_1 con y_1 :

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm 2$$

intercepto en
 $(2, 4)$

Radio =

$$A = \pi r^2$$

$$r = 1 + \sqrt{y}$$

integro respecto a y

$$A = \pi \int_{-1}^2$$

$$V = \pi \int_{-1}^2 (1 + \sqrt{y})^2 dy \quad \text{X 20}$$

$$= \pi \int_{-1}^2 (1 + 2\sqrt{y} + y) dy$$

$$= \pi \left[y + \frac{4}{3} y^{3/2} + \frac{1}{2} y^2 \right]$$

$$= \pi \left[\left(2 + \frac{4}{3} (2)^{3/2} + \frac{1}{2} (2)^2 \right) - \left(-1 + \frac{4}{3} (-1)^{3/2} + \frac{1}{2} (-1)^2 \right) \right]$$

Capítulo 19

Examen Corto # 8

100

Corto #8 Cálculo Integral (20 min)

Nombre: David Gabriel Argandoña Mcmath Carnet: 20190432

- a. Calcule el valor promedio de $f(x) = (x - 4)^2$ en el intervalo $[0, 6]$ (50 pts.)
 b. Encuentra las c 's tal que $f(c) = f_{\text{prom}}$. (25 pts.)
 c. Gráfica f y el rectángulo cuya área es igual al área bajo la gráfica de f . (25 pts)

a)

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{6-0} \int_0^6 (x - 4)^2 dx = \frac{1}{6} \int_0^6 (x^2 - 2 \cdot 4 \cdot x + 4^2) dx$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^6 (x^2 - 8x + 16) dx = \frac{1}{6} \left[\left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{8}{2}x^2 + 16x \right) \right]_0^6 =$$

$$= \frac{1}{6} \left[\left(\frac{1}{3}(6)^3 - 4(6)^2 + 16(6) \right) - (0) \right] =$$

$$= \frac{1}{6} \left[\frac{216}{3} - 4(36) + 96 \right] = \frac{1}{6} [72 - 144 + 96] =$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 36 \\ \hline 216 \\ -21 \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 72 \\ 36 \\ \hline 4 \\ 144 \\ \hline \end{array} \quad = \quad \frac{24}{6} = \boxed{4}$$

$$\begin{array}{r} 96 \\ +72 \\ \hline 168 \\ -144 \\ \hline 24 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ 6 \\ \hline 24 \end{array}$$

b)

$$(x - 4)^2 = 4$$

$$x - 4 = \pm \sqrt{4}$$

$$x = \pm 2 + 4$$


$$x_1 = 2 + 4 = \boxed{6}$$

$$x_2 = -2 + 4 = \boxed{2}$$

$$\begin{array}{c} c = 6 \\ \hline c = 2 \end{array}$$



c)



Capítulo 20

Examen Corto # 9

100

CORTO #9 Cálculo Integral (15 min)

Nombre: David Auguero Carnet: 101010432

1. Resuelva la siguiente integral $\int \frac{x^2 + 2x - 4}{x^3 + 4x} dx$

$$\int \frac{x^2 + 2x - 4}{x(x^2 + 4)} dx = \underbrace{\int -\frac{1}{x} dx}_{①} + \underbrace{\int \frac{2x + 2}{x^2 + 4} dx}_{②}$$

$$\frac{x^2 + 2x - 4}{x(x^2 + 4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4} \quad \left. \begin{array}{l} ① \\ - \int \frac{1}{x} dx = [-\ln|x|] \end{array} \right\} ①$$

$$x^2 + 2x - 4 = A(x^2 + 4) + (Bx + C)x$$

$$x^2 + 2x - 4 = Ax^2 + 4A + Bx^2 + Cx$$

$$\left. \begin{array}{l} ② \\ \int \frac{2x}{x^2 + 4} dx + \frac{2}{x^2 + 4} dx \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2.1 \\ 2.2 \end{array}$$

$$x=0 ;$$

$$-4 = A(0)^2 + 4A + B(0)^2 + C(0)$$

$$-4 = 4A$$

$$4A = -4$$

$$\underline{A = -1}$$

$$A = -1$$

$$B = 2$$

$$C = 2$$

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u|$$

$$u = x^2 + 4$$

$$du = 2x dx$$

$$x^2 + 2x^2 - 4x^0 = x^2(-1) + 4(-1) + Bx^2 + Cx$$

$$x^2 + 2x^2 - 4x^0 = -x^2 - 4 + Cx + Bx^2$$

$$x^2 + 2x^2 - 4x^0 = -x^2 + Bx^2 + Cx - 4$$

$$1x^2 + 2x^2 - 4x^0 = (B-1)x^2 + Cx - 4 ; C = 2$$

$$B-1 = 1$$

$$B = 1+1$$

$$\underline{B = 2}$$

$$a = 4$$

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) =$$

$$= \boxed{\arctan\left(\frac{x}{2}\right)}$$

R/

$$-\ln|x| + \ln|x^2 + 4| + \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

Parte IV

Simulacros

Capítulo 21

Parcial Simulacro I

**Simulacro de Parcial #1,
Cálculo Integral**
Lunes, 26 de Agosto

Nombre y Apellidos: _____

Tema:	1	2	3	4	5	6	Total
Puntos:	40	20	15	15	20	10	120
Nota:							

1. Evalúa las siguientes integrales indefinidas.

(a) (10 pts.) $\int x \tan^{-1} x^2 dx$

(c) (10 pts.) $\int \frac{dt}{\sqrt{(t-2)^2 + 9}} dt$

(b) (10 pts.) $\int \frac{x^2}{\sqrt{9 - 25x^2}} dx$

(d) (10 pts.) $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx$

2. Evalúa las siguientes integrales definidas.

(a) (10 pts.) $\int_{\pi/4}^0 \tan^5 \theta \sec^3 \theta d\theta$

(b) (10 pts.) $\int_{\pi/2}^0 \frac{\cos t}{\sqrt{1 + \sin^2 t}} dt$

3. Considera la región entre $f(x) = |x - 8|$, el eje-x, y las rectas verticales $x = 0$, $x = 8$.

- (a) (5 pts.) Trace la gráfica de la región.

- (b) (5 pts.) Encuentre el área de la región utilizando geometría.

- (c) (5 pts.) Planteé la integral para encontrar el área de la región.

4. La función de aceleración (en m/s^2) para una partícula moviéndose en una recta es $a(t) = \frac{3}{\sqrt{2t+1}}$.

- (a) (5 pts.) Encuentra la velocidad de la partícula si su velocidad inicial es de -3 m/s.

- (b) (5 pts.) Encuentra la función de desplazamiento de la partícula si su posición a los 2 segundos es de 8 m en la dirección positiva.

- (c) (5 pts.) ¿Cuál es la posición de la partícula a los 7 segs?

5. La velocidad de una partícula (en metros por segundo) sobre una línea recta es $v(t) = 1 - (t - 2)^2$ para $0 \leq t \leq 2$. Encuentra:

- (a) (10 pts.) El desplazamiento de la partícula en el intervalo de tiempo dado

- (b) (10 pts.) La distancia recorrida de la partícula en el mismo intervalo de tiempo

6. (10 pts.) Calcule la ec. de la recta tangente a la curva de $f(x) = \int_{\sin x}^{2e^x - 2} \sqrt{t^2 + 2t + 4} dt$ en $x = 0$.

Capítulo 22

Simulacro primer intento de terminarlo

Parcial Simulacro # 1 - (Calculo Integral) 2019-08-26


$$\begin{aligned}
 ① \int x \tan^{-1}(x^2) dx &= \frac{1}{2} \int \tan^{-1}(u) du = \\
 u &= x^2 \\
 du &= 2x dx \\
 \frac{du}{2} &= x dx \\
 \left\{ \begin{array}{l} \text{---} = \tan(u) \quad d\beta = du \\ d\text{---} = \frac{1}{u^2+1} du \quad \beta = u \end{array} \right. \\
 &\text{---} \beta - \int \beta d\text{---} \\
 &= \tan^{-1}(u) \cdot u - \int u \cdot \frac{1}{u^2+1} du \\
 &= \tan^{-1}(u) \cdot u - \int \frac{u}{u^2+1} du \\
 &\quad \left\{ \begin{array}{l} w = u^2 + 1 \\ \frac{dw}{2} = u du \end{array} \right. \\
 &\quad \frac{1}{2} \int \frac{du}{w} \\
 &\quad \frac{1}{2} \ln|w| = \frac{1}{2} \ln|u^2+1| \\
 &\quad \downarrow \\
 &\frac{1}{2} \left[\tan^{-1}(u) \cdot u - \frac{1}{2} \ln|u^2+1| \right] \\
 &\frac{1}{2} \left[\tan^{-1}(x^2) x^2 - \frac{1}{2} \ln|x^4+1| \right] + C
 \end{aligned}$$

□

①(b)

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-25x^2}} dx$$

$$\sin^{-1}(\sin(\theta)) = \sin^{-1}\left(\frac{sx}{3}\right)$$



$$\int \frac{0}{H} \left(\frac{A}{H} \right) d\theta$$

$$\csc \theta = \frac{H}{O}$$

$$\sec \theta = \frac{H}{A}$$

$$\cot \theta = \frac{A}{O}$$

$$x = \frac{3}{5} \sin \theta$$

$$dx = \frac{3}{5} \cos \theta d\theta$$

$$\sin \theta = \frac{sx}{3}$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$3 \sin \theta = 5x$$

$$9 = 25x^2 + b^2$$

Para
x

$$\frac{3}{5} \sin \theta = x$$

$$\sqrt{9-25x^2} = b$$

Para
 $\sqrt{9-25x^2}$

$$3 \cos \theta = \sqrt{9-25x^2}$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{9-25x^2}}{3}$$

$$3 \cos \theta = \sqrt{9-25x^2}$$

$$\therefore \int \frac{\left[\frac{3}{5} \sin \theta \right]^2}{3 \cos \theta} \cdot \frac{3}{5} \cos \theta d\theta = \int \left[\frac{\frac{9 \sin^2 \theta}{25}}{\frac{3 \cos \theta}{1}} \right] \cdot \frac{3}{5} \cos \theta d\theta$$

$$= \int \frac{3 \cdot 3 \cdot \sin^2 \theta \cdot \cos \theta}{25 \cdot 3 \cos \theta} d\theta = \int \frac{3 \cdot 3 \cdot \sin^2 \theta \cdot \cos \theta}{25 \cdot 5 \cos \theta} d\theta =$$

$$= \frac{9}{125} \int \sin^2 \theta d\theta = \frac{9}{125} \int \left(\frac{1}{2} - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right) d\theta = \frac{9}{125} \left\{ \int \frac{1}{2} d\theta - \frac{1}{2} \int \sin(2\theta) d\theta \right\}$$


$$= \frac{9}{125} \left\{ \frac{\theta}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{-\cos(2\theta)}{2} \right) \right\} = \frac{9}{125} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\cos(2\theta)}{4} \right]$$

$$\frac{9}{125} \left[\frac{\sin^{-1}(sx/3)}{2} + \frac{2 \cdot sx \cdot \sqrt{9-25x^2}}{4} \right] + C$$

□

(3)

(a)



$$A = 8 * 8 * \frac{1}{2}$$

$$(b) \quad \underline{A = 32}$$

$$(c) \quad A = \int_0^8 x - 8 \quad = \left[\frac{x^2}{2} - 8x \right]_0^8$$

- 32

$$(5) \quad v(t) = 1 - (t^2 - 4t + 4)$$

$$v(t) = 1 - t^2 + 4t + 4$$

$$v(t) = -t^2 + 4t + 5 \quad 0 \leq t \leq 2$$

$$\int v(t) dt = - \int t^2 dt + 4 \int t dt + 5 \int 1 dt$$

$$f(x) = -\frac{t^3}{3} + \frac{4t^2}{2} + 5t$$

$$f(x) = -\frac{t^3}{3} + 2t^2 + 5t \Big|_0^2 = \left\{ -\frac{2^3}{3} + 2(2)^2 + 5(2) \right\} - \{ 0 \}$$

$$-\frac{8}{3} + 8 + 10$$

$$-\frac{8}{3} + \frac{18 \cdot 3}{3} = \frac{-8 + 18 \cdot 3}{3} = \frac{46}{3}$$

$$⑥ f(x) = \int_{\sin x}^{2e^x - 2} \sqrt{t^2 + 2t + 4} dt$$

$$= \left\{ \sqrt{(2e^x - 2)^2 + 2(2e^x - 2) + 4} \cdot 2e^x \right\} - \left\{ \sqrt{\sin^2(x) - 2\sin(x) + 4} \cdot \cos x \right\}$$

$$m = \frac{\cancel{(2e^0 - 2)^2 + 2(0) + 4} \cdot 2}{\cancel{\sqrt{4}} \cdot 2} - \sqrt{4}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$f(a) = 0 + 2(x - 0)$$

\xrightarrow{x}

④ ⑤

$$\int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx$$

$$= \frac{e^x}{(x+1)^2}$$

$$+ \int \frac{e^x}{(x+1)^2} dx$$

$$= \frac{e^x}{(x+1)^2} + \int \frac{e^x}{(x+1)^2} dx$$

Capítulo 23

Simulacro segundo intento para estudiar

Resolución De Simulacro

$$\int \tan^{-1}(x^2) x \, dx = \frac{1}{2} \int \tan^{-1}(u) du =$$

$u = x^2$
 $\frac{du}{2} = x \, dx$

$$uv - \int v \, du$$

$$v = \tan^{-1}(u) \quad dv = du$$

$$d\theta = \frac{1}{u^2+1} du \quad v = u$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \tan^{-1}(u) u - \int u \frac{1}{u^2+1} du \right\}$$

$$= \int \frac{u}{u^2+1} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\theta} d\theta$$

$$\theta = \ln |\theta| + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln |u^2+1| + C$$

$$= \frac{1}{2} \tan^{-1}(x^2) \cdot x^2 - \frac{1}{4} \ln |x^4+1| + C$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-25x^2}} dx = \int \left[\frac{\frac{9 \sin^2 \theta}{25}}{\frac{3 \cos \theta}{1}} \right] \cdot \frac{3}{5} \cos \theta = \int \frac{9 \sin^2 \theta}{3 \cdot 25 \cos \theta} \cdot \frac{3 \cos \theta}{5} d\theta =$$

$c^2 = a^2 + b^2$
 $0 = -c^2 + a^2 + b^2$
 $-1(-b^2) \equiv (-c^2 + a^2)$
 $b^2 = c^2 - a^2$

$\tilde{c}^2 - a^2 = b^2$

$$= \int \frac{9}{125} \sin^2 \theta d\theta = \frac{9}{125} \int \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta$$

$$= \frac{9}{125} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{1}{2} \int \cos(2\theta) d\theta \right]$$

$$dx = \frac{3}{5} \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{9}{125} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{1}{2} \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]$$

$$= \frac{9}{125} \cdot \frac{\theta}{2} - \frac{9}{125} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin(2\theta)$$

$$= \frac{9}{125} \cdot \frac{\theta}{2} - \frac{9}{125} \cdot \frac{1}{4} \sin(2\theta) + C$$

$$= \frac{9}{125} \sin^{-1} \left(\frac{5x}{3} \right) - \frac{9}{125} \cdot \frac{1}{4} 2 \sin \theta \cos \theta + C$$

$$= \frac{9}{125} \sin^{-1} \left(\frac{5x}{3} \right) - \frac{9}{125} \cdot \frac{(5x)}{3} \left(\frac{\sqrt{9-25x^2}}{3} \right) + C$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \quad \int \frac{1}{\sqrt{(t-2)^2 + 9}} dt &= \int \frac{-3 \csc^2 \theta}{3 \csc \theta} d\theta = - \int \frac{\csc \theta \cdot \csc \theta}{\csc \theta} d\theta = - \int \csc \theta d\theta = + \ln |\csc \theta + \cot \theta| + C \\
 &= \ln \left| \frac{\sqrt{(t-2)^2 + 9}}{3} + \frac{t-2}{3} \right| + C \quad \square
 \end{aligned}$$

$\csc \theta = \frac{\text{hypotenuse}}{\text{opposite}} = \frac{\sqrt{(t-2)^2 + 9}}{3}$
 $\cot \theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{opposite}} = \frac{t-2}{3}$
 $- \csc^2 \theta = \frac{1}{3} - \theta \quad dt$
 $- \csc^2 \theta = \frac{1}{3} dt$
 $-3 \csc^2 \theta dt = dt$

$$\textcircled{4} \quad \int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx \quad \text{IIPFT} \\
 f'g + fg' \\
 \log \quad \text{Invers trig}$$

$u = x e^x \quad du = \frac{1}{(x+1)^2} dx \quad \text{Powers}$
 $du = e^x + x e^x dx \quad v = -\frac{1}{(x+1)} \quad \text{expn}$
 $+ \text{trigg}$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{(x+2)^2} \int \underbrace{\overbrace{(x+2)}^{u=x+1}^{-2} dx}_{du = dx} &= \int u^{-2} du \\
 &= -\frac{1}{u} = -\frac{1}{(x+1)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{x e^x - 1}{(x+1)} - \int -\frac{1}{(x+1)} e^x + x e^x dx^{-1} \\
 &= -\frac{x e^x}{x+1} - \left\{ - \left[e^x \right] \right\} + C
 \end{aligned}$$

$$\cancel{-\frac{x e^x}{x+1}}$$

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
 $\tan^2 \theta + 1^2 = \sec^2 \theta$
 $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$

$$\sin = \frac{1}{\csc}$$

$$\tan = \frac{\sin}{\cos}$$

$$\csc \tan = \sin$$

$$\cos \frac{\sin}{\cos} = \sin$$

$$\int \left(\ln \left(\frac{1}{\ln \left(\frac{1}{\ln \left(\frac{1}{\ln \left(\frac{1}{\ln x} \right)} \right)} \right)} \right) \right) dx$$

(6)

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

$$x = f(a) + f'(a)(x - x_1)$$

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$f(x) = \int_{\sin(x)}^{2e^x - 2} \sqrt{t^2 + 2t + 4} dt \quad \text{on } x = 0$$

$$f(x) = \left((2e^x - 2)^2 + 2(2e^x - 2) + 4 \right)^{\frac{1}{2}} - \left(\sin^2(x) + 2\sin x + 4 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \cancel{\sqrt{\frac{1}{2}((2e^x - 2)^2 + 2(2e^x - 2) + 4)^{\frac{1}{2}}}} + \cancel{\sqrt{\frac{1}{2}(2(e^x - 1)^2 + 4e^x - 4)}} -$$

$$\underbrace{\int_a^x \cancel{x^4} - \cancel{x^2} + 16 dx}_{= 0} = (x^5 - x^4 + 16) \cdot (8x^3 - 4x^3)$$

$$\int_a^x \alpha \lg \alpha = - \int_p^x \alpha \lg \alpha$$

Capítulo 24

Simulacro bota parcial

Simulacro de Parcial #2, Cálculo Integral

Lunes, 7 de octubre

Nombre y Apellidos: _____

Tema:	1	2	3	4	5	6	Total
Puntos:	16	15	15	15	15	24	100
Nota:							

1. Determine si la integral dada es convergente o divergente. Evalúe las que sean convergentes.

(a) (8 pts.) $\int_0^\infty \frac{x^2}{\sqrt{(1+x^3)^3}} dx$

(b) (8 pts.) $\int_0^1 \frac{12x^2+4x}{2x^3+x^2} dx$

2. Considere la región acotada por las gráficas $x = y^2$ y $x = 4y - y^2$.

(a) (5 pts.) Dibuja la región entre las curvas dadas.

(b) (5 pts.) Plantea la integral para encontrar el área de la región.

(c) (5 pts.) Encuentra el área de la región.

3. Un sólido se obtiene al girar la región entre $y = e^{-x}$, $y = 1$ y $x = 2$ alrededor de $y = 2$.

(a) (5 pts.) Dibuja la región entre la curvas y el eje de rotación.

(b) (10 pts.) Plantea la integral para encontrar el volumen del sólido.

4. Considere la función $f(x) = \pi + \pi \cos(\pi t)$ en el intervalo $[0, 1]$.

(a) (5 pts.) Calcula el valor promedio f_{prom} .

(b) (5 pts.) Encuentra c tal que $f(c) = f_{\text{prom}}$.

(c) (5 pts.) Grafica f y el rectángulo cuya área es la misma que el área bajo la gráfica de f .

5. (15 pts.) Encuentra la longitud exacta de la curva $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ en $0 \leq x \leq 3$.

6. Un foco LED Luminance de 60W tiene una vida media de 20,000 horas.

Su tiempo de vida se modela por medio de la función de densidad exponencial.

$$f(x) = \frac{1}{20,000} e^{-x/20,000}, \quad x \geq 0$$

(a) (8 pts.) ¿Cuál es la probabilidad de que un foco dure menos de 6,000 horas?

(b) (8 pts.) ¿Cuál es la probabilidad de que un foco dure más de 12,000 horas?

(c) (8 pts.) ¿Cuál es la mediana de esta distribución? Para su información $\ln 0.5 \approx -0.7$.

Parte V

Parciales

Capítulo 25

Parcial I

~~74~~/100
74

Universidad Francisco Marroquín

Facultad de Ciencias Económicas

Cálculo Integral

Examen Parcial 1

2do Semestre 2019

Nombre: David Corzo Carnet: 20190432

Instrucciones:

- Para tener calificación toda respuesta requiere de procedimiento correcto.
- La duración del examen es de 90 minutos.
- No es permitido utilizar diccionarios, notas, calculadora ni cualquier otro tipo de ayuda.
- Escriba la respuesta final de cada inciso con lapicero o utilice un resaltador.
- Sanciones Académicas. Reglamento General, inciso XV.2 ufm.edu/reglamento-general

Tema:	1	2	3	4	5	6	Total
Puntos:	20	12	18	19	14	17	100
Nota:							

1. Considere la función $v(t) = |t| - 8$ km/h en el intervalo $-10 \leq t \leq 10$. $-12 \leq t \leq 12$.

(a) (5 pts.) Evalúe $\int_{-10}^{10} v(t) dt$.

(b) (8 pts.) Bosqueje las regiones entre $v(t)$ y el eje- t en el intervalo dado. Encuentre el área de las regiones.

(c) (3 pts.) Encuentre el desplazamiento de la partícula en $-10 \leq t \leq 10$.

(d) (4 pts.) Encuentre la distancia de la partícula en $-10 \leq t \leq 10$.

$$\begin{aligned}
 @ & \int_{-10}^{10} [|t| - 8] dt = \left[\frac{t^2}{2} - 8t \right]_{-10}^{10} = \\
 & = \left\{ \frac{10^2}{2} - 8(10) \right\} - \left\{ \frac{(-10)^2}{2} - 8(-10) \right\} \\
 & = \left\{ \frac{100}{2} - 80 \right\} - \left\{ \frac{100}{2} + 80 \right\} \\
 & = \{50 - 80\} - \{50 + 80\} \\
 & = \{-30\} - \{130\} \\
 & = -30 - 130 \\
 & = -160 \quad \times \quad 0 \text{ pts}
 \end{aligned}$$

b) el resto en hoja
 b, c, d en hoja

44 pts

2. Considere la función $g(x) = \int_0^{\pi x} \sin t dt + \int_0^{2 \ln x} e^{x^4 - t^2} dt$.

(a) (4 pts.) Encuentre $g(1)$.

(b) (5 pts.) Encuentre $g'(1)$. Para su información $\sin 1 \approx 0.84$.

(c) (3 pts.) Encuentre la ecuación de la recta tangente a g en $x = 1$.

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^{\pi x} \sin(t) dt + \int_0^{x^4} e^{-t^2} dt \\ &= \left[-\cos(t) \right]_0^{\pi x} = \{-\cos(\pi)\} - \{-\cos(0)\} \\ &= 1 + 1 \\ @ &= \cancel{2} \quad \cancel{4 \text{ pts}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \sin(\pi x) \cdot \pi + e^{\cancel{x^4} - \cancel{x^2}} \cdot \cancel{\frac{2}{x}} \\ g'(1) &= \sin(\pi) \cdot \pi + e^{\cancel{2\ln(\pi)^4} + \cancel{2\ln(\pi)^2}} \\ g'(1) &= 0 + 1 \quad \cancel{\times} \quad \cancel{3 \text{ pts}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} @ & g'(1) = \cancel{1} \\ y &= f(a) + f'(a)(x - a) \\ @ & y = 2 + 1(x - 1) \quad \cancel{\times} \quad \cancel{2 \text{ pts}} \end{aligned}$$

9 pts

3. Resonancia: Un resorte sujeto a una fuerza oscilatoria tiene la función de aceleración:

$$a(t) = 10t \cos\left(\frac{t}{2}\right) \quad \text{cm/min}^2$$

- (a) (8 pts.) Encuentre la función de velocidad si el resorte se encuentra en reposo.
- (b) (10 pts.) Encuentre la función de posición si la posición inicial es de 5 cm.

en hoja las dos

13 pts

4. Evalúe las siguientes integrales indefinidas.

~~(a)~~ (14 pts.) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^6 - 4}} dx$

~~(b)~~ (5 pts.) $\int \frac{\cos x - \sin x + \sec^2 x}{\sin x + \cos x + \tan x} dx$

en hoja las dos.

5. Evalúe las siguientes integrales indefinidas.

(a) (10 pts.) $\int_0^{\pi/2} \sin^9 x \cos^3 x \, dx$

(b) (4 pts.) $\int_{-495}^{495} \left(\frac{\sin^9}{x^4 + \cos x} + \frac{\tan x}{x^2 + 1} \right)^{111} \, dx$

en hoja las dos


14 pts + 1

6. (17 pts.) Evalúe $\int_1^e \frac{24 \ln^2 x}{(\ln^6 x + 1)^2} \frac{1}{x} dx$

en hoja

6pts

①(b)



$$\text{Área} = 32$$

①(c)

~~$\int_{-10}^{10} |t| - 8 dt = -160$~~

~~X op 15~~

~~$\text{distancia} = 32 \rightarrow \text{X op 15}$~~

Davido largo

$$\begin{aligned} & \left[\int_{-8}^0 |t| - 8 dt \right] + \left[\int_0^8 |t| - 8 dt \right] + \left[\int_8^{10} |t| - 8 dt \right] \\ &= \left[\int_{-8}^0 -t - 8 dt \right] + \left[\int_0^8 t - 8 dt \right] + \left[\int_8^{10} t - 8 dt \right] \end{aligned}$$

②(a)

$$g(x) = \sin(\pi x) + e^{x^4} - t^2$$

②(b)

$$g(x) = -\cos(\pi x)$$

$$\textcircled{3} \quad a(t) = 10t \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

LIPET

$$u(t) = \int 10t \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) dt$$

$$u = \frac{t}{2}, \quad du = \frac{1}{2}dt, \quad 2du = dt$$

$$v = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) dt$$

$$dv = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) dt$$

$$= 2 \int \cos(u) du$$

$$= 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\textcircled{4} \quad v(t) = 10t \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 10 \int \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) dt$$

$$v(t) = 10t \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 10 \left(2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) + C \quad \times \quad \text{X}$$

$$v(0) = 10(0) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 10 \left(2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) + C$$

$$\textcircled{5} \quad f(t) = \int v(t) dt$$

$$= \int 10t \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 10 \left(2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) dt$$

$$= 10t \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 10 \cdot 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + C_0 - 10 \cdot 2 \cdot 2 \cdot -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + C_1$$

$$f(t) = 10t \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 20 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 40 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + C_0 + C_1 \quad \times \quad \text{X}$$


$$f(5) = 50 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 20 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 40 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + C_0 + C_1$$

$$\int \sin(u) du = -\cos(u)$$

$$u = \frac{\pi}{2}, \quad 2 \int -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) du = -\cos(u)$$

$$2du = dt$$

$$\textcircled{a} \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{x^6 - 4}} dx = \boxed{\quad}$$



$$\csc \theta = \frac{x^3}{2}$$

$$\begin{aligned} l^2 &= a^2 + b^2 \\ -a^2 &= -c^2 + b^2 \\ a^2 &= c^2 - b^2 \end{aligned}$$

$$\sin \frac{\theta}{A} = \frac{A}{l}, \sec \theta = \frac{l}{A}, \cot \theta = \frac{A}{l}$$

$$\cot \theta = \frac{\sqrt{x^6 - 4}}{2}$$

$$2 \cot \theta = \sqrt{x^6 - 4}$$

$$= \int \left[\frac{-2 \csc \theta \cot \theta}{2 \cot \theta} \right] d\theta$$

$$= \int \left[-\frac{2 \csc \theta \cot \theta}{6 \cot \theta} d\theta \right] = \int -\frac{2 \csc \theta \cot \theta}{6} d\theta = -\frac{2}{6} \int \csc \theta d\theta$$

$$= +\frac{2}{6} \ln \left| \frac{x^3}{2} + \frac{\sqrt{x^6 - 4}}{2} \right| + C \quad \cancel{\square} \quad \cancel{13 \text{ pts}}$$

$$\textcircled{b} \quad \int \frac{\cos x - \sin x + \sec^2 x}{\sin x + \cos x + \tan x} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C$$

$$\begin{aligned} u &= \sin x + \cos x + \tan x \\ du &= \cos x - \sin x + \sec^2 x dx \end{aligned}$$

David Largo

$$\theta = \csc^{-1}(x^3)$$

$$\csc \theta = x^3$$

$$-\csc \theta \cot \theta d\theta = \frac{3x^2}{2} dx$$

$$-\frac{2}{3} \csc \theta \cot \theta d\theta = x^2 dx$$

$$\int \csc \theta d\theta = -\ln |\csc \theta + \cot \theta|$$

$$= +\frac{2}{6} \ln |(\csc \theta + \cot \theta)| + C$$

5 pts \checkmark

$\cancel{13 \text{ pts}}$

③ ②

$$\int_0^{\pi/2} \underbrace{\sin^9 x}_{\sin^9 x - \sin^7 x} \underbrace{\cos^3 x}_{\cos^2(x)} dx =$$

$$\begin{cases} \sin^9 x \cos^2(x) \cos(x) dx \\ \sin^9 x (1 - \sin^2 x) \cos(x) dx \\ (\sin^9 x - \sin^7 x) \cos(x) dx \end{cases}$$

$u = \sin x \quad u(\pi/2) = \sin(\pi/2) = 1$
 $du = \cos x dx \quad u(0) = 0$

$$= \int_0^1 u^9 - u^{11} du = \frac{u^{10}}{10} - \frac{u^{12}}{12} = \left[\frac{\sin^{10} x}{10} - \frac{\sin^{12} x}{12} \right]_0^{\pi/2}$$

$$= \left\{ \frac{\sin^{10}(\pi/2)}{10} \cdot \frac{\sin^{12}(\pi/2)}{12} \right\} - \left\{ \frac{\sin^{10}(0)}{10} - \frac{\sin^{12}(0)}{12} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right\} = \left\{ \frac{12 - 10}{10 \cdot 12} \right\} = \frac{2}{1200} \text{ At } \boxed{10 \text{ pts}}$$

$\frac{2}{1200} \text{ At}$

⑥

$$\int_{-495}^{495} \left(\frac{\sin^a x}{x^a + \cos x} + \frac{\tan x}{x^2 + 1} \right)^{111} dx = 0$$

por ser impar y tener
 un límite negativo y el
 mismo positivo 4pts x

David Lorgo

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{6} \quad \int_1^e \frac{24 \ln^2 x}{(\ln^6 x + 1)^2} \cdot \frac{1}{x} dx \\
 & \quad \boxed{\begin{array}{l} u = \ln^3 x \\ du = 3(\ln x)^2 \cdot \frac{1}{x} dx \\ 8du = 24 \ln^2 x \cdot \frac{1}{x} \\ (\ln^3(x))^3 = 2(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \\ (\ln x)^3 = 3(\ln x)^2 \end{array}} \quad = \quad \int_1^e \frac{8 du}{(u^2 + 1)^2} = 8 \int_1^e \frac{du}{(u^2 + 1)^2} \\
 & \quad \boxed{\begin{array}{l} u = (u^2 + 1)^{-2} \\ du = -2(u^2 + 1)^{-3} \cdot 2u \cdot du \end{array}} \quad dv = du \\
 & \quad du = -2(u^2 + 1)^{-3} \cdot 2u \cdot du \quad v = u \\
 & \quad = \frac{u}{(u^2 + 1)^2} - \left[-4 \int_1^e \frac{u}{u^2 + 1} du \right] \quad \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du \\
 & \quad \boxed{\begin{array}{l} v = u^2 + 1 \\ dv = 2u \end{array}} \quad - \left\{ -4 \left[\frac{1}{2} \ln|u| \right] \right\} \\
 & \quad \cancel{\frac{d}{du} \cancel{(u^2 + 1)^2}} \quad \frac{d}{du} = 4u \quad + 4 \frac{1}{2} \ln|u| \\
 & \quad = \frac{u}{(u^2 + 1)^2} + 2 \ln \left| \frac{1}{(u^2 + 1)^2} \right| \Big|_1^e \\
 & \quad = \frac{\ln^3 x}{(\ln^2 x + 1)^2} + 2 \ln \left| \frac{\ln^2 x}{(\ln^6 x + 1)^2} \right| \Big|_1^e \\
 & \quad = \left\{ \frac{1}{2} + 2 \ln \left| \frac{1}{4} \right| \right\} - \left\{ \frac{0}{1} + 2 \ln \left| \frac{1}{1} \right| \right\} \\
 & \quad = \frac{1}{4} + 2 \ln \left| \frac{1}{4} \right| \quad \cancel{\times 8 \text{ pts}}
 \end{aligned}$$

Parte VI

Actividades especiales

Capítulo 26

Actividad de pts. Extra #1

David Corzo
20190432

Actividad especial:

$$A = 2 \int_0^1 x^{5/4} dx + 2 \int_1^4 \left(\frac{4-x}{3}\right)^{1/2} dx = \frac{28}{5}$$

$$A = 2 \left\{ \left[\frac{x^{5/4}}{\frac{5}{4}} \right] \right\}_0^1 + 2 \int_1^4 \left(\frac{4-x}{3} \right)^{1/2} dx$$

$$2 \left(\left\{ \frac{4}{5} (2)^{5/4} \right\} - \left\{ 0^{5/4} \right\} \right) = \begin{cases} u(4) = 0 \\ u(1) = 1 \\ u = \frac{4-x}{3} = \frac{4}{3} - \frac{x}{3} \\ du = -\frac{1}{3} dx \\ -3 du = dx \\ -3 du = dx \end{cases}$$

$$= 2 \left(\left\{ \frac{4}{5} - 0 \right\} \right) = 2 \left(\frac{4}{5} \right)$$

$$= \frac{8}{5}$$

$$= \frac{8}{5} + 4 = \frac{28}{5}$$

X \square

$$= 2 \int_0^1 \sqrt{u} \cdot -3 du =$$

$$= -6 \int_0^1 \sqrt{u} du$$


$$= 6 \int_0^1 \sqrt{u} du = 6 \left[\frac{2w^{3/2}}{3} \right]_0^1 =$$

$$= 6 \left(\left\{ \frac{2}{3} - 0 \right\} \right) = 6 \cdot \frac{2}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

Capítulo 27

Actividad de pts. Extra #2

David Gabriel 10/30/2018



Capítulo 28

Actividad de pts. Extra #3, problemas varios de integración

Problemas Variados de Integración

Problema 3: Encuentre las siguientes integrales.

a.) $\int \sqrt{64x} - \frac{1}{\sqrt{64x}} dx$

b.) $\int \left(\frac{7x^2}{7x^3 + 8} - \frac{x^3}{(x^4 + 8)^5} \right) dx$

c.) $\int \sqrt[3]{x} e^{\sqrt[3]{8x^4}} dx$

d.) $\int 5 \frac{(x^{1/3} + 2)^4}{x^{2/3}} dx$

e.) $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$

David Corzo
20190432

a) $\int \frac{1}{\sqrt{64x}} dx$ +10

$$\int \sqrt{64x} dx = \int \frac{1}{\sqrt{64x}} dx$$

$$u = 64x \quad du = 64 dx$$

$$\frac{du}{64} = dx$$

$$\int \sqrt{u} \frac{du}{64} = \int \frac{(64x)^{1/2+1}}{64} du$$

$$= 64 \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2}$$

$$= \left[\frac{64u^{3/2}}{3} \right] = 64 \cdot 2 \frac{u^{3/2}}{3}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{64x}} dx = \frac{1}{64} \int \frac{1}{\sqrt{u}} du$$

$$u = 64x \quad du = 64 dx$$

$$\frac{du}{64} = dx$$

$$\frac{\sqrt{64x}}{64} - \frac{64 \cdot 2 u^{3/2}}{3} + C$$

$$= \frac{\sqrt{64x}}{64} - \frac{64 \cdot 2 (64x)^{3/2}}{3} + C$$

b) $\int \left(\frac{7x^2}{7x^3 + 8} - \frac{x^3}{(x^4 + 8)^5} \right) dx$

$$u = 7x^3 + 8 \quad u = x^4 + 5$$

$$du = 7x^2 dx \quad du = x^3 dx$$

$$\int \frac{du}{u} - \int \frac{du}{u^5}$$

$$\left(\ln(u) \right) - \left(\frac{u^{-4}}{-4} \right) = \ln(u) + \frac{1}{4u^4} + C$$

$$= \ln(7x^3 + 8) + \frac{1}{4(x^4 + 8)^4} + C$$

$$\begin{aligned}
 c. \quad & \int \sqrt[3]{x} e^{\sqrt[3]{8x^4}} dx = \sqrt[3]{x} e^{\sqrt[3]{8x^4}} dx \\
 & u = 2(x)^{4/3} \quad = \frac{1}{2} \int e^u du \\
 & du = 2x^{1/3} dx \quad = \frac{1}{2} e^u + C \\
 & \frac{du}{2} = x^{1/3} dx \quad = \frac{1}{2} e^{\sqrt[3]{8x^4}} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d. \quad & \int 5 \frac{(x^{1/3} + 2)^4}{x^{2/3}} dx = 5 \int (x^{1/3} + 2)^4 x^{-2/3} dx \\
 & u = x^{1/3} + 2 \quad = 5 \int u^4 \cdot du \\
 & du = x^{-2/3} dx \quad = \frac{5}{8} u^5 = \frac{(x^{1/3} + 2)^5}{8} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 e) \quad & \int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln(u) \\
 & u = e^x + e^{-x} \quad = \ln(e^x + e^{-x}) + C
 \end{aligned}$$

Parte VII

Documentos de Apoyo

Capítulo 29

Identidades trigonométricas

Identidades Trigonométricas

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x &= 1 \\ \tan^2 x + 1 &= \sec^2 x \\ \cot^2 x + 1 &= \csc^2 x \\ \sec^2 x - 1 &= \tan^2 x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} 2x &= 2 \operatorname{sen} x \cos x \\ \cos 2x &= \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x \\ \operatorname{sen}^2 x &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \\ \cos^2 x &= \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)\end{aligned}$$

Técnicas de Integración

- 5.5 Regla de la Sustitución

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$$

- 7.1 Integración por Partes

$$\int u dv = uv - \int v du$$

- 7.2 Integración Trigonométrica

a. **Potencias Impares de Seno o Coseno:** Aparte un término $\operatorname{sen} x$ o $\cos x$ y utilice la identidad $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.

b. **Potencias Pares de Seno o Coseno:** Utilice la identidad

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \quad y/o \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x).$$

c. **Potencia Par de tangente:** Aparte $\sec^2 x$ y use $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$.

d. **Potencia Impar de tangente:** Aparte $\sec x \tan x$ y use $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

e. **Potencia Par de cosecante:** Aparte $\csc^2 x$ y use $\csc^2 x = \cot^2 x + 1$.

f. **Potencia Impar de cotangente:** Aparte $\cot x \tan x$ y use $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$

g. **Productos $\operatorname{sen}(mx)$ y $\cos(nx)$:** Utilice la identidad trigonométrica adecuada.

$$\operatorname{sen} A \cos B = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(A - B) + \operatorname{sen}(A + B)]$$

$$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

- 7.3 Sustitución Trigonométrica

a. $x = a \operatorname{sen} \theta$ sustituye $a^2 - u^2$ por $a^2 \cos^2 \theta$ y $dx = a \cos \theta d\theta$.

b. $x = a \tan \theta$ sustituye $a^2 + u^2$ por $a^2 \sec^2 \theta$ y $dx = a \sec^2 \theta d\theta$.

c. $x = a \sec \theta$ sustituye $u^2 - a^2$ por $a^2 \tan^2 \theta$ y $dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta$.

d. Hay otros casos que requieren el trazo de un triángulo apropiado.

Capítulo 30

Integrales indefinidas básicas

Integrales Indefinidas Básicas

$$\int af(x) dx = a \int f(x) dx$$

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = \ln|\sec x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc x dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{\ln|\sec + \tan x| + \sec x \tan x}{2} + C$$

$$\int \csc^3 x dx = -\frac{\ln|\csc + \cot x| + \csc x \cot x}{2} + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \operatorname{senh} x dx = \cosh x + C$$

$$\int \cosh x dx = \operatorname{senh} x + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 x dx = \tanh x + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 x dx = -\coth x + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \tanh x dx = -\operatorname{sech} x + C$$

$$\int \operatorname{csch} x \coth x dx = -\operatorname{csch} x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1}(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sin^{-1}(x) + C$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \frac{1}{a} \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{-1}{1+x^2} dx = \cot^{-1}(x) + C$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \sec^{-1}(x) + C$$

Capítulo 31

Teorema fundamental del cálculo

Teorema Fundamental del Cálculo Generalizado

Evalué la siguiente expresión, integrando y luego derivando:

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{x^3}^{x^5} e^y dy \right) = \frac{d}{dx} (e^{x^5} - e^{x^3}) = \underbrace{5x^4}_{b'(x)} \underbrace{e^{x^5}}_{e^{b(x)}} - \underbrace{3x^2}_{a'(x)} \underbrace{e^{x^3}}_{e^{a(x)}}$$

En este problema ambos límites de integración dependen de x y en la respuesta final se utilizaron dos reglas de la cadena por separado.

El último ejemplo nos indica como el uso del TFC y la regla de la cadena se puede extender para funciones donde los dos límites de integración dependen de x .

Use regla de la cadena para el límite superior $b(x)$ y para el límite inferior $a(x)$

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{a(x)}^{b(x)} F(t) dt \right) = F(b(x)) b'(x) - F(a(x)) a'(x)$$

Ejercicio 3: Evalué las siguientes expresiones

a. $\frac{d}{dx} \left(\int_{\sin x}^{e^x} \sqrt[4]{10 + 4t^4} dt \right) = \sqrt[4]{10 + 4e^{4x}} e^x - \sqrt[4]{10 + 4\sin^4(x)} \cos x$

b. $\frac{d}{dx} \left(\int_{1/x}^{\ln x} \cosh \theta^3 d\theta \right) = \cosh(\ln^3 x) \frac{1}{x} + \cosh(x^{-3}) \frac{1}{x^2}$

Ejercicio 4: Encuentre la ecuación de la recta tangente a $y = f(x)$ en $x = 0$.

a. $f(x) = \int_0^x e^{-t^2/2} dt.$

Coordenada-y:	$f(0) = \int_0^0 e^{-t^2/2} dt = 0$
Derivada:	$f'(x) = e^{-x^2/2}$
Pendiente:	$f'(0) = e^{-0/2} = 1$
Recta Tangente:	$y = f(0) + f'(0)(x - 0) = x$

b. $f(x) = \int_0^x \cosh^2 t dt.$

Coordenada-y:	$f(0) = \int_0^0 \cosh^2 t dt = 0$
Derivada:	$f'(x) = \cosh^2 x$
Pendiente:	$f'(0) = (\cosh 0)^2 = 1$
Recta Tangente:	$y = f(0) + f'(0)(x - 0) = x$

Parte VIII

**Notas de prueba de DM para entrada
a la UFM, pts.extra en Cálculo
Integral**

$$\textcircled{1} \quad 16 - 2 * 4 + 3 * 6 \div 3^2 + 10^2 \div 5^2 - 4 * 3 + 8$$

$$16 - 2 * 4 + 3 * 6 \div 9 + 100 \div 25 - 4 * 3 + 8$$

$$16 - 8 + 18 \div 9 + 100 \div 25 - 12 + 8$$

$$16 - 8 + 9 + 4 - 12 + 8$$

$$16 - 8 + 13 - 12 + 8$$

$$8 + 1 + 8$$

$$16 + 1$$

$$\frac{17}{x}$$

Parenthesis
 Exponent
 Multi.
 Division
 Addition
 Subtraction

$$\textcircled{2} \quad -2^3 + 6^2 * 3^2 + 8 * 6 + 34 \div 2$$

$$-8 + 36 * 9 + 8 * 6 + 34 \div 2$$

$$-8 + 324 + 48 + 34 \div 2$$

$$-8 + 324 + 48 + 17$$

$$+ 316 + 48 + 17$$

$$325 + 65$$

$$\frac{381}{\cancel{381}}$$

$$\overline{3 \mid 341}$$

$$\begin{array}{r} 78 \\ \times 2 \\ \hline 156 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ + 8 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ + 17 \\ \hline 34 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 36 \\ \times 9 \\ \hline 324 \end{array} \quad \begin{array}{r} 36 \\ 9 + 9 + 9 \\ \hline 27 \\ 54 \end{array}$$

$$\textcircled{3} \quad [24 - (3 - 5)^3] \div [(8 - 3) \div 5 + 7]$$

$$[24 - (-2)^3] \div [5 \div 5 + 7]$$

$$[24 - (-8)] \div [5 \div 5 + 7]$$

$$[24 + 8] \div [1 + 7]$$

$$[32] \div [8] = \frac{32}{8} = \underline{\underline{4}}$$

$$8 + 8 = 16 + 8 = 24 + 8 = 32$$

Paren
 Expon
 Mult.
 Divis
 Add
 Sub

$$\textcircled{4} \quad (8 + 6\sqrt{25} - 4*2^2) - (3*6 \div \sqrt{36})$$

$$(8 + 6\sqrt{25} - 4*4) - (3*6 \div \sqrt{36})$$

$$(8 + 6*5 - 4*4) - (3*6 \div \sqrt{36})$$

$$(8 + 30 - 16) - (18 \div 6)$$

$$(38 - 16) - (3)$$

$$38 - 16 = 22 - 3 = 22$$

$$\textcircled{5} \quad 22 - 3$$

$$\frac{19}{\cancel{+}}$$

\textcircled{5}

$$\left[\begin{array}{c} \frac{1}{3} \\ \hline \frac{1}{2} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \frac{2}{5} \\ \hline \frac{1}{4} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \frac{3}{8} \\ \hline \frac{1}{4} \end{array} \right] = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} - \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}}$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{2}{10} - \frac{3}{16}$$

$$\frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\underline{10 \cdot 16 + 2 \cdot 12 \cdot 16 - 3 \cdot 12 \cdot 10}$$

$$\underline{12 \cdot 10 \cdot 16}$$

$$\frac{1}{8}$$

$$\underline{160 + 192 - 360}$$

$$\frac{1}{8}$$

$$\underline{\frac{-8}{\frac{1}{8}}} = -64$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 16 \\ \hline 60 \\ 10 \\ \hline 160 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \\ 16 \\ \hline 72 \\ 12 \\ \hline 192 \end{array} \quad \begin{array}{r} 120 \\ 3 \\ \hline 360 \end{array} \quad \begin{array}{r} 160 \\ 192 \\ \hline 352 \end{array}$$

$$\textcircled{6} \quad \left(21 \cdot \frac{3}{4} \right) \div \left(4 \cdot \frac{2}{3} - 2 \right)$$

$$\frac{4 \cdot 21}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{4 \cdot 21 - 3}{4} = \frac{81}{4}$$

$$\frac{\frac{2}{3}}{3} = \frac{2 \cdot 3}{3}$$

$$\frac{8 - 2 \cdot 3}{3} = \frac{8 - 6}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{21}{4} = \frac{81}{84}$$

$$\frac{81}{84} - 3 = 81$$

$$\left(\frac{81}{4} \right) \div \frac{2}{3} = \left[\frac{\frac{81}{4}}{\frac{2}{3}} \right] = \frac{81 \cdot 3}{8}$$

$$\frac{81}{24} = \frac{27}{8}$$

$$\textcircled{7} \quad (2x^2 + 50x - 5) - (8x^2 - 5x + 6x^3)$$

$$2x^2 + 50x - 5 - 8x^2 + 5x - 6x^3$$

$$-6x^3 - 6x^2 + 55x - 5 =$$

$$\textcircled{7} \quad 8x^3 - 3x^4 + 5x + 2 + 2x + 2x^4 - 3x^3 + 3$$

$$= 8x^3 - 3x^3 - 3x^4 + 2x^4 + 5x + 2x + 2 + 3$$

$$= 5x^3 - 1x^4 + 7x + 5$$

$$= -x^4 + 5x^3 + 7x + 5$$

$$\textcircled{8} \quad 2x^2 + 50x - 5 - 8x^2 + 8x - 6x^3$$

$$-6x^2 + 55x - 5 - 6x^3$$

$$-6x^3 - 6x^2 + \underline{55x - 5} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{9} \quad (7a^2 + 8ab - 2b^2) - [(6a^2 - 4ab + 6) + (3a^2 + 8ab - b^2)]$$

$$7a^2 + 8ab - 2b^2 - 6a^2 + 4ab - 6 - 3a^2 - 8ab + b^2$$

$$(7a^2 - 6a^2 - 3a^2) + (8ab + 4ab - 8ab) + (-2b^2 + b^2)$$

$$a^2 - 3a^2 + -1b^2$$

$$(-2a^2) + (4ab) - b^2 - 6$$

$$\underline{\hspace{10em}} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{10} \quad (8x - 7x^3 + 3) - (3x^2 - 8x + 2) + (-2x^3 - 4x^2 + 2x)$$

$$8x - 7x^3 + 3 - 3x^2 + 8x - 2 - 2x^3 - 4x^2 + 2x$$

$$18x - 9x^3 - 9x^2 + 3 - 2$$

$$-9x^3 - 9x^2 + 18x + 1$$

$$\underline{\hspace{10em}} \quad \checkmark$$

$$8x - 7x^3 + 3 - 3x^2 + 8x - 2 - 2x^3 - 4x^2 + 2x$$

$$-7x^3 - 2x^3 - 3x^2 - 4x^2 + 8x + 8x + 2x + 3 - 2$$

$$-9x^3 - 7x^2 + 18x + 1$$

$$\underline{\hspace{10em}} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{25} \quad \frac{(x-6)(x+6)}{(x+6)(x+3)} = \frac{x-6}{x+3}$$

$$\textcircled{24} \quad \frac{x^2 - 8x + 15}{3-x} =$$

$$= \frac{(x-5)(x-3)}{(3-x)} \quad \underline{-x+3} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{23} \quad \frac{3x+1}{5} + \frac{2-5x}{6} = \frac{6(3x+1) + 5(2-5x)}{5 \cdot 6} =$$

$$\frac{18x+6+10-25x}{30} = \frac{-7x+16}{30}$$

$$\textcircled{22} \quad \frac{2x}{x^2-4} + \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x+2} = \frac{2x+x+2+2x-4}{(x+2)(x-2)}$$

$$\frac{4x+x-2}{(x+2)(x-2)} = \frac{5x-2}{(x+2)(x-2)}$$

$$\textcircled{21} \quad \frac{(x+1)(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{(y+1)}{(x-1)} \div \frac{y^3-1}{y-1}$$

$$= \left[\frac{\frac{x+1}{x-1}}{\frac{y^3-1}{y-1}} \right] = \frac{(y-1)(\cancel{y+1})}{(\cancel{y+1})(x^3-1)}$$

$$\frac{x+1}{x^3-1}$$

$$\textcircled{11} \quad 16x^3 - 6x^2 + 12x - 72x^2 + 27x - 54$$

$$16x^3 - 78x^2 + 39x - 54$$

$$\textcircled{12} \quad (16x - y)(4x + y)$$

$$64x^2 - 4xy + 16xy - y^2$$

$$64x^2 + 12xy - y^2$$

$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$

$$\textcircled{13} \quad (y^3 - 3)^2$$

$$y^6 - 2y^3 \cdot 3 + 9$$

$$y^6 - 6y^3 + 9$$

$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$

$$\textcircled{14} \quad (4x^2 + 6y^4)^3$$

$$64x^6 + 3x$$

$$\textcircled{15} \quad \frac{-27y^3z^3 - 15y^6z^2}{3y^2z}$$

$$\frac{3y^2z(9y^4z^2 - 5y^4z)}{3y^2z}$$

$$\textcircled{17} \quad -8y^4 + 12y^3 - 16y^2 + 4y$$

$$-4y(2y^2 - 3y^2 + 4y - 1)$$

$$\textcircled{18} \quad a^x(a^2 - 3a + 10)$$

Parte IX

Honores del curso

Capítulo 32

Agradecimientos por programa en Python

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los siguientes estudiantes por sus observaciones y correcciones a la presente edición, en particular a la Tabla de Antiderivadas.

- Erick Eduardo Ramírez Rodríguez
- Daniela María Liu Orellana
- Luis Pedro Zenteno Cojulún
- Diego Antonio Benito Calvo
- César Emilio López Domínguez
- Daniel Arturo López Sánchez

Un agradecimiento especial a David Gabriel Corzo Mcmath y a Steven Nathaniel Wilson Nuñez por desarrollar un programa en Python que aproxima el área de una región bajo la curva de una función y encima del x y mejora la aproximación utilizando más rectángulos.