

# Estadistica I

David Gabriel Corzo Mcmath

2020-Jan-07 11:57:29



# Índice general

<b>1. Clase introductoria</b>	<b>5</b>
1.1. Clase introductoria . . . . .	5
<b>2. Clase - 2020-01-09</b>	<b>7</b>
2.1. Notas . . . . .	7
2.2. Audit.xlsx . . . . .	7
<b>3. Clase - 2020-01-14</b>	<b>9</b>
3.1. Pasos de ordenamiento en Excel . . . . .	9
3.2. Medidas de localización o tendencia central . . . . .	9
3.2.1. Media: . . . . .	9
3.2.2. Mediana: . . . . .	9
3.2.3. Moda: . . . . .	10
3.2.4. Percentiles: . . . . .	10
3.2.5. Cuartiles: . . . . .	10
3.2.6. Observaciones . . . . .	10
<b>4. Clase - 2020-01-16</b>	<b>11</b>
4.1. Dudas . . . . .	11
4.2. Medidas de localización . . . . .	11
4.3. Medidas de variabilidad . . . . .	11
4.3.1. Rango . . . . .	11
4.3.2. Varianza muestral: . . . . .	11
4.3.3. Desviación estándar . . . . .	12
4.4. Excel . . . . .	12
4.5. Ejemplo . . . . .	12



# Capítulo 1

## Clase introductoria

### 1.1. Clase introductoria

- Hay dos tipos de datos en estadística;
  1. Cualitativo: el cualitativo es por
  2. Cuantitativo:
- Distribución de frecuencias: nos dice qué tan frecuente es la distribución de los datos en un set.



# Capítulo 2

## Clase - 2020-01-09

### 2.1. Notas

- Tabla de frecuencias: Con todos los datos, la suma de todo es lo que se pone.
- Tabla de frecuencias relativas: cuando la suma de todo es uno.
- Tabla de frecuencias porcentual: cuando la suma de todo es 100 %.

### 2.2. Audit.xlsx

- Las diferentes categorías que se agrupan se les da el nombre de clase, mientras más peculiaridades se tengan por clase se tendrán más clases.
- La cantidad total de datos  $\equiv$  número de observaciones.
- El número de observaciones se le llama “n”.
- Si queremos 5 clases cada clase debe de tener el mismo ancho, esta para dar uniformidad a todos los intervalos para “comparar peras con peras”.
- Al ancho de clase que salga de la fórmula hay **que redondearlo para arriba**.
- Los histogramas:
  - Sólo se pueden hacer para variables cuantitativas, para números.
  - Cuando en el eje-x están intervalos son números.
  - Las barras estarán pegadas sin ningún gap entre ellas.
  - Son números enteros osea **discretos**.
  - En Excel: Seleccionar una barra  $\rightarrow$  click derecho  $\rightarrow$  Dar formato de serie de datos  $\rightarrow$  Ancho de rango  $\rightarrow$  bajarlo a 0 %.



# Capítulo 3

## Clase - 2020-01-14

### 3.1. Pasos de ordenamiento en Excel

- ↓ Seleccionar todos los datos
- ↓ Orden personalizado
- ↓ Advertencia antes de ordenad → Ampliar la selección → ordenar
- ↓ Ordenar por → Valores de celda → A a Z

### 3.2. Medidas de localización o tendencia central

#### 3.2.1. Media:

- La media aritmética
- La media ponderada
- La notación que se utilizará sera x-barra:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i)}{n} = \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)}{n}$$

- $n$  siendo el número de observaciones.

*Definición de “media”:* es un número.

- Cuando se agregan valores abnormales al promedio hace un cambio para arriba o para abajo que es significativo.

#### 3.2.2. Mediana:

- Es un dato que denota cuánto mide la persona que está cabal en medio.
- Es el valor que parte a la mitad todos los datos.
- Cuando hay una cantidad impar va a haber uno, cuando es par pueden haber dos.
- La mediana no se ve afectada por los valores que están debajo de ella ni arriba de ella.
- 

$$\text{Mediana} = \frac{n}{2}$$

- Los datos de la media tienen que estar en orden ascendente para poder calcularse.
- El número que salga de mediana se usa la parte entera como límite inferior y el número redondeado para arriba es el límite superior, en los números pares.
- Si el valor es un número impar se agarra el del medio, si el valor es un numero par se agarra el de floor(enmedio) y el roundedUp(floor(enmedio)).

### 3.2.3. Moda:

- Es el número que más se repite en un set de datos.
- No hay fórmula.

### 3.2.4. Percentiles:

- Es un número que nos dice qué porcentaje de los datos esta debajo de él.
- La mediana es igual al percentil 50.
- Es el límite superior en el cual el porcentaje dicta, el percentil 20 se interpreta como el 20 % de datos están debajo de él.
- Percentil:

$$i = \left( \frac{p}{100} \right) \times n$$

donde  $p$  es percentil deseado, e  $i$  es el índice.




Figura 3.1:

### 3.2.5. Cuartiles:

- El cuartil son percentiles partidos en cuatro a lo largo del numero 1-100.
- **Ejemplo:** El percentil 25 % es el primer cuartil, el 50 % es el segundo cuartil, etcétera.

### 3.2.6. Observaciones

- $\text{Media} < \text{Mediana} < \text{Moda}$ 
  - Posiblemente hay más personas de baja estatura, por la media ser menor a la mediana.
- $\text{Media} > \text{Mediana} > \text{Moda}$

# Capítulo 4

## Clase - 2020-01-16

### 4.1. Dudas

- **Nos preguntamos:** ¿cuál es la diferencia entre población y muestra?
  - Las muestras son parciales, la población es el total.
  - Población es el concepto de todo lo que existe, existe y va a existir en algún predeterminado lugar.

### 4.2. Medidas de localización

- Las medidas de localización dan una idea de lo que está pasando en un set de observaciones.

### 4.3. Medidas de variabilidad

#### 4.3.1. Rango

Problemas de la media & solución es es la introducción del **rango**.

Figura 4.1: Misma media, diferente rango de datos

- Los datos están confusos ya que a pesar de tener la misma media los datos varían.
- Entonces se introduce el rango que se calcula como:

$$\text{Rango} = \text{Máximo} + \text{Mín}$$

#### Rango intercuartílico

La diferencia entre el cuartil tres y el cuartil uno.

$$R_{\text{Intercuartílico}} = Q_3 - Q_1$$

Entre  $Q_3$  y el  $Q_1$ , **Nos preguntamos:** ¿qué diferencias hay? es el 50 % de todos los que se parecen entre sí.

#### 4.3.2. Varianza muestral:

- **Definición de “Varianza Muestral”:** cuánto varian en promedio los datos respecto a la media.
- Se denota por una  $S^2$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})}{n - 1}$$

- Este en el ejemplo esta expresado en centímetros<sup>2</sup>.

#### 4.3.3. Desviación estándar

- Definición de “Desviación estándar”:** cuánto varían los datos respecto a la media.
- Es la raíz cuadrada de la varianza, se denota por solo  $S$ .
- 
- 
- $$\sqrt{S^2} = S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})}{n - 1}}$$
- En el ejemplo que tenemos está expresado en centímetros.
- Desviación estándar significa que en promedio los datos difieren respecto a la media.
- Cuando hay una desviación estándar está alta nos dice qué tanto se parecen los datos, qué tan variable es el grupo de datos.
- DE: 15 respecto a otra de DV:7, dice que hay más variación en la desviación estándar de 15.

#### 4.4. Excel

- Para fijar una celda usar la letra de la columna encerrada por signos de dólar, así: \$E\$56
- Para desviación estándar usar fórmula: =DESVEST.M(¡TodosLosDatosOriginales¡) .

#### 4.5. Ejemplo




Figura 4.2: Niveles de IQ entre hombres y mujeres

- Las deducciones son que los hombres tienen una desviación estándar mayor.