

Material de apoyo - Cálculo Multivariable

David Gabriel Corzo Mcmath

2020-01-06

Índice general

I Exámenes Cortos	5
1. Examen corto #01	7
2. Examen corto #03	9
II Material y documentos de apoyo	11
3. Material o documento de apoyo #Cr	13
III Laboratorios	19
4. Laboratorio #01	21
5. Laboratorio #01	23
IV Tareas	31
6. Trabajos #02	33
7. Trabajos #02	35
8. Trabajos #03	49
9. Trabajos #03	51
10. Trabajos #04	63
11. Trabajos #04	65
12. Trabajos #05	79
13. Trabajos #05	81
14. Trabajos #06	91
15. Trabajos #06	93
16. Trabajos #08	105

Índice general

Parte I

Examenes Cortos

Capítulo 1

Examen corto #01

Corto #1 Cálculo Multivariable (20 min)

Nombre: David Corzo Carnet: 20190432

Resuelva las siguientes problemas:

1. (50 pts.) Halle la ecuación de la esfera con centro $(3, -6, 4)$ y radio 5.
¿Cuál es la intersección de esta esfera con el plano xz ?

Ecuación:

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y+6)^2 + (z-4)^2} = 10$$


Se asume $y = 0$;

$$\sqrt{(x-3)^2 + (z-4)^2 + (6)^2} = 10$$

$$(x-3)^2 + (z-4)^2 + 36 = 10^2$$


$$(x-3)^2 + (z-4)^2 = 100 - 36$$

Intersección: $(x-3)^2 + (z-4)^2 = 64$



2. (50 pts.) Determine la distancia mínima del punto $(4, -2, 6)$ al plano xz .

La distancia mínima
es 2.



100/100

Capítulo2

Examen corto #03

Parte II

Material y documentos de apoyo

Capítulo3

Material o documento de apoyo #Cr

CÁLCULO MULTIVARIABLE 1er Semestre 2020

1. Información General del Curso

Libro de Texto:

- Stewart, James. [Cálculo. Trascendentes Tempranas](#). Octava Edición. Cengage Learning. México, 2013.
ISBN: 978-607-526-548-3
- Ketelaar, Christiaan. [Cálculo Multivariable. Cuaderno de Trabajo](#). Editorial Arjé. 2018.
ISBN: 978-1720958307.
- Cualquier otro texto de Cálculo (Leithold, Thomas y Anton) se puede utilizar como texto de apoyo.

Requisito: Cálculo Integral

Se recomienda utilizar una calculadora ó un software como Desmos o Geogebra para realizar ejercicios y laboratorios.

2. Descripción del Curso

El curso comprende cuatro unidades: en la primera se abordan los vectores y la geometría del espacio; en la segunda se tratan las funciones vectoriales, la tercera es acerca de las derivadas parciales y sus aplicaciones; por último, la cuarta unidad comprende las integrales múltiples y sus diversas aplicaciones. Para lograr comprender estos temas, es necesario que el estudiante comprenda los temas de Cálculo Diferencial e Integral.

Este curso está organizado en línea por medio de la plataforma MiU. En esta plataforma voy a hacer anuncios, mantener comunicación electrónica y publicar materiales del curso como notas de clase, laboratorios, soluciones de exámenes, etc.

3. Objetivos

Objetivo General: Proporcionar al estudiante una sólida base conceptual y práctica en el cálculo multivariante que le permita profundizar en las áreas de su competencia y estar capacitado para abordar áreas afines.

Objetivos Específicos

- Entender el concepto de un vector, operaciones vectoriales y aplicaciones de los vectores.
- Conocer y resolver problemas que involucren funciones vectoriales.
- Conocer el concepto de derivadas parciales y aplicarlas para resolver problemas aplicados a la ingeniería.
- Resolver problemas de optimización de varias variables y con restricciones.
- Conocer el concepto de integrales múltiples y aplicarlas en diversos contextos de ingeniería.

6. Políticas del Curso

- **Cambio de Fechas:** Cualquier cambio a las fechas y contenidos de los exámenes será notificada por escrito por parte del catedrático.
- **Exámenes Cortos o Laboratorios:** No habrá reposición de exámenes cortos o laboratorios en caso el estudiante se ausente estos días.
- **Exámenes Extemporáneos:** En caso de una ausencia a un examen parcial o final, ésta deberá ser debidamente justificada por el estudiante y el estudiante deberá solicitar un examen extemporáneo en la Facultad de Ciencias Económicas. Posteriormente el estudiante y el catedrático deberán acordar una fecha para realizar el examen extemporáneo.
- **Derecho a Examen Final:** Para tener derecho a examen final el estudiante deberá tener una zona de por lo menos 41 puntos.
- **Exoneración de Examen Final:** Para que un estudiante sea exonerado del examen final debe tener una zona mayor o igual a 74 puntos (no se redondearán zonas entre 73.5 y 73.9 puntos), ó de 70 pts si su zona es de 75 pts.. La exoneración consistirá en una nota de examen final correspondiente a 18 puntos. En caso un estudiante exonerado quiera optar a un punteo mayor en el examen final, puedo realizarlo pero pierde el derecho de exoneración al entregar el examen final).
- **Aprobación del Curso:** Para aprobar el curso el estudiante deberá tener una nota final mayor a igual a 61 puntos (no se redondearán notas finales entre 60.5 y 60.9 puntos). Una vez publicadas las notas finales, el estudiante puede solicitar una revisión de examen final en la Facultad de Ciencias Económicas.
- Puede haber algunos temas que el catedrático pueda asignar para que sean estudiados por cuenta del estudiante, dicho material también se evaluará.

El programa de este curso está sujeto a cambios.

Parte III

Laboratorios

Capítulo 4

Laboratorio #01

Laboratorio #1 Cálculo Multivariable

Entrega, jueves 16 de enero

Nombre: _____ Carnet: _____

Tema:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos:	20	20	20	20	10	10	10	110
Nota:								

Resuelva las siguientes ejercicios:

1. (20 pts.) Determine la distancia del punto $(4, -2, 6)$ al eje x
2. (20 pts.) Halle la ecuación de la esfera con centro $(-3, 2, 5)$ y radio 4.
¿Cuál es la intersección de esta esfera con el plano yz ?
3. (20 pts.) Encuentre el radio y centro de la esfera cuya ecuación es $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 8z = 15$.
4. (20 pts.) Halle la longitud de los lados del triángulo $P(3, -2, -3), Q(7, 0, 1), R(1, 2, 1)$.
¿Es un triángulo isósceles? ¿Es un triángulo rectángulo? Utilice el Teorema de Pitágoras.
5. (10 pts.) Describa y bosqueje la superficie en R^3 representada por la ecuación $x + y = 2$.
6. (10 pts.) Describa y bosqueje la superficie en R^3 representada por la ecuación $2z = 8 - 4x$.
7. (10 pts.) **BONO:**
Encuentre la ecuación de la esfera con centro $(2, -3, 6)$ que toca el plano x .

Capítulo 5

Laboratorio #01


LABORATORIO #01

Wednesday, January 15, 2020


13:03

DAVID CORZO 20190432

1) Punto $(4, -2, 6)$ al eje x :



- 2) Ecuación de la esfera con centro $(-3, 2, 5)$ & radio 4. Intersección de la esfera con el plano yz .



$$\begin{aligned} r^2 &= (x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 \\ &= \sqrt{(x - (-3))^2 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2} \\ &= \sqrt{(x + 3)^2 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2} \end{aligned}$$

$$4 = \sqrt{(x + 3)^2 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2}$$

Se asume $x = 0$

$$(4)^2 = \left(\sqrt{(0 + 3)^2 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2} \right)^2$$

$$16 = 9 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2$$

$$16 - 9 = (y - 2)^2 + (z - 5)^2$$

$$7 = (y - 2)^2 + (z - 5)^2$$

Queda la ecuación de un círculo correspondiente a el círculo que deja la esfera en el plano yz .

3) Encuentre el radio y centro de la esfera cuya ec. es $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 8z = 15$.

$$x: \left(\frac{-2}{2}\right)^2 = 1$$

$$y: \left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4$$

$$z: \left(\frac{8}{2}\right)^2 = 16$$

$$[x^2 - 2x + 1] + [y^2 - 4y + 4] + [z^2 + 8z + 16] = 21 + 15$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2 = 36$$


$$\sqrt{(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2} = 6$$

radio: 6

centro: (1, 2, -4)

- 4) Longitud de los lados del triángulo $P(3, -2, -3)$, $Q(7, 0, 1)$, $R(1, 2, 1)$. ¿Isóceles, triángulo rectángulo?

$$|P_A \& P_B| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$



$$\begin{aligned} |P_P P_Q| &= \sqrt{(3 - 7)^2 + (-2 - 0)^2 + (-3 - 1)^2} \\ &= \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{16 + 4 + 16} \\ &= \sqrt{36} = 6 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} |P_Q P_R| &= \sqrt{(7 - 1)^2 + (0 - 2)^2 + (1 - 1)^2} \\ &= \sqrt{(6)^2 + (-2)^2 + (0)^2} = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |P_R P_P| &= \sqrt{(1 - 3)^2 + (2 + 2)^2 + (1 + 3)^2} \\ &= \sqrt{(2)^2 + (4)^2 + (4)^2} = \sqrt{4 + 16 + 16} = \sqrt{36} = 6 \end{aligned}$$

5) Describa & por que la superficie en \mathbb{R}^3 representada por la ecuación $x + y = 2$

$$x = 2 - y ; \quad y = 2 - x$$

$$x + y + 0z = 2$$



6) Describa y bosqueje la superficie \mathbb{R}^3 representada por la ecuación $zz = 8 - 4x$

$$\text{I; } x = 0$$

$$\text{I; } z = 0$$

$$zz - 8 = 0$$

$$0 = 8 - 4x$$


$$z = \frac{+8}{2}$$

$$-8 = -4x$$


$$z = +4$$

$$\frac{-8}{-4} = x$$

$$x = 2$$



7) Bono: Da ecuación de la esfera con centro $(2, -3, 6)$ que toca el plano xy .



El radio es 6.

$$6 = \sqrt{(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-6)^2}$$

Parte IV

Tareas

Capítulo 6

Trabajos #02

Capítulo 7

Trabajos #02

Tarea #2

David Gabriel Corzo Mcmath - 20190432
Cálculo Multivariable

1) Vectors:

$$a = \langle 5, -12, 0 \rangle$$

$$b = \langle 0, -3, -6 \rangle$$

$$c = \langle 1, 0, 2 \rangle$$

$$2b = \langle 0, -6, -12 \rangle$$

$$a + 2(b + c) - (a - 2b) =$$

$$= a + 2[(0+1), (-3+0), (-6+2)] - [(5-0), (-12+6), (0+12)]$$

$$= a + 2 \langle 1, -3, -4 \rangle - \langle 5, -6, 12 \rangle$$

$$= a + \langle 2, -6, -8 \rangle - \langle 5, -6, 12 \rangle$$

$$= a + \langle (2-5), (-6+6), (-8-12) \rangle$$

$$= a + \langle -3, 0, -20 \rangle$$

$$= \langle 5, -12, 0 \rangle + \langle -3, 0, -20 \rangle$$

$$= \langle (5-3), (-12+0), (0-20) \rangle$$

$$= \langle 2, -12, -20 \rangle$$

$$b) 2a \cdot (3b + 4c) - 2c \cdot (4a + 0b)$$

$$2a = \langle 10, -24, 0 \rangle$$

$$4a = \langle 20, -48, 0 \rangle$$

$$3b = \langle 0, -9, -24 \rangle$$

$$0b = \langle 0, 0, 0 \rangle$$

$$2c = \langle 2, 0, 4 \rangle$$

Sacar nuevos vectores

$$4c = \langle 4, 0, 8 \rangle$$

$$= 2a \cdot \langle (0+4), (-9+0), (-24+8) \rangle - 2c \cdot \langle (20+0), (-48+0), (0+0) \rangle$$

$$= 2a \cdot \langle 4, -9, -16 \rangle - 2c \cdot \langle 20, -48, 0 \rangle$$

$$= \langle (10 \cdot 4), (-24 \cdot -9), (0 \cdot -16) \rangle - \langle (2 \cdot 20), (0 \cdot -48), (4 \cdot 0) \rangle$$

$$= \langle 40, 216, 0 \rangle - \langle 40, 0, 0 \rangle$$

$$= \langle (40 - 40), (216 - 0), (0, 0) \rangle$$

$$= \langle 0, 216, 0 \rangle$$

$$c) |a + c - (a + b)| =$$

$$a = \langle 5, -12, 0 \rangle \quad b = \langle 0, -3, -6 \rangle \quad c = \langle 1, 0, 2 \rangle$$

$$\begin{aligned}
 &= \left| \langle (5+1), (-12+0), (0+2) \rangle - \langle (5+0), (-12-3), (0-6) \rangle \right| \\
 &= \left| \langle 6, -12, 2 \rangle - \langle 5, -15, -6 \rangle \right| \quad \Rightarrow = \sqrt{1+9+64} \\
 &= \left| \langle (6-5), (-12+15), (2+6) \rangle \right| \quad = \sqrt{74} \\
 &= \left| \langle 1, 3, 8 \rangle \right| \quad \Rightarrow \sqrt{(1)^2 + (3)^2 + (8)^2}
 \end{aligned}$$

$$d) |a + c| - |a + b|$$

$$\begin{aligned}
 &= \left| \langle (5+1), (-12+0), (0+2) \rangle \right| - \left| \langle (5+0), (-12-3), (0-6) \rangle \right| \\
 &= \left| \langle 6, -12, 2 \rangle \right| - \left| \langle 5, -15, -6 \rangle \right| \\
 &= \sqrt{6^2 + (-12)^2 + 2^2} - \sqrt{5^2 + (-15)^2 + (-6)^2} \\
 &= \sqrt{36 + 144 + 4} - \sqrt{25 + 225 + 36} \\
 &= \sqrt{184} - \sqrt{286} \quad \# \cos \theta = \frac{A \cdot B}{|A||B|}
 \end{aligned}$$

2) Misma dirección que el vector $\langle -3, 4, 6, -8 \rangle$

$$= |\langle -3, 4, 6, -8 \rangle|$$

Calcular magnitud

$$= \sqrt{(-3)^2 + (4)^2 + (6)^2 + (-8)^2}$$

$$= \sqrt{9 + 16 + 36 + 64}$$

$$= \sqrt{125}$$

Entonces ...

$$\left| \left\langle -\frac{3}{\sqrt{125}}, \frac{4}{\sqrt{125}}, \frac{6}{\sqrt{125}}, -\frac{8}{\sqrt{125}} \right\rangle \right| = 1$$

Comprobar ...

$$= \sqrt{\frac{9}{125} + \frac{16}{125} + \frac{36}{125} + \frac{64}{125}} = \sqrt{1} = 1$$

3) Encuentre el ángulo de los vectores

a) $a = \langle 3, 0 \rangle, b = \langle 5, 5 \rangle$

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{\langle (3 \cdot 5), (0 \cdot 5) \rangle}{|\langle 3, 0 \rangle| |\langle 5, 5 \rangle|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{15 + 0}{3 \cdot \sqrt{50}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{15}{3 \cdot \sqrt{2 \cdot 25}} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{15}{3 \cdot 5 \cdot \sqrt{2}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{15}{15} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-1} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \boxed{\frac{\pi}{4}}\end{aligned}$$

$$b) \quad a = \langle 2, -4, 5 \rangle$$

$$b = \langle -2, 4, -5 \rangle$$

$$\Theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|a\| \|b\|} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{-4s}{(4s)^{1/2} (4s)^{1/2}} \right)$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{-4s}{4s} \right)$$

$$= \cos^{-1}(-1)$$

$$= \pi$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$\begin{array}{c|c|c} 2 & -4 & 5 \\ -2 & 4 & -5 \\ \hline -4 & -16 & -25 \end{array}$$

$$= (-4) + (-16) + (-25)$$

$$= -20 - 25$$

$$= -45$$

$$\begin{aligned} |a| &= \sqrt{2^2 + (-4)^2 + (5)^2} \\ &= \sqrt{4 + 16 + 25} = \sqrt{45} \end{aligned}$$

$$|b|$$

$$= \sqrt{(-2)^2 + (4)^2 + (-5)^2}$$

$$= \sqrt{4 + 16 + 25} = \sqrt{45}$$

4) Determine si los vectores son ortogonales, paralelos o ninguno.

a) $a = \langle -5, 3, 7 \rangle \quad b = \langle 6, -8, 2 \rangle$

Producto punto de a & b

$$\begin{array}{c|c|c} -5 & 3 & 7 \\ \cdot 6 & \cdot -8 & \cdot 2 \\ \hline -30 & -24 & +14 \end{array}$$

$$(-30) + (-24) + (14) = \boxed{-40} \quad \text{Ninguno}$$

b) $a = \langle 4, 6 \rangle$

$$b = \langle -3, 2 \rangle$$

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$$

$$\begin{array}{c|c} 4 & 6 \\ -3 & 2 \\ \hline -12 & 12 \end{array}$$

$\rightarrow \underbrace{(-12) + 12}_{0}$

Son ortogonales

5) Considerar vectores:

$$a = \langle 3, 6, -2 \rangle \text{ esc: } \text{Proy}_{ab} = \frac{a \cdot b}{|a|}$$

$$b = \langle 1, 2, 3 \rangle \text{ vec: } \text{Proy}_{ab} = \frac{a \cdot b}{|a|} \frac{a}{|a|}$$

a) Proyección de b sobre a :

Escalar:

$$\begin{aligned} \text{proy}_{ab} &= \frac{3 + 12 - 6}{\sqrt{3^2 + 6^2 + (-2)^2}} = \frac{9}{\sqrt{9 + 36 + 4}} = \\ &= \frac{9}{\sqrt{49}} = \boxed{\frac{9}{7}} \end{aligned}$$

Vectorial:

$$\begin{aligned} \text{Proy}_{ab} &= \frac{9}{7} \cdot \frac{1}{\sqrt{49}} \langle 3, 6, -2 \rangle \\ &= \frac{9}{(49)^{\frac{1}{2}} \cdot (49)^{\frac{1}{2}}} \langle 3, 6, -2 \rangle \\ &= \frac{9}{49} \langle 3, 6, -2 \rangle \\ &= \boxed{\left\langle \frac{27}{49}, \frac{54}{49}, -\frac{18}{49} \right\rangle} \end{aligned}$$

b) a sobre b : $a = \langle 3, 6, -2 \rangle$

$$a = \langle 3, 6, -2 \rangle$$

$$b = \langle 1, 2, 3 \rangle$$

$$\text{proy}_b a = \frac{a \cdot b}{|b|} \cdot \frac{b}{|b|}$$

$$\text{proy}_b a = \frac{a \cdot b}{|b|}$$

escalar: $\text{proy}_b a = \frac{9}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{9}{\sqrt{14}}$

vectorial: $\text{proy}_b a = \frac{9}{\sqrt{14}} \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} \langle 1, 2, 3 \rangle$

$$= \frac{9}{(\sqrt{14})^{\frac{1}{2}} \cdot (\sqrt{14})^{\frac{1}{2}}} \langle 1, 2, 3 \rangle$$

$$= \frac{9}{14} \langle 1, 2, 3 \rangle$$

$$= \left\langle \frac{9}{14}, \frac{18}{14}, \frac{27}{14} \right\rangle$$

$$= \left\langle \frac{9}{14}, \frac{9}{7}, \frac{27}{14} \right\rangle$$

c) proyección de b sobre a no es igual a proyección de a sobre b ; si estos cumplen la condición de $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ si resultan ser la misma proyección.

* el lab decía $\text{proy}_{ab} = \text{proy}_{ba}$ que sí serían iguales pero asumí que quería decir $\text{proy}_{ab} = \text{proy}_a$ que en 45 cuyo caso no siempre son iguales.

BONO: Encontrar tal valor de

x que $\langle 2, 1, -1 \rangle$ & $\langle 1, x, 0 \rangle$ es
de 45° .

θ tiene que ser igual a 45° ó $\frac{\pi}{4}$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}\right)$$

$$= \cos^{-1}\left(\frac{[(2 \cdot 1) + (1 \cdot x) + (-1 \cdot 0)]}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + x^2 + 0^2}}\right)$$

$$= \cos^{-1}\left(\frac{2 + x}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{1 + x^2}}\right)$$

$$= \cos^{-1}\left(\frac{2 + x}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{1 + x^2}}\right)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2 + x}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{1 + x^2}}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \sqrt{6} \cdot \sqrt{1 + x^2} = 2 + x$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{6}\right) \sqrt{1 + x^2}$$

$$\frac{\sqrt{12}}{2} \sqrt{1 + x^2} = 2 + x$$

$$\left(\frac{\sqrt{12}}{2} \sqrt{1 + x^2}\right)^2 = (2 + x)^2$$

$$3(1 + x^2) = x^2 + 4x + 4$$

$$3 + 3x^2 = x^2 + 4x + 4$$

46

$$\begin{aligned} 3 + 3x^2 &= x^2 + 4x + 4 \\ 0 &= x^2 - 3x + 4x + 4 - 3 \\ 0 &= -2x^2 + 4x + 1 \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x &= \frac{-(4) \pm \sqrt{16 - 4(-2)(1)}}{2(-2)} \\ &= \frac{-4 \pm \sqrt{24}}{-4} \end{aligned}$$



$$= \frac{-4 \pm \sqrt{24}}{-4}$$

$$\approx -0.22$$

$$\approx 2.22$$

Capítulo 8

Trabajos #03

Capítulo9

Trabajos #03

1) a. $(a \cdot b) \cdot c$ # asumiendo que a, b, c son vectores.

Resulta en un escalar.
productos punto resultan en escalares siempre

b. $(a \cdot b) \times c$

El producto cruz es entre vectores no se puede hacer entre escalares,
 $a \cdot b$ resulta en un escalar por ende no tiene sentido.

c. $(a \times b) \times c$

Resulta en un vector

d. $(a \times c) \cdot b$

Resulta en un escalar. producto cruz de a, c resulta en vector, ese vector con producto punto b resulta en escalar

2) Encuentre vectores unitarios ortogonales

a $\langle 3, 2, 1 \rangle$ & $\langle -1, 1, 0 \rangle$.

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \hat{i} [(2 \cdot 0) - (1 \cdot 1)] - \hat{j} [(3 \cdot 0) - (1 \cdot -1)] + \hat{k} [(3 \cdot 1) - (2 \cdot -1)] \\
 = \hat{i} [0 - 1] - \hat{j} [0 - (-1)] + \hat{k} [3 - (-2)] \\
 = -\hat{i} - \hat{j} + 5 \hat{k} \\
 \therefore \langle -1, -1, 5 \rangle$$

Este es el vector ortogonal a
 # $\langle 3, 2, 1 \rangle$ & $\langle -1, 1, 0 \rangle$ Ahora sólo
 # falta la división por la magnitud
 # para que sea ortogonal unitario.

$$|O_{\perp}| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (5)^2} = \sqrt{1 + 1 + 25} = \sqrt{27}$$

unit $\Rightarrow O_{\perp} \cdot \frac{1}{\sqrt{27}}$ $\Rightarrow \langle -1, -1, 5 \rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{27}} =$

$$R_1 = \left\langle \frac{1}{\sqrt{27}}, \frac{1}{\sqrt{27}}, \frac{5}{\sqrt{27}} \right\rangle$$

invierte signos
 para encontrar
 segundo vector

$$R_2 = \left\langle -\frac{1}{\sqrt{27}}, -\frac{1}{\sqrt{27}}, \frac{5}{\sqrt{27}} \right\rangle$$

Comprobación de ser unitarios.

$$1 = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{27}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{27}}\right)^2 + \left(\frac{5}{\sqrt{27}}\right)^2}$$

$$1 = \sqrt{\left(\frac{1}{27}\right) + \left(\frac{1}{27}\right) + \left(\frac{25}{27}\right)}$$

$$1 = \sqrt{\frac{1 + 1 + 25}{27}}$$

$$1 = \sqrt{\frac{27}{27}}$$

$$1 = 1$$

\therefore es unitario & ortogonal.

- 3) Calcula el triple producto escalar entre $a = \langle 1, 2, 3 \rangle$ & $b = \langle 3, 2, 5 \rangle$ & $c = \langle 0, 4, 3 \rangle$ i $a \cdot (b \times c) = (a \times b) \cdot c$

$$\begin{aligned}
 a \times c &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \hat{i}[(2 \cdot 3) - (5 \cdot 4)] - \hat{j}[(3 \cdot 3) - (5 \cdot 0)] + \hat{k}[(3 \cdot 4) - (2 \cdot 0)] \\
 &= \hat{i}[6 - 20] - \hat{j}[9 - 0] + \hat{k}[12 - 0] \\
 &= \hat{i}[-14] - \hat{j}[9] + \hat{k}[12] \\
 &= -14\hat{i} - 9\hat{j} + 12\hat{k} \\
 &= \langle -14, -9, 12 \rangle
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 a \cdot (b \times c) &= \langle 1, 2, 3 \rangle \cdot \langle -14, -9, 12 \rangle \\
 &= \langle (1 \cdot -14), (2 \cdot -9), (3 \cdot 12) \rangle \\
 &= -14 - 18 + 36 = 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a \times b &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \hat{i}[(2 \cdot 5) - (3 \cdot 2)] - \hat{j}[(1 \cdot 5) - (3 \cdot 2)] + \hat{k}[(1 \cdot 2) - (3 \cdot 2)] \\
 &= \hat{i}[10 - 6] - \hat{j}[5 - 9] + \hat{k}[2 - 6] \\
 &= \hat{i}[4] - \hat{j}[-4] + \hat{k}[-4] \\
 &= 4\hat{i} + 4\hat{j} - 4\hat{k} \\
 &= \langle 4, 4, -4 \rangle
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (a \times b) \cdot c &= \langle 4, 4, -4 \rangle \cdot \langle 0, 4, 3 \rangle \\
 &= 0 + 16 - 12 = 4
 \end{aligned}$$

$\therefore a \cdot (b \times c) = (a \times b) \cdot c$ Sí es igual ya que los dos dan 4, el mismo resultado.

- 4) Calcule el área del paralelogramo entre los puntos $A(1, 4, -2)$, $B(2, -1, 1)$, $C(0, 1, 0)$ y $D(-1, 1, 1)$



Paralelogramo

$$P = b \cdot a$$

$$\text{base} = |\vec{u}|$$

$$\text{altura} = |b| \sin \theta$$

$$|\vec{u} \times \vec{w}| = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -5 & 11 \\ -1 & -13 & 25 \end{vmatrix} = \dots$$

$$\begin{aligned} \dots &= \hat{i} [(-5 \cdot 25) - (11 \cdot -13)] - \hat{j} [(1 \cdot 25) - (11 \cdot -1)] + \hat{k} [(1 \cdot -13) - (-5 \cdot -1)] \\ &= \hat{i} [-125 + 143] - \hat{j} [25 + 11] + \hat{k} [-13 - 5] = \\ &= 18\hat{i} - 36\hat{j} - 18\hat{k} \\ &= \langle 18, -36, -18 \rangle \end{aligned}$$

$$|\vec{u} \times \vec{w}| = \sqrt{18^2 + (-36)^2 + (-18)^2} = 18\sqrt{6} \cdot \frac{1}{2} = 9\sqrt{6}$$

5) Consideren los puntos $P(1,0,1)$ & $Q(-2,1,3)$ & $R(4,2,5)$.

a) Encuentre el vector no cero ortogonal al plano

$$\vec{u} = \overrightarrow{PQ} = \langle (-2-1), (1-0), (3-1) \rangle$$

$$\boxed{\vec{u} = \langle -3, 1, 2 \rangle}$$

$$\vec{w} = \overrightarrow{PR} = \langle (4-1), (2-0), (5-1) \rangle$$

$$\boxed{\vec{w} = \langle 3, 2, 4 \rangle}$$

$$\begin{aligned}\vec{v} \times \vec{w} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -3 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \hat{i} [(1 \cdot 4) - (2 \cdot 2)] - \hat{j} [(-3 \cdot 4) - (3 \cdot 2)] + \hat{k} [(-3 \cdot 2) - (3 \cdot 1)] \\ &= \hat{i} [4 - 4] - \hat{j} [-12 - 6] + \hat{k} [-6 - 3] \\ &= 0\hat{i} + 18\hat{j} - 9\hat{k}\end{aligned}$$

∴ $\langle 0, 18, -9 \rangle$ es el vector ortogonal no cero al plano.

b) Determine el área del triángulo PQR

$$\begin{aligned}A_{\Delta} &= \frac{1}{2} |\vec{v} \times \vec{w}| = \frac{1}{2} \underbrace{|\langle 0, 18, -9 \rangle|}_{\sqrt{0^2 + 18^2 + (-9)^2}} \\ &\quad \sqrt{324 + 81} \\ &\quad \sqrt{405}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{405} = \frac{1}{2} 9 \cdot \sqrt{5} = \frac{9 \cdot \sqrt{5}}{2} \leftarrow \text{es el .}$$

$$\boxed{\vec{u} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{v})}$$

$$\vec{u}(\vec{\omega} \times \vec{v}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & -13 & 25 \\ -1 & -4 & 7 \end{vmatrix} = \dots$$

$$\dots = \hat{i} [(-13 \cdot 7) - (-4 \cdot 25)] - \hat{j} [(-1 \cdot 7) - (25 \cdot -1)] + \hat{k} [(-1 \cdot -4) - (-1 \cdot -13)] \\ = 9\hat{i} - 18\hat{j} - 9\hat{k}$$

reemplazar $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ con \vec{v} .

$$= 9(1) - 18(-5) - 9(11)$$

$$= 9 + 90 - 99$$

$$= 9 - 99 + 90$$

$$= -90 + 90 = 0 \quad \therefore \text{sí son parte del mismo plano.}$$

8) $(a \cdot b) = \sqrt{3}$ & $(a \times b) = \langle 1, 2, 2 \rangle$

encuentra ángulo entre a & b .

$$\underbrace{a \cdot b}_{\sqrt{3}} = |a||b|\cos\theta$$

$$\underbrace{(a \times b)}_{|\langle 1, 2, 2 \rangle|} = |a||b|\sin\theta$$

$$|a||b|\cos\theta = \sqrt{3}$$

$$\underbrace{|a||b|}_{\text{# Sustituir en }} = \frac{\sqrt{3}}{\cos\theta}$$

$$|\langle 1, 2, 2 \rangle| = \frac{\sqrt{3}\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\frac{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad \left. \right\} \tan\theta$$

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{1 + 4 + 4}}{\sqrt{3}}$$

$$59 \quad \tan\theta = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{3}}$$

$$, \quad - = 3 \cdot 3^{-\frac{1}{2}}$$

$$\tan \theta = -\frac{1}{3}$$

$$\theta = \tan^{-1}(\sqrt{3})$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

∴ El ángulo es $\theta = \frac{\pi}{3}$

BONO:

9) a) $|a \times b|^2 = |a|^2 |b|^2 - (a \cdot b)^2$

Partimos desde la siguiente propiedad.

$$\hookrightarrow |a \times b| = |a||b| \sin \theta \quad \# \text{ Elevamos al cuadrado}$$

$$\Rightarrow |a \times b|^2 = |a|^2 |b|^2 \sin^2 \theta$$

Propiedad pitagórica

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$$

Sustituir

$$|a \times b|^2 = |a|^2 |b|^2 (1 - \cos^2 \theta) \quad \# \text{ Distribuyo}$$

$$|a \times b|^2 = |a|^2 |b|^2 - \underbrace{|a|^2 |b|^2 \cos^2 \theta}_{(a \cdot b)^2}$$

∴ $|a \times b|^2 = |a|^2 |b|^2 - (a \cdot b)^2$

□

b) $(a - b) \times (a + b) = 2(a \times b) \quad \# \text{ Quiero llegar a esto}$

$$= (a - b) \times (a + b)$$

Propiedad distributiva

$$= (a - b) \times (a + b)$$

$$= (\cancel{a \times a})^0 + (a \times \underset{60}{b}) - (b \times a) - (\cancel{b \times b})^0$$

$$= (a \times b) - (b \times a)$$

$$\begin{aligned}\# (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) &= -(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) \\ &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \\ \therefore 2(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) &\quad \square\end{aligned}$$

Capítulo 10

Trabajos #04

Capítulo 11

Trabajos #04

1) Planos $\underbrace{x + 3y + 2z = 3}_{\hat{n}_1}$ & $\underbrace{-2x + y + 3z = 8}_{\hat{n}_2}$

a) Encontrar el ángulo de intersección.

$$\hat{n}_1 = \langle 1, 3, 2 \rangle$$

$$\hat{n}_2 = \langle -2, 1, 3 \rangle$$

$$\cos \theta = \frac{\hat{n}_1 \cdot \hat{n}_2}{|\hat{n}_1| |\hat{n}_2|}$$

$$\cos \theta = \frac{(1 \cdot -2) + (3 \cdot 1) + (2 \cdot 3)}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2} \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 3^2}}$$

$$= \frac{-2 + 3 + 6}{\sqrt{1+9+4} \sqrt{4+1+9}} = \frac{7}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}}$$

$$= \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

B) Recta de intersección:

Resta de ecuaciones

$$\# r = \vec{r}_0 + t \vec{v}$$

67 vector director

$$\begin{array}{r}
 2(x + 3y + 2z = 3) \\
 -2x + y + 3z = 8 \\
 \hline
 2x + 6y + 4z = 6 \\
 -2x + y + 3z = 8 \\
 \hline
 \frac{1}{7}(0x + 7y + 7z = 14)
 \end{array}$$

$$y + z = 2$$

$$y = 2 - z$$

Encuentra dos puntos en común para
encuentran el vector director

Cuando $\begin{cases} z = 0 \\ y = 2 \end{cases}$ $\langle -3, 2, 0 \rangle$

$$x = 3 - 3(2) - 2(0)$$

$$x = 3 - 6$$

$$x = -3$$

Cuando $\begin{cases} z = 1 \\ y = 1 \end{cases}$ $\langle -2, 1, 1 \rangle$

$$x = 3 - 3(1) - 2(1)$$

$$x = 3 - 3 - 2$$

$$x = -2$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{PQ} = \langle (-2+3), (1-2), (1-0) \rangle$$

$$\vec{v} = \langle 1, -1, 1 \rangle$$

$$\vec{r}_0 = \langle -3, 2, 0 \rangle - t \langle 1, -1, 1 \rangle \quad \checkmark$$

2) Considera: $P(-2, 5, +)$ & $Q(1, 3, 4)$.

¿Es perpendicular $A(4, 3, 2)$ $B(3, -1, 8)$

$$\vec{u} = \overrightarrow{PQ} = \langle (-2-1), (5-3), (7-4) \rangle$$

$$\vec{w} = \overrightarrow{AB} = \langle (4-3), (3+1), (2-8) \rangle$$

$$\vec{v} = \langle -3, 2, 3 \rangle$$

$$\vec{w} = \langle 1, 4, -6 \rangle$$

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{w} &= \langle -3, 2, 3 \rangle \cdot \langle 1, 4, -6 \rangle \\ &= (-3 \cdot 1) + (2 \cdot 4) + (3 \cdot -6) \\ &= -3 + 8 - 18 \\ &= -21 + 8 \\ &= -13\end{aligned}$$

No son perpendiculares

3) Encuentre la ecuación del plano: $A(0, 1, 1)$ & $B(1, 0, 1)$ & $C(1, 1, 0)$:

$$\begin{aligned}\vec{u} = \overrightarrow{AB} &= \langle (1-0), (0-1), (1-1) \rangle \\ &= \langle 1, -1, 0 \rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{w} = \overrightarrow{AC} &= \langle (1-0), (1-1), (0-1) \rangle \\ &= \langle 1, 0, -1 \rangle\end{aligned}$$

$$\hat{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} &= \hat{i} [(-1 \cdot -1) - (0 \cdot 0)] - \hat{j} [(1 \cdot -1) - (1 \cdot 0)] + \hat{k} [(1 \cdot 0) - (1 \cdot -1)] \\ &= \hat{i}[1] - \hat{j}[-1] + \hat{k}[1] \\ &= \langle 1, 1, 1 \rangle \end{aligned}$$

$$\hat{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

$$\hat{i}(x - x_0) + \hat{j}(y - y_0) + \hat{k}(z - z_0) = 0$$

$$1(x - 1) + 1(y - 1) + 1(z - 1) = 0$$

$$x - 1 + y - 1 + z - 1 = 0$$

$$x + y + z - 3 = 0$$

4) Encuentre la ec. del plano que pasa por $(1, 4, -7)$

& contiene a $z = 2y = 3x$

Empieza en el origen $(0, 0, 0)$ por que si

$z = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow x = 0$

$$z = 2y$$

$$z = 3x \quad \vec{w} = \left\langle \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1 \right\rangle$$

El reciproco

$$P(0,0,0)$$

$$Q(1,4,-7)$$

$$\vec{u} = \overrightarrow{PQ} = \langle (1-0), (4-0), (-7-0) \rangle$$

$$\vec{u} = \langle 1, 4, -7 \rangle$$

$$\vec{u} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 4 & -7 \end{vmatrix} = \dots$$

$$= \hat{i} \left[\left(\frac{1}{2} \cdot -7 \right) - (1 \cdot 4) \right] - \hat{j} \left[\left(\frac{1}{3} \cdot -7 \right) - (1 \cdot 1) \right] + \hat{k} \left[\left(\frac{1}{3} \cdot 4 \right) - \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \right) \right] =$$

$$= -\frac{15}{2} \hat{i} + \frac{10}{3} \hat{j} + \frac{5}{6} \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{w} = \left\langle -\frac{15}{2}, \frac{10}{3}, \frac{5}{6} \right\rangle$$

$$= -\frac{15}{2} (x - x_0) + \frac{10}{3} (y - y_0) + \frac{5}{6} (z - z_0)$$

$$= -\frac{15}{2} (x - 1) + \frac{10}{3} (y - 4) + \frac{5}{6} (z + 7)$$

5) Consider the planes:

$$P_1: 3x + 6y - 3z = 3$$

$$P_2: 2y = x - z - 2$$

$$P_3: 4x - 12y + 5z = 8$$

71

$$P_4: 9y = 3x + 6z - 6$$

6) $\begin{aligned} L_1: \quad x &= 1 + 6t \\ y &= 1 - 3t \\ z &= 12t + 5 \end{aligned}$

$$L_2: \quad 2x - 2 = 4 - 4y = z + 1$$

$$\begin{aligned} L_3: \quad x &= 1 + 2t \\ y &= t \\ z &= 1 + 4t \end{aligned}$$

$$L_4: \quad r = \langle 3, 1, 5 \rangle + t \langle 4, 2, 8 \rangle$$

a) ¿Paralelas?

b) ¿Idénticas?

L_1 & L_3 :

$$\begin{aligned} L_1: \quad x &= 1 + 6t \\ y &= 1 - 3t \\ z &= 12t + 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_3: \quad x &= 1 + 2t \\ y &= 0t \\ z &= 1 + 4t \end{aligned}$$

L_1 & L_3 No son paralelas

```

----- if (paralelas) {
    verificar si son idénticas;
    todos tienen que ser
    iguales;
}
else {
    7 paralelas & 7 idénticas;
}
----- 
```

\mathcal{L}_1 & \mathcal{L}_2 :

$$\mathcal{L}_1: x = 1 + \textcircled{6}t$$

$$y = 1 - \textcircled{3}t$$

$$z = \textcircled{12}t + 5$$

$$\mathcal{L}_2: t = 2x - 2 \Rightarrow x = \frac{\textcircled{0}t + 2}{2}$$

$$t = 4 - 4y \Rightarrow y = \frac{4 - \textcircled{0}t}{4}$$

$$t = z + 1 \Rightarrow z = \textcircled{0}t - 1$$

\mathcal{L}_1 & \mathcal{L}_2 son paralelas

Agarro los coeficientes $(1, 1, 5)$

$$\left. \begin{array}{l} x = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2} \\ y = \frac{4 - 1}{4} = \frac{3}{4} \\ z = 5 - 1 = 4 \end{array} \right\} \text{No iguales}$$

\mathcal{L}_1 & \mathcal{L}_2 : Son paralelas pero no iguales

\mathcal{L}_1 & \mathcal{L}_4 :

$$\mathcal{L}_1: x = 1 + \textcircled{6}t$$

$$y = 1 - \textcircled{3}t$$

$$\mathcal{L}_4: r = \langle 3, 1, 5 \rangle + t \langle 4, 2, 8 \rangle$$

$$\dots \rightarrow \textcircled{14}$$

$$\begin{array}{l} x = 5 + 7t \\ y = 1 + 2t \\ z = 5 + 8t \end{array}$$

ℓ_1 & ℓ_4 no son paralelas.

ℓ_3 & ℓ_4 :

$$\begin{array}{l} \ell_3: x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = 1 + 4t \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \ell_4: r = \langle 3, 1, 5 \rangle + t \langle 4, 2, 8 \rangle \\ x = 3 + 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = 5 + 8t \end{array}$$

de ℓ_3 extraigo pt. $(1, 0, 1)$

$$x = 3 + 4 = 7$$

$$y = 1 + 0 = 1$$

$$z = 5 + 8 = 13$$

ℓ_3 & ℓ_4 son paralelos pero
no iguales

ℓ_3 & ℓ_2 :

$$\begin{array}{l} \ell_2: x = \frac{t+2}{2} \\ y = \frac{4-t}{4} \\ z = t - 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \ell_4: x = 3 + 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = 5 + 8t \end{array}$$

7) a)

$$\begin{aligned}L_1: x &= 3 + 2t \\y &= 4 - t \\z &= 12t + 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}L_2: x &= 1 + 4s \\y &= 3 - 2s \\z &= 4 + 5s\end{aligned}$$

$$L_1: (3, 4, 1) + t(2, -1, 3) \quad \vec{v} = \langle 2, -1, 3 \rangle$$

$$L_2: (1, 3, 4) + s(4, -2, 5) \quad \vec{u} = \langle 4, -2, 5 \rangle$$

a.1) ¿Paralelas?

$$\underbrace{\vec{u} = k \vec{v}}_{\text{Para ser paralelas}}$$

$$(4, -2, 5) = k(2, -1, 3)$$

$$4 = 2k \Rightarrow k = 2$$

$$-2 = -1k \Rightarrow k = 2$$

$$5 = 3k \Rightarrow k = 5/3$$

∴ No son vectores paralelos

a.2) ¿pts en común?

Capítulo 12

Trabajos #05

Tarea #5 Cálculo Multivariable

Entrega, jueves 13 de febrero

Nombre: _____ Carnet: _____

Tema:	1	2	3	4	5	Total
Puntos:	10	20	30	20	20	100
Nota:						

1. Analice si la función $\mathbf{r} = \left\langle 3e^{-t}, \frac{\sin^2(\pi t)}{t}, \tan(2\pi t) \right\rangle$ es continua en:
 - (a) (6 pts.) $t = 0$
 - (b) (4 pts.) $t = 1$

2. Determine el límite de las siguientes funciones
 - (a) (10 pts.) $\lim_{t \rightarrow 0} \left\langle e^{-3t}, \frac{t^2}{\sin^2(t)}, \cos(2t) \right\rangle$
 - (b) (10 pts.) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left\langle \frac{1+t^2}{1-t^2}, \arctan(t), \frac{1-e^{-2t}}{t} \right\rangle$

3. Dada $\mathbf{r}(t) = \langle \sin(2t), t^2, \cos(2t) \rangle$, encuentre:
 - (a) (5 pts.) $r'(t)$
 - (b) (8 pts.) $r''(t)$
 - (c) (8 pts.) $r''(t) \cdot r'''(t)$
 - (d) (9 pts.) $r'' \times r'(t)$

4. (20 pts.) Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva $x = t$, $y = e^{-t}$, $z = 2t - t^2$ en el punto $(0, 1, 0)$.

5. (20 pts.) Las curvas $\mathbf{r}_1 = \langle \sin t, t^2, t^4 \rangle$ y $\mathbf{r}_2 = \langle \sin t, \sin(2t), t^3 \rangle$ se cortan en el origen. Encuentre el coseno del ángulo de intersección entre las dos rectas tangentes a \mathbf{r}_1 y \mathbf{r}_2 .

Capítulo 13

Trabajos #05

TAREA #5 - DAVID CORZO - 20190432 - 2020-02-10

$$1.a) \quad r = \left\langle 3e^{-t}, \frac{\sin^2(\pi t)}{t}, \tan(2\pi t) \right\rangle$$

¿Continua en $t = 0$?

$$\lim_{t \rightarrow 0} (r) = \left\langle \underbrace{\lim_{t \rightarrow 0} (3e^{-t})}_{f(t)}, \underbrace{\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2(\pi t)}{t} \right)}_{g(t)}, \underbrace{\lim_{t \rightarrow 0} (\tan(2\pi t))}_{h(t)} \right\rangle$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} (f(t)) &= \lim_{t \rightarrow 0} (3e^{-t}) \\ &= 3e^{-0} \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} (g(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2(\pi t)}{t} \right) \xrightarrow[0/0]{\text{H}} \frac{0}{0}$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{\text{H}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin(\pi t) \cdot \cos(\pi t) \cdot \pi}{1} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (2 \sin(\pi t) \cos(\pi t) \cdot \pi) \\ &= 2 \sin(\pi \cdot 0) \cos(\pi \cdot 0) \cdot \pi = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} (h(t)) &= \lim_{t \rightarrow 0} (\tan(2\pi t)) \\ &= \tan(2\pi \cdot 0) = 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} (r) = \langle 3, 0, 0 \rangle$$

$$r(0) = \left\langle 3, \frac{0}{0}, 0 \right\rangle$$

Discontinuidad

\therefore No es continua en $t=0$ ya que

$$\lim_{a \rightarrow 0} (r) \neq r(0)$$

1. b)

$$\lim_{a \rightarrow 1} (r) = \lim_{a \rightarrow 1} \left\langle \underbrace{3e^{-t}}_{f(t)}, \underbrace{\frac{\sin^2(\pi t)}{t}}_{g(t)}, \underbrace{\tan(2\pi t)}_{h(t)} \right\rangle$$

$$\lim_{a \rightarrow 1} (f(t)) = \lim_{a \rightarrow 1} (3e^{-t})$$

$$= 3e^{-1} = \frac{3}{e}$$

$$\lim_{a \rightarrow 1} (g(t)) = \lim_{a \rightarrow 1} \left(\frac{\sin^2(\pi t)}{t} \right)$$

$$= \frac{\sin^2(\pi)}{1} = \sin^2(\pi) = \emptyset$$

$$\lim_{a \rightarrow 1} (h(t)) = \lim_{a \rightarrow 1} (\tan(2\pi t))$$

$$= \tan(2\pi) = \emptyset$$

$$\lim_{a \rightarrow 1} (r) = \left\langle \frac{3}{e}, 0, 0 \right\rangle$$

$$r(1) = \left\langle \frac{3}{e}, 0, 0 \right\rangle$$

Sí es continua en $t=1$ ya que

$$\lim_{a \rightarrow 1} (r) = r(0)$$

2) Determine el límite de las sigs funciones.

2a) $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\left\langle \underbrace{e^{-3t}}_{f(t)}, \underbrace{\frac{t^2}{\sin^2(t)}}_{g(t)}, \underbrace{\cos(2t)}_{h(t)} \right\rangle \right)$

$$\lim_{a \rightarrow 0} (f(t)) = \lim_{a \rightarrow 0} (e^{-3t})$$

$$= e^{-3 \cdot 0} = e^0 = 1$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} (g(t)) = \lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{t^2}{\sin^2(t)} \right) \leftarrow \frac{0}{0} \text{ indef.}$$

$$\stackrel{LH}{=} \lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{2t}{2 \sin(t) \cos(t)} \right) \leftarrow \frac{0}{0} \text{ indef}$$

$$f'g + fg' \stackrel{LH}{=} \lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\cos^2(t) - \sin^2(t)} \right)$$

$$= \frac{1}{1^2 - 0} = 1$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} (h(+)) = \lim_{a \rightarrow 0} (\cos(2t)) \\ = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\left\langle e^{-3t}, \frac{t^2}{\sin^2(t)}, \cos(2t) \right\rangle \right) = \langle 1, 1, 1 \rangle$$

2 b)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\left\langle \underbrace{\frac{1+t^2}{1-t^2}}_{f(t)}, \underbrace{\arctan(t)}_{g(t)}, \underbrace{\frac{1-e^{-2t}}{t}}_{h(t)} \right\rangle \right)$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} (f(t)) = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{1+t^2}{1-t^2} \right) \leftarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{0+2t}{0-2t} \right)$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{2t}{-2t} \right) = -1$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} (g(+)) = \lim_{a \rightarrow \infty} (\arctan(t))$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} (h(t)) = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{1-e^{-2t}}{t} \right) \leftarrow \frac{1}{\infty} \text{ algo asi.}$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{-e^{-2t} \cdot 862}{1} \right)$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(e^{-2t} \right) = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{e^{2t}} \right) \leftarrow \frac{1}{\infty} \rightarrow 0$$

$$= \emptyset$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\left\langle \frac{1+t^2}{1-t^2}, \arctan(t), \frac{1-e^{-2t}}{t} \right\rangle \right) = \left\langle -1, \frac{\pi}{2}, \emptyset \right\rangle$$

3) $r = \langle \sin(2t), t^2, \cos(2t) \rangle$

a) $r'(t)$

$$r'(t) = \langle 2\cos(2t), 2t, -\sin(2t) \cdot 2 \rangle$$

b) $r''(t)$

$$r''(t) = \langle -4\sin(2t), 2, -\cos(2t) \cdot 4 \rangle$$

c) $r''(t) \cdot r'''(t)$

$$r'''(t) = \langle -8\cos(2t), 0, \sin(2t) \cdot 8 \rangle$$

$$= \langle -4\sin(2t), 2, -4\cos(2t) \rangle \cdot \langle -8\cos(2t), 0, 8\sin(2t) \rangle$$

$$= [-4\sin(2t) \cdot -8\cos(2t)] + [2 \cdot 0] + [-4\cos(2t) \cdot 8\sin(2t)]$$

$$= 32\sin(2t)\cos(2t) - 32\sin(2t)\cos(2t)$$

$$= \emptyset$$

$$d) \quad r''(t) \times r'(t)$$

$$r''(t) = \langle -4\sin(2t), 2, -\cos(2t) \cdot 4 \rangle$$

$$r'(t) = \langle 2\cos(2t), 2t, -\sin(2t) \cdot 2 \rangle$$

$$r''(t) \times r'(t) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -4\sin(2t) & 2 & -4\cos(2t) \\ 2\cos(2t) & 2t & -2\sin(2t) \end{vmatrix} = \dots$$

$$\dots = \hat{i} \left[(2)(-2\sin(2t)) - (2t)(-4\cos(2t)) \right] -$$

$$\hat{j} \left[(-4\sin(2t))(-2\sin(2t)) - (2\cos(2t))(-4\cos(2t)) \right] +$$

$$\hat{k} \left[(-4\sin(2t))(2t) - (2\cos(2t))(2) \right] =$$

$$= \hat{i} \left[-4\sin(2t) + 8t\cos(2t) \right] -$$

$$\hat{j} \left[8\sin^2(2t) + 8\cos^2(2t) \right] +$$

$$\hat{k} \left[-8t\sin(2t) - 4\cos(2t) \right]$$

$$= \langle -4\sin(2t) + 8t\cos(2t), -8, -8t\sin(2t) - 4\cos(2t) \rangle$$

4)

$$x = t$$

$$y = e^{-t}$$

88) $P(\emptyset, 1, \emptyset)$

$$z = 2t - t$$

Encuentramos t

$$x: \quad t = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$y: \quad e^{-t} = 1 \Rightarrow t = 0$$

$$z: \quad 2t - t^2 = 0 \Rightarrow t = 0$$

Armanmos \vec{r}

$$\vec{r}(t) = \langle t, e^{-t}, 2t - t^2 \rangle$$

$$\vec{r}(0) = \langle 0, 1, 0 \rangle$$

Devolvemos:

$$\vec{r}'(t) = \langle 1, -e^{-t}, 2 - 2t \rangle$$

$$\vec{r}'(0) = \langle 1, -1, 2 \rangle$$

Armanmos La fórmula de recta tangente a vectores:

$$\vec{r}_T = \vec{r}(a) + t \vec{r}'(a)$$

$$a = 0$$

$$\vec{r}_T = \langle 0, 1, 0 \rangle + t \langle 1, -1, 2 \rangle$$

Ecs. Paramétricas:

$$x = 0 + 1t$$

$$y = 1 - 1t$$

$$z = 0 + 2t$$

5)

$$\vec{r}_1 = \langle \sin(t), t^2, t^4 \rangle$$

$$\vec{r}_2 = \langle \sin(t), \sin(2t), t^3 \rangle$$

$$\vec{r}_1'(t) = \langle \cos(t), 2t, 4t^3 \rangle$$

$$\vec{r}_1'(0) = \langle 1, 0, 0 \rangle$$

$$\vec{r}_2'(t) = \langle \cos(t), 2\cos(2t), 3t^2 \rangle$$

$$\vec{r}_2'(0) = \langle 1, 2, 0 \rangle$$

Evaluar el ángulo:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$$

$$\cos \theta = \frac{\langle 1, 0, 0 \rangle \cdot \langle 1, 2, 0 \rangle}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2}}$$

$$\cos \theta = \frac{1 + 0 + 0}{1 \cdot \sqrt{5}}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Capítulo 14

Trabajos #06

Tarea #6 Cálculo Multivariable

Entrega, jueves 20 de febrero

Nombre: _____ Carnet: _____

Tema:	1	2	3	4	5	Total
Puntos:	25	15	15	15	30	100
Nota:						

1. Evalúe las siguientes integrales:

(a) (8 pts.) $\int_0^1 \left(\frac{4}{1+t^2}j + \frac{2t}{1+t^2}k \right) dt$

(b) (9 pts.) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (3\sin^2(t)\cos(t)i + 3\sin(t)\cos^2(t)j + 2\sin(t)\cos(t)k) dt$

(c) (8 pts.) $\int \left(te^t i + t^2 \ln(t) j + \frac{e^t}{\sqrt{1-e^{2t}}} k \right) dt$

2. Dada la posición $\mathbf{r}(t) = ti + \sin(3t)j + \cos(3t)k$ encuentre:

- (a) (5 pts.) la función de velocidad.
- (b) (5 pts.) la función de aceleración.
- (c) (5 pts.) la función de rápidez.

3. Dada la aceleración $\mathbf{a}(t) = \langle e^t, \sin t \cos t, \frac{1}{(t+1)^2} \rangle$, la velocidad inicial $\mathbf{v}(0) = \langle 3, -1, 2 \rangle$ y la posición inicial $\mathbf{r}(0) = \langle 0, 2, 0 \rangle$, encuentre:

(a) (7 pts.) la función de velocidad.

(b) (8 pts.) la función de posición.

4. (15 pts.) Calcule la longitud de arco de la helice circular de la ecuación vectorial $r(t) = \cos(t)i + \sin(t)ij + tk$ desde el punto $(1, 0, 0)$ hasta el punto $(1, 0, 2\pi)$.

5. Encuentre y bosqueje el dominio de las siguientes funciones:

(a) (10 pts.) $f(x, y) = \sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-y^2}$

(b) (10 pts.) $g(x, y) = \frac{\sqrt{y-x^2}}{1-x^2}$

(c) (10 pts.) $h(x, y) = \frac{9}{9-x-y}$

Capítulo 15

Trabajos #06

1) Evalúe los integrales:

a) $\int_0^1 \left(\underbrace{\frac{4}{1+t^2} \hat{i}}_{f(t)} + \underbrace{\frac{2t}{1+t^2} \hat{k}}_{g(t)} \right) dt$

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(t) dt &= \int_0^1 \left(\frac{4}{1+t^2} \right) dt \\&= 4 \int_0^1 \left(\frac{1}{1+t^2} \right) dt \\&= 4 \arctan(t) \Big|_0^1 \\&= 4 \left\{ \arctan(1) - \arctan(0) \right\} \\&= 4 \left\{ \frac{\pi}{4} - 0 \right\} = \boxed{\pi}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 g(t) dt &= \int_0^1 \left(\frac{2t}{1+t^2} \right) dt \\&= \int_0^1 \left(\frac{2t}{1+t^2} \right) dt \\&\quad u = 1+t^2 \\&\quad du = 2t dt \\&= \int_0^1 \left(\frac{du}{u} \right) \\&= \ln|1+t^2| \Big|_0^1 \\&= \left\{ \ln(2) - \ln(1) \right\} = \boxed{\ln(2)}\end{aligned}$$

∴ $\langle 0, \pi, \ln(2) \rangle$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(3 \sin^2(t) \cos(t) \hat{i} + 3 \sin(t) \cos^2(t) \hat{j} + 2 \sin(t) \cos(t) \hat{k} \right) dt$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt \quad \underbrace{g(t)}_{\sin^2(t) \cos(t)} \quad \underbrace{h(t)}_{\sin^3(t)}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt &= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t) \cos(t) dt \\ u &= \sin(t) \\ du &= \cos(t) dt \\ &= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} u^2 du \\ &= \frac{3}{3} u^3 = \sin^3(t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left\{ \sin^3\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin^3(0) \right\} \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(t) dt &= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(t) \cos^2(t)) dt \\ u &= \cos(t) \\ -du &= \sin(t) dt \\ &= -3 \int_{u(0)}^{u\left(\frac{\pi}{2}\right)} u^2 du \\ &= -\frac{3}{3} u^3 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= -\left\{ \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \cos(0) \right\} \\ &= -\left\{ 0 - 1 \right\} = \boxed{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(t) dt &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(t) \cos(t)) dt \\ u &= \sin(t) \\ du &= \cos(t) dt \\ &= 2 \int_{u(0)}^{u\left(\frac{\pi}{2}\right)} u du \quad 96 \\ &= u^2 \Big|_{-1}^{1} = \left\{ 1^2 - 0 \right\} = \boxed{1} \end{aligned}$$

$$| u(0)=0 \quad () \quad \underline{\quad}$$

$$\therefore \left\langle 1, 1, 1 \right\rangle$$

3) $\int \left(\underbrace{te^t}_{f(t)} \hat{+} \underbrace{t^2 \ln(t)}_{g(t)} \hat{+} \underbrace{\frac{e^t}{\sqrt{1-e^{2t}}}}_{h(t)} \hat{K} \right) dt$

$$\begin{aligned} \int f(t) dt &= \int \underbrace{te^t}_{dt} dt \\ u &= t & du &= e^t dt \\ du &= dt & v &= e^t \\ &= te^t - \int e^t dt \\ &= \boxed{te^t - e^t + C_1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int g(t) dt &= \int t^2 \ln(t) dt \\ u &= \ln(t) & du &= t^2 dt \\ du &= \frac{1}{t} dt & v &= \frac{1}{3} t^3 \\ &= \ln(t) \cdot \frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{3} \int \frac{t^3}{t} dt \\ &= \frac{1}{3} t^3 \ln(t) - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} t^3 + C_2 \\ &= \boxed{\frac{1}{3} t^3 \ln(t) - \frac{1}{9} t^3 + C_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int h(t) dt &= \int \frac{e^t}{\sqrt{1-e^{2t}}} dt \\ u &= e^t \\ du &= e^t dt \quad 97 \end{aligned}$$

$$\int du =$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} \\
 &= \arcsin(u) + C_3 \\
 &= \arcsin(e^t) + C_3
 \end{aligned}$$

$$\therefore \left\langle te^t - e^t + C_1, \frac{1}{3} t^3 \ln(t) - \frac{1}{9} t^3 + C_2, \arcsin(e^t) + C_3 \right\rangle$$

2) Dada la posición $r(t) = t\hat{i} + \sin(3t)\hat{j} + \cos(3t)\hat{k}$

a) Encuentre la función de velocidad:

$$r'(t) = v(t) = \hat{i} + \cos(3t) \cdot 3\hat{j} + \sin(3t) \cdot 3\hat{k}$$

b) Encuentre la función de aceleración:

$$r''(t) = a(t) = \hat{0}\hat{i} - 3\sin(3t) \cdot 3\hat{j} + 3 \cdot 3\cos(3t)\hat{k}$$

c) Encuentre la función de rapidez:

$$\begin{aligned}
 |v(t)| &= \sqrt{(1)^2 + (3\cos(3t))^2 + (3\sin(3t))^2} \\
 &= \sqrt{1 + 9\cos^2(3t) + 9\sin^2(3t)} \\
 &= \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}
 \end{aligned}$$

3) Dada la función de aceleración:

$$a(t) = \left\langle e^t, \sin(t)\cos(t), \frac{1}{(t+1)^2} \right\rangle$$

$$v(0) = / 2 - 1 \rightarrow$$

$$v(0), \quad \dot{v}(0), \quad \ddot{v}(0)$$

$$r(0) = \langle 0, 2, 0 \rangle$$

a) Encontrar la función de aceleración:

$$\int a(t) dt = v(t)$$

$$a(t) = \left\langle \underbrace{e^t}_{f(t)}, \underbrace{\sin(t)\cos(t)}_{g(t)}, \underbrace{\frac{1}{(t+1)^2}}_{h(t)} \right\rangle$$

$$\int f(t) dt = \boxed{e^t + C_1}$$

$$\int g(t) dt = \int \sin(t)\cos(t) dt = \boxed{\frac{1}{2} \sin^2(t) + C_2},$$

$u = \sin(t)$
 $du = \cos(t)dt$

$$\int h(t) dt = \int \frac{1 dt}{(t+1)^2} = \int \frac{du}{u^2} = \frac{1}{-2+1} u^{-2+1} = -\frac{1}{u} = -\frac{1}{t+1} + C_3$$

$u = t+1$
 $du = 1 dt$

$$= -\frac{1}{t+1} + C_3$$

$$v(t) = \left\langle e^t + C_1, \frac{1}{2} \sin^2(t) + C_2, -\frac{1}{t+1} + C_3 \right\rangle$$

Encontrar constantes

$$r(0) = \langle 3, -1, 2 \rangle$$

$e^0 + C_1 = 3$ $1 + C_1 = 3$ $C_1 = 3 - 1$ $C_1 = 2$	$\frac{1}{2} \sin^2(0) + C_2 = -1$ $0 + C_2 = -1$ $C_2 = -1$
--	--

$$-\frac{1}{t+1} + C_3 = 2$$

$$-1 + C_3 = 2$$

$$C_3 = 2 + 1$$

$$C_3 = 3$$

función de velocidad:

$$v(t) = \left\langle e^t + 2, \frac{1}{2} \sin^2(t) - 1, -\frac{1}{t+1} + 3 \right\rangle$$

b) función posición:

$$\int v(t) dt = r(t)$$

$$v(t) = \left\langle \underbrace{e^t + 2}_{f(t)}, \underbrace{\frac{1}{2} \sin^2(t) - 1}_{g(t)}, \underbrace{-\frac{1}{t+1} + 3}_{h(t)} \right\rangle$$

$$\begin{aligned} \int f(t) dt &= \int (e^t + 2) dt \\ &= e^t + 2t + C_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int g(t) dt &= \frac{1}{2} \int (\sin^2(t) - 1) dt = -\frac{1}{2} \int \cos^2(t) dt = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int (1 - \cos(2t)) dt \\ &= -\frac{1}{4} \left(t - \frac{1}{2} \sin(2t) \right) + C_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int h(t) dt &= - \int \left(\frac{1}{t+1} + 3 \right) dt = -(\ln|t+1| + 3t) + C_3 \\ &= -\ln|t+1| + 3t + C_3 \end{aligned}$$

Encontrar constantes

$$r(0) = \langle 0, 2, 0 \rangle$$

$$e^0 + 2(0) + C_1 = 0 \quad | \quad 1 + 0 + C_1 = 0 \quad | \quad -\frac{1}{4} \left(0 - \frac{1}{2} \sin(2 \cdot 0) \right) + C_2 = 2$$

$$-\frac{1}{4} \cancel{0} + \cancel{\frac{1}{2} \sin(0)} + C_2 = 2$$

$$C_1 = -1$$

$$C_2 = 2$$

$$-\ln|t+1| + 3(t) + C_3 = 0$$

$$0 + 0 + C_3 = 0$$

$$C_3 = 0$$

función posición:

$$r(t) = \left\langle e^t + 2t - 1, -\frac{1}{4} \left(t - \frac{1}{2} \sin(2t) \right) + 2, -\ln|t+1| + 3t + 0 \right\rangle$$

4) Calcule la longitud de arco de la helice circular de la ecuación vectorial:

$$r(t) = \cos(t)\hat{i} + \sin(t)\hat{j} + t\hat{k}$$

desde el punto $(1, 0, 0)$ hasta el punto $(1, 0, 2\pi)$.

$$L = \int_a^b |r'(t)| dt$$

$$r'(t) = -\sin(t)\hat{i} + \cos(t)\hat{j} + \hat{k}$$

$$|r'(t)| = \sqrt{(-\sin(t))^2 + (\cos(t))^2 + (1)^2}$$

$$= \sqrt{\sin^2(t) + \cos^2(t) + 1}$$

$$= \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$L = \int_a^b \sqrt{2} dt = \sqrt{2} t \Big|_{a=0}^{b=2\pi}$$

$$= \sqrt{2} \cdot \{ 2\pi - 0 \} = \sqrt{2} \cdot 2\pi$$

$$\# P(1, 0, 0) \& Q(1, 0, 2\pi)$$

$$r(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle$$

$$x = \cos(t) \quad \cos(t) = 1 \rightarrow t = 0$$

$$y = \sin(t) \quad \sin(t) = 0 \rightarrow t = 0$$

$$z = t \quad t = 0 \rightarrow t = 0$$

$$\cos(t) = 1 \rightarrow t = 2\pi$$

$$\sin(t) = 0 \rightarrow t = 2\pi$$

$$t = 2\pi \rightarrow t = 2\pi$$

5) a) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - y^2}$

$$\begin{aligned} 1 - x^2 &\geq 0 & 1 - y^2 &\geq 0 \\ -x^2 &\geq -1 & -y^2 &\geq -1 \\ x^2 &\leq 1 & y^2 &\leq 1 \\ x &\leq \pm 1 & y &\leq \pm 1 \\ -1 &\leq x \leq 1 & -1 &\leq y \leq 1 \end{aligned}$$

D: $\mathbb{R}^2 - \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - x^2 \leq 0 \text{ & } 1 - y^2 \leq 0\}$

$$\begin{matrix} x=-1 \\ y \\ x=1 \end{matrix}$$

∴ El dominio está definido tal que:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (-1 \leq x \leq 1) \& (-1 \leq y \leq 1)\}$$



b) $g(x, y) = \frac{\sqrt{y - x^2}}{1 - x^2}$

$$y - x^2 \geq 0$$


$$y \geq x^2$$

$$1 - x^2 \neq 0$$

$$-x^2 \neq -1$$

$$x^2 \neq 1$$

$$x \neq \pm 1$$



∴ El dominio está definido tal que:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y \geq x^2) \& (x \neq \pm 1)\}$$

c) $h(x, y) = \frac{9}{9 - x - y}$

$$9 - x - y \neq 0$$


$$-x - y \neq -9$$

$$x + y \neq 9$$

$$\text{y} = 9 - x \quad \# \text{excluir}$$

∴ El dominio está definido tal que:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x + y \neq 9)\}$$



Capítulo 16

Trabajos #08

Tarea #8 Cálculo Multivariable

Entrega, jueves 05 de marzo

Nombre: _____ Carnet: _____

Tema:	1	2	3	4	5	Total
Puntos:	20	32	24	24	20	120
Nota:						

1. Encuentre dy/dx .

- (a) (10 pts.) $y \tan^{-1}(x) = x \sin^{-1}(y) + x^2 y^2$
 (b) (10 pts.) $yx + x^3 \ln y = (x^2 + y^2)^2$

2. Encuentre las derivadas parciales de z para las sigs. funciones implícitas.

- (a) (16 pts.) $\sin(xy) + \cos(yz) = \cot(zx)$
 (b) (16 pts.) $\sqrt{x^2y^2 + y^2z^2} = \frac{1}{x - 2y - 3z}$

3. Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto especificado.

- (a) (12 pts.) $z = \frac{2x + 3}{4y + 1}$, $(0, 0, 0)$
 (b) (12 pts.) $z = \sec(xy^2)$, $\left(\frac{\pi}{3}, 1, 2\right)$

4. Encuentre la aproximación lineal $L(x, y)$ de la función en el punto indicado.

- (a) (12 pts.) $z = \frac{x}{x + y}$, $(4, -2)$
 (b) (12 pts.) $z = e^{-xy} \sin(y)$, $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$

5. Encuentre las ecuaciones paramétricas de las rectas tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto indicado. L_1 es la tangente en la dirección de x y L_2 es la tangente en la dirección de y .

- (a) (10 pts.) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(3, 4)$
 (b) (10 pts.) $z = 2 \sin^2(3x - 2y) + 4 \cos^2(x + y)$, $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$

Recuerde encontrar una función vectorial para encontrar la recta tangente a la superficie $z = f(x, y)$.

Dirección-x	Dirección-y
$x = t$	$x = a$
$y = b$	$y = t$
$z = f(t, b)$	$z = f(a, t)$