

ecuaciones diferenciales

David Corzo

2021 January 11

Índice general

1. Introducción a las EDs	3
1.1. Introducción a las ecuaciones diferenciales	3
1.1.1. Definiciones	3
1.1.2. Orden de una ED	3
1.1.3. Ejercicios	4
1.1.4. Notaciones	4
1.1.5. Forma de una ED	4
1.1.6. Solución de una ED	4
1.1.7. Ejercicio 2	4
1.1.8. Soluciones triviales	5
1.1.9. Infinitas soluciones	5
1.1.10. 2 tipos de soluciones para una ED	6
1.1.11. Ejemplo	6
1.1.12. Hay una correlación directa entre el orden de la ED y el número de constantes arbitrarias que resultan de la integración	6
1.1.13. Resolver el siguiente ejercicio	7
2. Problemas de valor inicial	8
2.0.1. Problema de valor inicial (PVI) de primer orden	8
2.0.2. PVI de 2do grado	8
2.0.3. Ejercicio 1: Encuentre la solución particular de las sigs EDs.	8
2.0.4. Resolución de una ED	9
2.0.5. ¿Cuándo un PVI tiene garantizada solución única?	9
2.0.6. Ejercicios	9
2.0.7. ED separable de primer orden	11
2.0.8. Ejercicio 3	11

Capítulo 1

Introducción a las EDs

1.1. Introducción a las ecuaciones diferenciales

- Def: una ecuación diferencial (ED) es una ecuación que contiene derivadas de una variable dependiente, generalmente y , respecto a una o más variables independientes, generalmente x o t .

- Ejemplo:

- crecimiento exponencial.

$$\frac{\partial y}{\partial t} = ky \implies y = f(t)?$$

- Enfriamiento de Newton:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K(T - T_m) \implies T?$$

- Deslizamiento:

$$ay'' + by' + cy = f(t)$$

- Logística:

$$y' = Ky(M - y)$$

- Objetivo: Encuentre una función $y(t)$ que satisfaga la ED.

1.1.1. Definiciones

- ED Ordinaria: la ec tiene derivadas respecto a una **sola** variable.

- Ejemplo de ED ordinaria:

$$y''' + zy'' + y' + y = x^3$$

- ED parcial: la ec tiene derivadas parciales respecto a dos o más variables.

- Ejemplo de ED parcial: ec de calor.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 u}{\delta y^2}$$

1.1.2. Orden de una ED

- el orden de la mayor derivada en la ED.

- ED orden 3:

$$\frac{d^3 y}{dx^3} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^4 = \sin(x)$$

1.1.3. Ejercicios

Clasifique el orden de cada ED:

1. ED 1er orden.

$$\frac{dy}{dx} = Kx^2y^2$$

2. ED 2do grado.

$$p'' = zpp'$$

3. ED 3er orden.

$$y'y''' + 2y'' + \alpha y' + \beta y = \sin(x)e^{-2x}$$

4. ED 2do orden.

$$y(y'')^6 + 5(y')^2 = 0$$

1.1.4. Notaciones

- Notación prima: $y', y'', y^{(n)}$
- Notación Leibni: $\frac{dy}{dt}, \frac{d^2y}{dt^2}, \dots, \frac{d^ny}{dt^n}$

1.1.5. Forma de una ED

- ED de orden n: ponga las derivadas como variables.

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad \text{encuentre } y?$$

- ED en su forma normal o estándar.
 - Sólo la derivada más grande se encuentra en el lado izquierdo.

$$y^{(n)} = g(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

1.1.6. Solución de una ED

- Solución: una función $y = \phi(x)$ que tiene n derivadas continuas y satisface la ecuación diferencial.
- La idea es meter la función $y = \phi(x)$ en la ED y solucionarla.

1.1.7. Ejercicio 2

Verifique que $y(t)$ es una solución de la ED dada.

- $\frac{dy}{dt} + 20y = 24$. Solución: $y(t) = \frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t}$.

Derivar la solución:

$$y'(t) = +\frac{6}{5} \cdot 20e^{-20t}$$

Reemplace y' y y en la ED.

$$24e^{-20t} + 24 - 24e^{-20t} = 0$$

$$24e^{-20t} + 20\left(\frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t}\right) = 24$$

- $y'' + 4t = 0$. Solución: $y(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$ c_1, c_2 son constantes.

Derivamos dos veces (por el orden) la solución.

$$y' = -2c_1 \sin(2t) + 2c_2 \cos(2t)$$

$$y'' = -4c_1 \cos(2t) - 4c_2 \sin(2t)$$

Sustituir la segunda derivada en el problema original.

$$4c_1 \cos(2t) - 4c_2 \sin(2t) + 4(c_1 \cos(2t)) + c_2 \sin(2t) = 0$$

$$\cancel{4c_1 \cos(2t)} - \cancel{4c_2 \sin(2t)} + \cancel{4(c_1 \cos(2t))} + \cancel{c_2 \sin(2t)} = 0$$

$$0 = 0 \quad y(t) \text{ es la soln de la ED.}$$

1.1.8. Soluciones triviales

- Soln trivial: una ED tiene soln trivial si la función cero $\phi(x) = 0$ es una de sus soluciones.
- Ejemplo de no tener solución trivial:

$$y' + 20y = 24$$

$$y = 0, \quad y' = 0 \quad 0 + 20 \cdot 0 = 0 \neq 24$$

- Ejemplo de tener solución trivial:

$$y'' + 4y = 0$$

$$y = y'' = 0 \quad 0 + 4 \cdot 0 = 0 = 0$$

1.1.9. Infinitas soluciones


- Una ED puede tener infinitas soluciones.
- Considere la ED: $\frac{dy}{dx} = f(x)$.
 - La integral de y' :

$$\int \frac{dy}{dx} dx = \int f(x) dx$$

$$y = \int f(x) dx = F(x) + C$$

- y' dependiente. x independiente
- La solución de esta ED es la antiderivada de $f(x)$.
- Hay infinitas soluciones: $y = F(x) + C$

- La familia de soluciones de la ED es: $F(x) + C$.
- Entonces necesitamos encontrar el valor de C .



- No sólo se encuentra $F(x)$ sino también el valor de C .

1.1.10. 2 tipos de soluciones para una ED

- La solución general: la solución contiene constantes arbitrarias c_1, c_2, \dots, c_n . (infinitas soluciones)
- La solución particular: la solución no contiene constantes arbitrarias. (solución única)

1.1.11. Ejemplo

1. $\frac{dy}{dt} + 20y = 24$

$$y(t) = \frac{6}{5} + \frac{6}{5}e^{-20t}$$

Solución particular de la ED.

2. $\frac{d^2y}{dt^2} + 4y = 0$

$$y(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$$

Solución general.

1.1.12. Hay una correlación directa entre el orden de la ED y el número de constantes arbitrarias que resultan de la integración

- En general la solución general de una ED depende del orden de la ecuación diferencial.
- ED 1er orden: 1 constante arbitraria.
- ED 2do orden: 2 constantes arbitrarias.
- ED n-ésimo orden: n constantes arbitrarias.

1.1.13. Resolver el siguiente ejercicio

■ $\frac{dy}{dt} + 20y = 24$

$$\frac{dy}{dt} = 24 - 20y$$

$$\underbrace{\int \frac{dy}{24 - 20y} = \int dt = \ln|y + b| + C}_{\text{Recordar: } \int \frac{dy}{y+b}}$$

$$-\frac{1}{20} \ln(24 - 20y) = t + C \quad \implies \quad \text{ya no hay derivadas entre y}$$

$$24 - 20y = e^{-20t-20C}$$

$$-20y = -24 - e^{-20t-20C}$$

$$y = \frac{6}{5} + \frac{1}{20}e^{-20t-20C}$$

Tenemos una solución general, nos deben dar una condición inicial para sacar la solución particular.

Capítulo 2

Problemas de valor inicial

- EDs 1er orden:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = e^x \sin(y)$$

- Solución general:

$$\phi(x, y) + C$$

- Solución particular: son libres de constantes.

Son necesarias condiciones en la variable $y(x_0) = y_0$ y sus derivadas para no tener constantes arbitrarias.

2.0.1. Problema de valor inicial (PVI) de primer orden

- Es una ED de 1er orden con una condición inicial.

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

2.0.2. PVI de 2do grado

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x, y, y'), \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = V_0$$

En física, tienen la aceleración y'' y quieren encontrar el desplazamiento. Se necesita la posición inicial $y(0) = y_0$ y la velocidad inicial $y'(0) = V_0$.

2.0.3. Ejercicio 1: Encuentre la solución particular de las sigs EDs.

- $y' = y - y^2$, $y(-1) = 5$ Use la solución general: $y(x) = \frac{1}{1 + ce^{-x}}$

- Recordar que lo único que tenemos que hacer es encontrar la constante de la solución general.

Use: $x = -1$, $y = 5$ para encontrar el valor de C.

$$\frac{1}{1 + ce^1} = 5 \implies 1 + ce^1 = \frac{1}{5}$$

$$ce = \frac{1}{5} - 1 \implies c = -\frac{4}{5e}$$

$$\text{Solución particular: } y(x) = \frac{1}{1 - \frac{4}{5e}e^{-x}}$$

- $u'' + u = 0$, $u(\pi/2) = 2$, $u'(\pi/2) = 5$ Use la solución general $u = c_1 \sin(x) + c_2 \cos(x)$.

$$u' = c_1 \cos(x) - c_2 \sin(x)$$

Aplice cada una de las CIs.

$$u(\pi/2) = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 0 \implies c_1 = 2$$

$$u'(\pi/2) = c_1 \cdot 0 - c_2 \cdot 1 = 5 \implies c_2 = -5$$

Solución particular: $u(x) = 2 \sin(x) - 5 \cos(x)$

2.0.4. Resolución de una ED

Casos:

1. Solución única.
 2. Infinitas soluciones.
 3. No hay solución, ocurre en un PVI (usualmente cuando se ponen condiciones imposibles).
- No todos los problemas con valor inicial con condiciones tienen soluciones únicas.
 - Por ejemplo: $\frac{dy}{dt} = 3y^{2/3}$ sujeta a $y(0) = 0$ tiene por lo menos 2 soluciones. $y(t) = 0$ $y(t) = t^3$.
 - ¿Cómo sabemos que es t^3 ?

$$\frac{dy}{3y^{2/3}} = dt \quad \text{integrar.}$$

$$\int \frac{1}{3} y^{-2/3} dy = \int dt$$

$$\frac{3}{3} y^{1/3} = t + c$$

$$y = (t + c)^3 \quad \text{Solución general}$$

$$0 = (0 + c)^3 \implies c^3 = 0 \implies c = 0$$

$$\text{Solución particular: } y = t^3$$

2.0.5. ¿Cuándo un PVI tiene garantizada solución única?

- El problema de valor inicial de primer orden $y' = f(x, y)$ $y(x_0) = y_0$ tiene garantizada una solución única si $f(x, y)$ y $\frac{\delta f}{\delta y}$ son continuas en (x_0, y_0) .

2.0.6. Ejercicios


Ejercicio 2a: Encuentre y grafique los puntos (x, y) donde la solución única del PVI está garantizada.

- $y' = y - y^2$

$f(x, y) = y - y^2$ es continua en \mathbb{R}^2

$\frac{\delta f}{\delta y} = 1 - 2y$ es continua en \mathbb{R}^2 (plano)

La solución única está garantizada en: $-\infty < x < \infty \quad -\infty < y < \infty$



■ $y' = 3y^{2/3}$

$f(x, y) = 3y^{2/3}$ es continua en \mathbb{R}^2

Pero: $\frac{\delta f}{\delta y} = \frac{3 \cdot 2}{3} y^{-1/3} = \frac{2}{y^{1/3}}$

No es continua en $y = 0$. No hay solución garantizada si $y = 0$ (x, y), $y \neq 0$.

■ $y' = \frac{\sqrt{y^4 - 16}}{x}$

- Evite números negativos.
- Evite denominador igual a cero.


$f(x, y) = \frac{\sqrt{y^4 - 16}}{x}$ no es continua en $x=0$ & $-2 \leq y \leq 2$

$y^4 - 16 \geq 0 \implies y^4 \geq 16 \implies -2 \leq y \leq 2$

Adicionalmente: $\frac{\delta f}{\delta y} = \frac{1}{x} (y^4 - 16)^{-1/2} \frac{1}{2} 4y^3$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y^3}{x\sqrt{y^4 - 16}}$ se indefine en: ± 2

Solución garantizada si $x \neq 0 \quad -2 \leq y \leq 2$



2.0.7. ED separable de primer orden

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

- el lado derecho es un producto de dos funciones en x y en y .
- ED lineal de 1er orden.

$$a(x)\frac{dy}{dx} + b(x)y = c(x)$$

- Las funciones coeficientes a, b, c sólo dependen de x .

$$\frac{dy}{dx} \quad \& \quad y \quad \text{sólo tienen potencias de uno.}$$

- ED exacta:

$$Mdy + Ndx = 0 \quad \frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial y}$$

- Una ED de 1er orden $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ se puede escribir usando diferenciales. La idea es tratar el dy, dx como una fracción.

$$dy = f(x, y)dx \quad \implies \quad dy - f(x, y)dx = 0$$

2.0.8. Ejercicio 3

Determine si la ED dada es lineal o es separable.

1. $(y - x^2)dx + 4ydy = 0$

$$(y - x^2)dx + 4ydy = 0$$

$$(y - x^2) + 4x\frac{dy}{dx} = 0$$

$$4x\frac{dy}{dx} = x^2 - y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - y}{4x} \quad \implies \quad \text{No es separable por el término } x^2 - y$$

- Pero sí es lineal.

$$4x \frac{dy}{dx} + y = x^2$$

$$a(x) = 4x, \quad b(x) = 1, c(x) = x^2$$

$$2. \quad ydx + (x + xy + e^y)dy = 0$$

$$y + \underbrace{(x + xy + e^y)}_{a(x)} \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{No es lineal.}$$

$$(x + xy + e^y) \frac{dy}{dx} = -y \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{(x + xy + e^y)} \quad \text{No es separable.}$$

$$3. \quad ydx + (xxye^y)dy = 0$$

$$x^2 ye^y \frac{dy}{dx} + y = 0 \quad \text{No es lineal.}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y}{x^2 ye^y} = -\frac{1}{x^2 e^y} = \left(-\frac{1}{x^2}\right) \left(\frac{1}{e^y}\right) \quad \text{Es separable.}$$

Separe en términos de x & de y .

$$e^y dy = -\frac{1}{x^2} dx$$

$$\int e^y dy = \int -x^{-2} dx$$

$$e^y + c_1 = x^{-1} + c_2$$

$$y = \ln \left(c_2 - c_1 + \frac{1}{x} \right) \quad \implies \quad \text{Solución general.}$$