

Föreläsning 4

Derivata

Enkelderivata

Partialderivata

Tangentplan

Högre ordningars derivator

Kedjeregeln

Kedjeregeln för en variabel

Kedjeregeln för två variabler

Kedjeregeln för flera variabler

Kedjeregeln i flera led


Derivata för reellvärda funktioner

Enkelderivata


Derivatan av funktionen $f(x)$ i $x=a$ definieras som

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$


Derivatan anger lutningen av tangenten till $y=f(x)$ i punkten $x=a$.




① Funktionskurvan $y=f(x)$ har en tangent genom punkten $(a, f(a))$.



② Bilda kordan genom punkterna $(a, f(a))$ och $(a+h, f(a+h))$.



③ Kordans lutning är $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$



④ Låt $h \rightarrow 0$ och då kommer kordans lutning närma sig tangentens lutning


$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Partialderivata


För en reellvärd funktion $f(x,y)$ definieras partialderivatorna av f i punkten (a,b) som

$$f'_x(a,b) = \frac{d}{dx} f(x,b) \Big|_{x=a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}$$


$$f'_y(a,b) = \frac{d}{dy} f(a,y) \Big|_{y=b} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a,b+k) - f(a,b)}{k}$$




- ① Håll $y=b$ fix och låt x variera. Då får vi en funktion $f(x,b)$ som bara beror på x .



- ② Derivatan av $f(x,b)$ i $x=a$ betecknas $f'_x(a,b)$ och anger tangentens lutning i x -led.



- ③ Håll $x=a$ fix och låt y variera. Då får vi en funktion $f(a,y)$ som bara beror på y .



- ④ Derivatan av $f(a,y)$ i $y=b$ betecknas $f'_y(a,b)$ och anger tangentens lutning i y -led.



Övning 1: Beräkna partialderivatorna av $f(x,y) = xy + x^2$ i $(x,y) = (2,0)$.

Övning 2: Bestäm partialderivatorna av $f(x,y,z) = \ln(1 + e^{xyz})$.

Tangentplan

En normal \bar{n} till tangentplanet för funktionsytan $z = f(x, y)$ i $(x, y, z) = (a, b, f(a, b))$ ges av


$$\begin{aligned}\bar{n} &= (1, 0, f'_x(a, b)) \times (0, 1, f'_y(a, b)) \\ &= (-f'_x(a, b), -f'_y(a, b), 1).\end{aligned}$$




⑤ Vi har två vektorer \bar{u} och \bar{v} som är parallella med tangentplanet.

⑥ Deras kryssprodukt är alltså en normal till planet.


Exempel 1: Bestäm en ekvation för tangentplanet till $z = x^2y + xy^3 - x + 1$ i punkten $(1, 1, 2)$.




① Parametrisera kurvan på funktionsytan ovanför linjen $y = b$,
 $\bar{r}(t) = (t, b, f(t, b))$.



② Riktningsvektorn
 $\bar{u} = \bar{r}'(a) = (1, 0, f'_x(a, b))$
är en tangentvektor till ytan i punkten $(a, b, f(a, b))$.



③ Parametrisera kurvan på funktionsytan ovanför linjen $x = a$,
 $\bar{r}(t) = (a, t, f(a, t))$.



④ Riktningsvektorn
 $\bar{v} = \bar{r}'(b) = (0, 1, f'_y(a, b))$
är en tangentvektor till ytan i punkten $(a, b, f(a, b))$.

Exempel 2: Bestäm normallinjen (i parameterform) till ytan $z = x^2 + y^2$ i punkten $(1, 1, 2)$.

(Normallinjen = den linje som går genom punkten $(1, 1, 2)$ och är vinkelrät mot ytan i den punkten.)

Högre ordningars derivator

För en reellvärd funktion $f(x, y)$ definieras andra ordningens partialderivator av f i punkten (a, b) som

$$f''_{xx}(a, b) = \frac{\partial}{\partial x} f'_x(x, y) \Big|_{\substack{x=a \\ y=b}}$$

$$f''_{xy}(a, b) = \frac{\partial}{\partial y} f'_x(x, y) \Big|_{\substack{x=a \\ y=b}} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Derivera först } x \text{ och} \\ \text{därefter } y \end{array}$$

$$f''_{yx}(a, b) = \frac{\partial}{\partial x} f'_y(x, y) \Big|_{\substack{x=a \\ y=b}} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Derivera först } y \text{ och} \\ \text{därefter } x \end{array}$$

$$f''_{yy}(a, b) = \frac{\partial}{\partial y} f'_y(x, y) \Big|_{\substack{x=a \\ y=b}}$$

Övning 3: Bestäm andra ordningens partialderivator av $f(x, y) = x^2y + 3y^3 + x$.

Om en funktion är tillräckligt deriverbar spelar det ingen roll i vilken ordning deriveringar sker.

Om $f(x,y)$ är två gånger kontinuerligt deriverbar i punkten (a,b) , då är

$$f''_{xy}(a,b) = f''_{yx}(a,b).$$

Övning 4: Funktionen $f(x,y,z)$ är fem gånger kontinuerligt deriverbar. Para ihop derivator som är lika.

$$f''''_{xyxzy}$$

$$f''''_{zxzxz}$$

$$f''''_{yyxzy}$$

$$f''''_{yyxzx}$$

$$f''''_{xzyyx}$$

$$f''''_{xxzzx}$$

Kedjeregeln för reellvärda funktioner

Eftersom elementära funktioner byggs upp genom funktionssammansättning av enkla funktioner behövs en deriveringsregel för sammansättningar.

Deriva deriveringsregel kallas för kedjeregeln.


Kedjeregeln för en variabel

Betrakta sammansättningen

$$t \mapsto x(t) \mapsto f(x(t)).$$

Om $f(x)$ och $x(t)$ är kontinuerligt deriverbara funktioner, då är

$$\frac{d}{dt} f(x(t)) = \overbrace{f'(x(t))}^{\text{yttre derivata}} \cdot \underbrace{x'(t)}_{\text{inre derivata}}$$



Vid varje steg i sammansättningen förlängs/förkortas små intervall med derivatan som skalfaktor. Hela sammansättningen får produkten av derivatorna som skalfaktor.

Övning 5: Skriv som en sammansättning och derivera med kedjeregeln

a) $\frac{d}{dt} \sqrt{1-3t^2}$

b) $\frac{d}{dt} f(t^2)$

c) $\frac{d}{dt} f(t^2 + h(t))$


Kedjeregeln för två variabler

Betrakta sammansättningen

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \mapsto f(x(t), y(t))$$

Om $f(x, y)$, $x(t)$ och $y(t)$ är kont. deriverbara funktioner, då är

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = \overbrace{f'_x(x, y) x'(t) + f'_y(x, y) y'(t)}^{\text{yttre derivator}} \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{inre derivator}}$$



små intervall förlängs/förkortas med derivatan som skalfaktor.
Vid det sista steget i sammansättningen förlängs/förkortas de två intervallen Δx och Δy med faktorn $f'_x(x, y)$ resp. $f'_y(x, y)$ och adderas för att ge intervallet efter avbildning med $f(x, y)$.

Exempel 3: Beräkna $\frac{d}{dt}(t^2 + t^3)$

a) direkt

b) med kedjeregeln

Övning 6: Bestäm $\frac{d}{dt} f(t^2, t^3)$, där $f(x, y) = xy$.

a) genom att bestämma $f(t^2, t^3)$
och sedan derivera.

$$f(t^2, t^3) =$$

$$\frac{d}{dt} f(t^2, t^3) =$$

b) Med kedjeregeln

$$x(t) =$$

$$y(t) =$$

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) =$$

Exempel 4: Bevisa produktregeln

$$\frac{d}{dt} (f(t)g(t)) = f'(t)g(t) + f(t)g'(t).$$

Kedjeregeln för flera variabler

Allmänt gäller för sammansättningen

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} \mapsto f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$$

där alla funktioner är differentierbara att

$$\frac{d}{dt} f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$$

$$= f'_{x_1}(x_1, \dots, x_n) x'_1(t) + \dots + f'_{x_n}(x_1, \dots, x_n) x'_n(t).$$


Kedjeregeln i flera led

När ett uttryck är sammansatt i flera led måste kedjeregeln användas upprepade gånger.

Variabelträd



Ett hjälpmedel för att visa hur ett komplext uttryck är uppbyggt är att rita ett variabelträd.

$$f(x(s,t), y(s,t), z(s, u(t)))$$



① Antag att vi har ovanstående uttryck.

② Vi börjar med att rita ut variablerna f primärt beror av.



③ Variablerna x , y och z beror i sin tur på variablerna s , t och u .

④ Till sist beror variabeln u på t .

Övning 7: Rita ett variabelträd till följande uttryck.

a) $f(u(s), v(s, t))$

b) $g(f(h(t)), u(s, t))$


c) $f(xy, x+y)$

d) $f(xg(x, y), yh(x))$

Kedjeregeln


Kedjeregeln medför att varje stig i trädet fram till variabeln ger en term i uttrycket för derivatan. Termen är en produkt av derivator som varje steg i stigen ger upphov till.

$$\frac{\partial}{\partial t} f(x(s,t), y(s,t), z(t))$$




① Vi ska bestämma ovanstående derivata.

② Rita upp variabelträdet.



③ Förbind f med stigar fram till alla t i trädet.



④ Varje stig motsvarar en produkt av partialderivator mellan varje nivå i trädet. Den sökta derivatan är summan av dessa.

Svar

Övning 1

$$f'_x(2,0) = 4 \quad (\text{eftersom } f'_x(x,y) = y+2x)$$

$$f'_y(2,0) = 2 \quad (\text{eftersom } f'_y(x,y) = x)$$

Övning 2

$$f'_x(x,y,z) = \frac{1}{1+e^{xyz}} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (1+e^{xyz}) = \frac{1}{1+e^{xyz}} \cdot yz e^{xyz}$$

$$f'_y(x,y,z) = \frac{xz e^{xyz}}{1+e^{xyz}}$$

$$f'_z(x,y,z) = \frac{xy e^{xyz}}{1+e^{xyz}}$$

Exempel 1

$$-2(x-1) - 4(y-1) + 1 \cdot (z-2) = 0 \Leftrightarrow 2x + 4y - z = 4$$

Exempel 2

$$(x,y,z) = (1,1,2) + t(-2,-2,1) \quad (t \text{ parameter})$$


Övning 3

$$f''_{xx}(x,y) = 2y$$

$$f''_{xy}(x,y) = f''_{yx}(x,y) = 2x$$

$$f''_{yy}(x,y) = 18y$$

Övning 4



Övning 5

a) $t \mapsto 1-3t^2 = u \mapsto \sqrt{u} = f$

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot (-6t) = \frac{-3t}{\sqrt{1-3t^2}}$$

b) $t \mapsto t^2 = u \mapsto f(u) = f$

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dt} = f'(u) \cdot 2t = 2tf(t^2)$$

c) $t \mapsto t^2 + h(t) = u \mapsto f(u) = f$

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dt} = f'(u) \cdot (2t + h'(t)) = f'(t^2 + h(t)) \cdot (2t + h'(t))$$

Exempel 3

a) $\frac{d}{dt}(t^2 + t^3) = 2t + 3t^2$

b) $t \mapsto \begin{pmatrix} t^2 \\ t^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto x + y = f$

$$\frac{df}{dt} = f'_x(x, y) \cdot x'(t) + f'_y(x, y) \cdot y'(t) = 1 \cdot 2t + 1 \cdot 3t^2$$

Övning 6

a) $f(t^2, t^3) = t^2 \cdot t^3 = t^5$

$$\frac{d}{dt} f(t^2, t^3) = \frac{d}{dt} t^5 = 5t^4$$

b) $x(t) = t^2, y(t) = t^3$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) &= f'_x(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + f'_y(x(t), y(t)) \cdot y'(t) \\ &= y \cdot 2t + x \cdot 3t^2 \\ &= t^3 \cdot 2t + t^2 \cdot 3t^2 \\ &= 5t^4 \end{aligned}$$


Exempel 4

$$t \mapsto \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto x \cdot y = h$$


$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(f(t)g(t)) &= \frac{d}{dt} h(x(t), y(t)) = h'_x x' + h'_y y' = y x' + x y' \\ &= g(t)f'(t) + f(t)g'(t). \end{aligned}$$

Övning 7


a)



b)




c)



$$(u=xy, v=x+y)$$

d)



$$(u=xg(x,y), v=yh(x))$$

Övning 8

$$a) \quad \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{du}{ds} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial s}$$

$$b) \quad \frac{\partial g}{\partial f} \cdot \frac{df}{dh} \cdot \frac{dh}{dt} + \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t}$$

$$c) \quad \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot y + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot 1$$

$$d) \quad \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial g} \cdot \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot x \cdot \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot h(x)$$