

TEMA 4 DE 12

Variación absoluta y porcentual

C_i = cantidad inicial · C_f = cantidad final

Variación absoluta

$$V_A = C_f - C_i$$

Variación porcentual

$$V_P = \frac{C_f - C_i}{C_i} \times 100 = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

Ejemplo

Al comenzar el mes teníamos 7.000 € en el banco; a mitad de mes tenemos 6.200 €.

$$V_A = 6200 - 7000 = -800 \text{ €} \quad V_P = \frac{-800}{7000} \times 100 = -11,43\%$$

Ejemplo

Calcular la variación porcentual entre cada dos años consecutivos de los ahorros de una persona.

Año	Ahorros (€)
2024	2.500
2025	2.000
2026	4.000

$$\frac{2000 - 2500}{2500} \times 100 = \frac{-500}{2500} \times 100 = -20\% \quad \frac{4000 - 2000}{2000} \times 100 = 100\%$$

Ejemplo

Un trabajador autónomo ha ganado 2.000 € un mes y 1.800 € el siguiente.

$$V_A = 1800 - 2000 = -200 \text{ € (menos que el mes anterior)}$$

$$V_P = \frac{1800 - 2000}{2000} \times 100 = -10\%$$

Ejemplo

Camiones descargados: 100.000 (2019) y 125.000 (2025).

$$V_A = 125000 - 100000 = 25000 \quad V_P = \frac{125000 - 100000}{100000} \cdot 100 = 25\%$$

Ejemplo

Variaciones absoluta y porcentual entre 1995 y 1980 (gráfica del apartado 10).

$$V_A = 1750 - 1500 = 250 \quad V_P = \frac{1750 - 1500}{1500} \cdot 100 = \frac{250}{1500} \cdot 100 = 16,67\%$$