

FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS
UNITÀ DI ALLERGOLOGIA

Via G. Moscati, 31/33 – 00168 Roma – Tel. 063503653

Roma, 24/11/2015

Sig.ra Martorella Anna

La paziente riferisce in anamnesi episodi reattivi in corso di terapia con metamizolo (Novalgina), nimesulide (Aulin), codeina ed idromorfone (Jurnista).

In attesa di una specifica indagine allergologica si consiglia di evitare i farmaci suddetti.

Come analgesici, antipiretici e/o antinfiammatori si potranno utilizzare paracetamolo (Tachipirina 1000 mg, 1 cpr), ketoprofene (Oki 80 mg, 1 cpr), ibuprofene (Moment 200 mg, 1cpr), etoricoxib (Algix ⁵⁰ 60 mg) e oxicodone cloridrato + naloxone cloridrato (Targin 10/5 mg, 1cpr) che la paziente riferisce di tollerare.

DIAGNOSI: Reazione avversa a metamizolo, nimesulide, codeina ed idromorfone. **TRAMADOLO**

Dott. Gabriele Rumi

Dott. Gabriele Rumi

Complesso Integrato Columbus
9051201642602132

UNITÀ DI ALLERGOLOGIA

COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Via G. Moscati, 31/33 - 00168 Roma - Tel. 063503653

Roma, 05/06/2015

Paziente: **Martorella Anna**

L'esame allergologico (cutireazioni) effettuato con mepivacaina (MepiMynol) è risultato negativo (lettura a 20 minuti).

Il progressive challenge test (test dose) effettuato con mepivacaina cloridrato (MepiMynol 30mg/ml) è risultato negativo. La paziente ha pertanto tollerato, sotto la nostra osservazione, una dose terapeutica di tale anestetico locale (1,8 ml s.c.), che potrà essere utilizzato in futuro.

Si segnala che, come antiinfiammatori non steroidei (FANS) la paziente riferisce tollerare dosi terapeutiche di etoricoxib (Algyx) e paracetamolo (Tachipirina).

Controllo tra un anno.

Diagnosi: Test per anestetico locale.

Dott. ROCCO LUIGI VALLUZZI

Medico Chirurgo

Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica



UNITÀ DI ALLERGOLOGIA

COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Via G. Moscati, 31/33 – 00168 Roma – Tel. 063503653

Archivio: 98 2015

Dott. Valluzzi

SCHEDA DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA PRIVATO SOCIALE

Paziente: Martorella Anna			
Nato a:	Roma	il:	12/11/1958
		Residente a:	Roma
Indirizzo:	Via conti 70		Telefono: 340 5508695

ANAMNESI PERSONALE

10 anni fa dopo aver assunto aspirina per sindrome influenzale metrorragia; nuovamente a distanza di qualche mese con sospensione dell'uso.

Nello stesso periodo dopo aver assunto novalgina gocce per dolore imprecisato dopo pochi minuti ipotensione e collasso cardiocircolatorio; ricovero ospedaliero con risoluzione entro pochi minuti senza terapia antireattiva. La riprende dopo pochi giorni con stessa sintomatologia e sospensione dell'uso.

7-8 anni fa assumeva aulin (nimesulide) per dolori osteoarticolari già preso in passato; a distanza di qualche ora si risveglia con capelli attorcigliati: sospende l'uso.

2011 dopo aver assunto contramal compresse da 150 mg dopo la prima compressa post intervento per menischi e rotula vertigini, ipotensione, obnubilamento del sensorio, vomito e nausea dopo qualche ora.

2013 dopo aver assunto toradol fiala in infusione con morfina nausea, vomito e senso di svenimento.

Nel 2014 con tachidol dopo qualche ora orticaria diffusa. Sospende remissione completa in qualche giorno.

Tollera etoricoxib e paracetamolo.

X

COGNOME E NOME Martorella Anna
ETÀ 59 anni
PROVENIENZA ambulatorio

Peso 65 Kg
Altezza 158 cm
Supf. Corp. 1,66 mq
BMI 26

EcocardiocolorDoppler transtoracico

Dati mono- e bidimensionali

Ventricolo sinistro

DTDVS	45 mm	(37-56)	Vol. TDVS	92 ml	(95±19)	(Simpson)
DTSVS	27 mm	(20-40)	Vol. TSVS	27 ml	(39±10)	
Fraz. accor.	40 %	(>30%)	FE	71 %		
DTDVS i	27 mm	(23-31)	Vol. TD i	56	(66±9)	
DTSVS i	16 mm	(14-21)	Vol. TS i	16	(27±5)	
R/S	1,04	(3±0.7)	Stress sist.	#DIV/0!		
Massa	153 g	(148±26)	Massa/Vol.	1,66		
i massa	92	(U125D110)	dist. E-setto			
Siv TD	10 mm		P.A.			
PP TD	10 mm		Siv TS			
			PP TS			

Atrio sinistro

Diam. A-P	30 mm	(<40)	Diam.S-I		(34-61)
Diam. A-P i		(16-24)	Diam.S-I i	0 mm	(23-35)

Mitrale

L. antmed.	normale	Area (>3.0cmq)
L. postlat.	normale	

Aorta

Radice	30 mm	(20-37)	Arco		(<30)
Radice i		(17±2)	Asc i	0 mm	(15±2)
Valvola aortica			N. cuspidi	tre	Morfologia normale
Apertura	18 mm	(15-26)	Orig.coron.	non visualizzabile	

Ventricolo destro

DTD	23 mm	(9-26)
Spess. Par.		(<5)
Morfologia	normale	

Atrio destro

Diam. trasv.
Diam. long.

Tricuspid: normale

Pericardio: versamento assente



