

Junio 2018

1. Debido a la acción simultánea de dos movimientos armónicos simples perpendiculares de igual frecuencia, una partícula describe, en el plano XY , una trayectoria elíptica centrada en el origen. Cuando la partícula se encuentra en el punto $\left(\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{1}{2}\right)$ mm, su aceleración es $-2\pi^2\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\vec{u}_x + \vec{u}_y\right)$ mm s⁻². Sabiendo que en ese punto, el vector $(\vec{u}_x - \vec{u}_y)$ es perpendicular a la trayectoria y apunta hacia el interior de la misma, determinar razonadamente:

- 1) La frecuencia de los dos movimientos armónicos simples que actúan sobre la partícula.
- 2) Las componentes intrínsecas de la aceleración en el punto $\left(\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{1}{2}\right)$ mm.

Marzo 2016

2. Una partícula describe un movimiento armónico simple de amplitud b y frecuencia angular $\frac{\pi}{3}$ rad s⁻¹, a lo largo del eje Z y en torno al origen de coordenadas. Sabiendo que el primer instante para el que $z = b$ es $t = \frac{1}{2}$ s, obtener razonadamente:

- 1) La velocidad de la partícula en el instante $t = \frac{5}{4}$ s.
- 2) Las posiciones de la partícula para las que su energía cinética es la octava parte de su energía potencial.

Enero 2019

3. Sobre una partícula actúan dos movimientos armónicos simples, ambos de frecuencia angular $\omega = 6\pi$ rad s⁻¹, en las direcciones de los ejes X e Y . Si en el instante inicial la partícula se encuentra en el punto de coordenadas $(5\sqrt{3}, 5)$ cm y su velocidad es $\vec{v} = 30\pi(-\vec{u}_x + \sqrt{3}\vec{u}_y)$ cm s⁻¹, obtener de forma razonada:

- 1) La expresión de la elongación de ambos movimientos armónicos simples.
- 2) Las componentes intrínsecas de la aceleración en el instante $t = \frac{1}{6}$ s.
- 3) Qué movimiento armónico simple, a lo largo de uno de los ejes coordenados, sería necesario superponer a los dos anteriores, para que la partícula describiera una trayectoria rectilínea en la dirección del eje Y . Considerando ésta trayectoria recta, determinar las componentes intrínsecas de la aceleración en el instante $t = \frac{1}{6}$ s.

Enero 2017

4. Una partícula está sometida a dos movimientos armónicos simples cuyas elongaciones son:

$$x = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm} \quad \text{e} \quad y = 3 \sin\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} \quad \text{donde } t \text{ se mide en s.}$$

De forma razonada:

- 1) Determinar los instantes de tiempo en los que la trayectoria de la partícula corta al semieje X positivo.

En los instantes obtenidos en el apartado anterior, calcular:

- 2) La velocidad y la aceleración de la partícula.
- 3) Las componentes intrínsecas de la aceleración.

Octubre 2017

5. Una partícula está sometida a dos movimientos armónicos simples cuyas elongaciones son:

$$y = \sin(2\pi t + \pi/2) \text{ mm} \quad y \quad z = -\sin 2\pi t \text{ mm}, \text{ donde } t \text{ se mide en s.}$$

De forma razonada, obtener:

- 1) La ecuación de la trayectoria descrita por la partícula.
- 2) Las componentes intrínsecas de la aceleración de la partícula en el instante $t = \frac{8}{3} \text{ s}$.
- 3) Si la energía cinética de la partícula es $40\pi^2 \text{ nJ}$, obtener su masa.

Marzo 2018

6. Una partícula de 30g de masa está sometida a la acción de dos movimientos armónicos simples cuyas elongaciones son $x_1 = 2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm}$ y $x_2 = 4\sin\left(2\pi t + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ cm}$, donde t se mide en s. De forma razonada:

- 1) Obtener la elongación resultante, indicando su amplitud y su fase inicial.
- 2) Calcular las energías cinética y potencial de la partícula cuando se encuentra a una distancia $\sqrt{3} \text{ cm}$ del origen, expresando el resultado en unidades fundamentales del Sistema Internacional.
- 3) Determinar los vectores velocidad y aceleración de la partícula en los puntos en los que su energía potencial es triple que su energía cinética.

Marzo 2015

7. Una partícula está sometida simultáneamente a dos movimientos armónicos simples paralelos de igual amplitud (2 cm) y frecuencia (0,1Hz), cuyas fases iniciales son $\varphi_1 = \pi/6$ y φ_2 ($0 < \varphi_2 < \pi$). Si la velocidad de la partícula cuando han transcurrido 5 s desde el inicio del movimiento es $-\frac{\pi\sqrt{3}}{5} \vec{u}_x \text{ cm s}^{-1}$, obtener razonadamente la elongación descrita por la partícula, indicando su amplitud y fase inicial.

Marzo 2017

8. Una partícula de 10g de masa está sometida a un movimiento armónico simple de elongación $x = 4\sin(10\pi t + \pi/4) \text{ mm}$, donde t se mide en s. Si, simultáneamente, se somete a la partícula a otro movimiento armónico simple de igual frecuencia, aplicado en la dirección del eje Y , se observa que la componente tangencial de la aceleración es nula en todo instante de tiempo. Sabiendo que en el instante inicial la velocidad de la partícula es paralela al vector $\vec{u}_x + \vec{u}_y$, determinar razonadamente:

- 1) La ecuación de la trayectoria y la expresión de la elongación del movimiento armónico simple en la dirección del eje Y , indicando su amplitud y su fase inicial.
- 2) La fuerza que actúa sobre la partícula en el instante $t = \frac{1}{24} \text{ s}$.

Julio 2015

9. Una partícula de masa m está sometida a una fuerza $F = -Cx$, donde C es una constante positiva. Obtener de forma razonada el periodo del movimiento, T .

En el instante $t = 0$ la energía cinética de la partícula es $15C/8$ y su velocidad es paralela al vector $-\vec{u}_x$ y en el instante $t = T/4$ la energía cinética de la partícula es $5C/8$ y su velocidad es paralela al vector \vec{u}_x . Obtener la elongación de la partícula, expresando la fase inicial entre 0 y 2π .

Enero 2018

10. Una partícula se encuentra sometida a la acción de dos movimientos armónicos simples perpendiculares, de periodo 8s. Sabiendo que en el instante inicial la posición de la partícula viene dada por

$\vec{r} = \sqrt{3} \vec{u}_x - \frac{3}{2} \vec{u}_z$ mm y que, transcurridos 4s, su velocidad es $\vec{v} = \frac{\pi}{4} \left(-\vec{u}_x + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{u}_z \right)$ mm s⁻¹, determinar

razonadamente:

- 1) Las elongaciones de ambos movimientos armónicos simples, indicando su amplitud y su fase inicial.
- 2) La ecuación de la trayectoria descrita por la partícula.
- 3) Las componentes intrínsecas de la aceleración cuando $t = 6$ s.

Junio 2014

11. Una partícula, sometida a la acción de dos movimientos armónicos simples, describe una trayectoria elíptica en el plano XY, cuyos semiejes no coinciden con los coordenados, siendo el periodo del movimiento $\frac{\pi}{3}$ s. Si en el instante inicial la partícula se encuentra en el punto $\left(-\frac{5}{2}, 0 \right)$ cm y su velocidad es

$\left(15\sqrt{3} \vec{u}_x - 24 \vec{u}_y \right)$ cm s⁻¹, obtener razonadamente la expresión del vector de posición en cualquier instante de tiempo.

Abril 2019

12. Una partícula, sometida simultáneamente a la acción de dos movimientos armónicos simples, describe la trayectoria $9x^2 + y^2 = 36$ (x e y en mm), con frecuencia angular 2π rad s⁻¹, siendo su posición en el instante inicial $(x, y) = (\sqrt{2}, -3\sqrt{2})$ mm. Considerando las fases iniciales de ambos movimientos armónicos simples comprendidas entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$, obtener razonadamente:

- 1) Las elongaciones de dichos movimientos armónicos simples.
- 2) La relación entre la energía cinética de la partícula cuando cruza el eje X y cuando cruza el eje Y.
- 3) Las componentes intrínsecas de la aceleración en el instante inicial.