

Ejercicios 1

Rodrigo Zepeda

28 de enero de 2020

1. Calidad de la información

Del Lohr capítulo 1 sección 1.7 (en comunidad) los ejercicios 6 al 15

2. Análisis Exploratorio de Datos

1. Obtén una expresión en fórmula matemática (como hicimos en clase) para los siguientes estadísticos para unos datos observados $\mathcal{S} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ donde por simplicidad asumiremos que si \mathcal{S} puede ser ordenado entonces $x_1 \leq x_2 \leq x_n$:

- a) El valor numérico o categoría menos común en \mathcal{S}
- b) El número de veces que la categoría o el número ℓ fue observado en \mathcal{S} (podría ser 0).
- c) La media de las diferencias entre las x_i quitando la de x_k consigo misma
- d) Este cálculo de R para una \mathcal{S} dada como vector numérico:

```
#S es la muestra; S <- c(x1,x2, ..., xn)
datos_nuevos <- c()
for (i in 1:length(S)){
  datos_nuevos <- c(datos_nuevos, S[i]^i)
}
mean(datos_nuevos) #Este valor es el que me interesa
```

2. **Pseudocódigo.** Escribe el pseudocódigo de funciones (una por inciso) que hagan lo siguiente para una muestra \mathcal{S} dada por $\mathcal{S} \leftarrow c(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - a) Calcule la moda.
 - b) Enliste todos los valores de \mathcal{S} que están después de la mediana (sin incluirla). Considera que hay al menos un valor después de la mediana y distinto a ella.
 - c) Calculen el rango.

- d) Calculen el MAD (desviación mediana absoluta).
e) Implemente una densidad kernel con núcleo triangular dado por:

$$K(x) = (1 - |x|)\mathbb{I}_{[-1,1]}(x)$$

y con h dada por el usuario.

3. Demuestra que:

$$\sigma_S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \mu_S^2$$

4. Demuestra que la media aritmética es mayor que la geométrica; es decir:

$$\mu_S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \geq \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n}$$

Hint:

- a) Primero demuestra que $f(x) = e^{x-1} - x$ es estrictamente convexa con mínimo cuando $x = 1$
b) Demuestra que $x \leq e^{x-1}$
c) Usa dicha desigualdad para probar que:

$$\prod_{i=1}^n \frac{x_i}{\mu_S} \leq \exp\left(\sum_{i=1}^n \left[\frac{x_i}{\mu_S} - 1\right]\right) \quad (1)$$

- d) Concluye despejando

5. Suponiendo que en unos datos observados (numéricos) $\mathcal{S} = \{x_1, \dots, x_n\}$ se tiene que las x toman el valor n_1 a_1 veces, el valor n_2 , a_2 veces y el valor n_k , a_k veces ($k \leq n$, $a_j > 0$ y $\sum_j n_j = n$)

- a) Demuestra que:

$$\mu_S = \frac{1}{\sum_{\ell=1}^k a_\ell} \cdot \sum_{j=1}^k n_j a_j \quad (2)$$

- b) Redefine la varianza usando las n_k , a_k

6. Sea n impar y f una función estrictamente creciente.

- a) Demuestra que si x_* es la mediana de $\mathcal{S} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ entonces $f(x_*)$ es la mediana de $\tilde{\mathcal{S}} = \{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$.
b) ¿Qué pasa si n es par y f es una función estrictamente creciente y lineal dada por $f(x) = ax + b$?
c) ¿Qué pasa si n es par y f es una función estrictamente creciente general?

7. Sea ϕ una función convexa. Demuestra que:

$$\phi\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i\right) \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \phi(x_i) \quad (3)$$

Hint Recuerda que si ϕ es convexa, para $0 \leq \alpha \leq 1$ se tiene que:

$$\phi(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha\phi(x) + (1 - \alpha)\phi(y) \quad (4)$$

8. De la tabla 1 calcula todo lo que se te pide de la variable calificaciones:

Persona	Calificación
1	10
2	5
3	6.75
4	10
5	6.5
6	3.25
7	6
8	9
9	7.5
10	100

Cuadro 1: Tabla de calificaciones de un salón

- a) La media
- b) La mediana
- c) La moda
- d) La varianza
- e) Una tabla de calificaciones normalizadas
- f) La MAD
- g) El rango
- h) El rango intercuartílico
- i) El cuantil 0.6
- j) El total
- k) La cantidad de valores mayores o iguales a 6
- l) La curtosis
- m) La asimetría
- n) La desviación estándar
- \tilde{n}) La media truncada en $d_1 = 2$ y $d_2 = 8$
- o) Mínimo y máximo

- p)* Elaborar un histograma con 3 **bins**
- q)* Elaborar un boxplot
- r)* La función de distribución acumulada empírica (y graficarla)
- s)* La función de densidad kernel evaluada en $x = 7$ con un kernel Epanechnikov y ancho de banda $h = 0.5$.