

ANALIZA MATEMATYCZNA

LISTA ZADAŃ 9

4.12.17

(1) Niech

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{7x} - 1}{x} & : x \neq 0, \\ 7 & : x = 0. \end{cases}$$

Oblicz $f'(0)$.

(2) Niech

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2} - 1}{\cos(x) - 1} & : x \neq 2k\pi, k \in \mathbf{Z}, \\ A & : x = 0. \end{cases}$$

Dla jakiego A istnieje $f'(0)$ i ile wynosi?

(3) Niech

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x} - 3e^x + 2}{x^2} & : x \neq 0, \\ A & : x = 0. \end{cases}$$

Dla jakiego A istnieje $f'(0)$ i ile wynosi?

(4) Oblicz pochodną rzędu 3 funkcji f danej wzorem:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} & (x+1)^6, & \text{(b)} \quad x^6 - 4x^3 + 4, \quad \text{(c)} \quad \frac{1}{1-x}, \\ \text{(d)} & x^3 \log x, & \text{(e)} \quad e^{2x-1}, \quad \text{(f)} \quad (x^2+1)^3, \\ \text{(g)} & e^{x^2}, & \text{(h)} \quad \log(x^2), \quad \text{(i)} \quad (x-7)^{50}. \end{array}$$

(5) Wyprowadź wzór na pochodną rzędu n funkcji f danej wzorem:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} & \log(x^{10}), & \text{(b)} \quad x \log(x), \quad \text{(c)} \quad \sqrt{x}, \\ \text{(d)} & \sin^2(x), & \text{(e)} \quad \frac{1-x}{1+x}, \quad \text{(f)} \quad xe^x, \\ \text{(g)} & \sin(5x), & \text{(h)} \quad x^7, \quad \text{(i)} \quad e^{4x}, \\ \text{(j)} & x + \frac{1}{x}, & \text{(k)} \quad x^2 e^{-x}. \end{array}$$

(6) Udowodnij, że

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$$

(7) Oblicz przybliżone wartości następujących liczb korzystając trzech początkowych wyrazów (zerowego, pierwszego i drugiego) odpowiednio dobranego szeregu Taylora. Oszacuj błąd przybliżenia na podstawie wzoru Taylora:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} & \sqrt{24}, & \text{(b)} \quad \sqrt[3]{126}, \quad \text{(c)} \quad \sqrt[7]{126}, \\ \text{(d)} & \sin(\frac{1}{10}), & \text{(e)} \quad \arctan(\frac{1}{10}), \quad \text{(f)} \quad \sqrt{50}. \end{array}$$