

在中国古代,“毒”与“药”原本是一个相同的概念,如《周礼·天官·冢宰》中就有“聚毒药以供医事”的记载,张景岳在《本草正》中亦云:“药以治病,以毒为能,所谓毒者,因气味之有偏也。……气味之偏者,药饵之属是也。所以去人之邪气,其为故也。……大凡可以避邪安正者,均可以称为毒药,故曰毒药故邪也。”这说明在中国古代存在着一个“毒”与“药”概念相同的时期。但随着古人中药知识的扩大和娴熟,古代的医家已看到了中药既有不具备毒副作用的一类,也有具备毒副作用、给人的身体带来极大危害、甚至伤及人的性命的一类,故开始将“毒药”从治病的中药中分离出来,将“毒药”一词重新定义为对“人体有伤害、并能引起毒副作用的药物”。本文所要考证的毒药即是五种常见的能伤及人的某种脏器及性命的狭义的毒药。

我国古代对毒药的记载可上溯到神农时期,因为神农遍尝百草,所以才有了“一日中七十毒”的记载;《山海经》里也记载有莽草、无条、芟等毒药及功用,马王堆汉墓出土的先秦医方书《五十二病方》里亦有了“毒董、雄黄、乌喙、半夏、黎芦”等毒药的记载。因为中药的来源包括动物、植物、矿物三大种类,所以毒药也分属于动物、植物、矿物这三大类别之中。而真正在古代经常用以毒害人的毒药又分为如下五种:乌头、鸩毒、鹤顶红、见血封喉、断肠草等,本文将分别考证之。

一、乌头

乌头,也叫董,也就是在《五十二病方》里提到的五种毒药之一“乌喙”,《尔雅翼》卷七云:“乌喙今之乌头也,《释草》云芟草,郭璞云即乌头也。今江东呼为董。”《诗经稊注》卷三认为董草分为六种,其中“乌头”即是董草之一,也是最毒的一种:“乌头苗五也,又名孩儿菊,……诸董之中,乌头苗和董有大毒,入口即死。乌头者射罔也,无人敢尝之者。”《春秋左传要义》卷十四云:“驪姬鸩酒董肉,公不怪其六日不斂。驪姬受乃置酖于酒置董于肉。贾逵云:董,乌头也。”这是说驪姬要陷害公子申生,所以将申生献给其父晋献公的酒里放了酖毒,将肉里放了乌头。《后魏书》云:“匈奴秋收乌头为毒药,以射禽兽。”也就是说,匈奴把乌头当成了军用毒药,一到秋天就大量地贮备着,用以献杀野兽。用现代的医药知识看,乌头含有多种生物碱,可导致突然加快心率、引发心律失常,或迅速使血压下降,还有抑制中枢神经和呼吸中枢的作用,因

此食用或伤口接触到乌头的人会产生呼吸困难、脉搏血压体温下降、心律紊乱等症状,不及时救治就会死亡。

二、鸩毒

鸩毒也叫酖毒,传说鸩是一种猛禽,比鹰大,鸣声大而凄厉。其羽毛有剧毒,用它的羽毛在酒里浸一下,酒就成了鸩酒,毒性很大,几乎不可以解救。另一种说法,鸩是食蛇鹰,因蛇有毒性,所以鸩的身体里才有了毒性。《尔雅翼》卷十六云:“鸩毒,鸟也,似鹰大如鸢,毛紫黑色,长颈,赤喙,……食腹蛇及橡食,知巨石大木间有蛇虺,……古人以其羽翻入酒中即杀人。凡鸩饮水处百虫吸之皆死。”《后汉书》卷十下记云:

“(阎姬)二年立为皇后,后专房妬忌,帝幸宫人李氏,生皇子保,遂酖杀李氏。”《宋书》卷四十六记云:“(张)伟少有操行,为晋琅玕王国郎中令,从王至洛还京都。武帝封药酒一甕付伟,令密加鸩毒,受命,于道,自饮而卒。”《大事记续编》卷五十六记有韦后和安乐公主鸩杀唐中宗的事件:“韦氏恐变生,安乐公主欲后临朝,而求为皇太女。丁丑遂鸩帝。六月壬午帝觉鸩发,召马秦客,因是又进鸩毒焉,帝遂崩于神龙殿。”可见此毒药是古代常用的毒药之一,《六家诗名物疏》卷四十六记载其毒性时云:“与鸩毒同类,非茶菜可食之类矣。”据史书记载,鸩毒可用犀牛角解之:“或得犀牛角,其中则水无毒。此鸟与犀相伏,今南方山川有此鸟处必有犀。”

三、鹤顶红

鹤顶红就是红信石,也叫信石、砒石、砒黄,是三氧化二砷的一种天然矿物,加工以后就是著名的砒霜,“鹤顶红”不过是古时候对红信石的一个隐晦的说法而已。《格致镜原》卷三十四云:“砒性猛如貔,故名。惟出信州,故人呼为信石。而为隐信字为人言。又言此乃锡之苗,故新锡器盛酒日久能杀人者,为有砒毒也。”信石加工的成品有红信及白信之分,药用红信石为主,信石提炼后会成为白色粉末,即砒霜,毒性更剧,人服之后两三分钟即死。《本草纲目》云:“信石,人言,生者为砒黄,炼者为砒霜。”明代康海撰《对山集》中“与王敬夫”一文有:“儿妇杨氏食砒

毒不逾时遂死”的记载,《江西通志》卷一百二中亦有彭泽烈妇查氏“暗怀砒霜于身,近万(其夫)卒即吞之毒发死”的记载。以现代的眼光看,砒进入人体后,会和蛋白质的巯基结合,使蛋白质变性失去活性,可以阻断细胞内氧化供能的途径。砒石砒霜毒性虽大,但却又是古人常用的一味中药,据说适

中国古代五大毒药考

□ 周利



量使用,可治疗贫血、痰厥、顽痹、疟疾等症,《儒门事亲》卷六“痰厥二十八条”云:“砒石寻常勿用,以其病大非如此莫能动焉。”《内科新说》:“信石有大毒,服之令胃热剧,骤生大炎,甚至溃烂而死,至痛至苦。信石虽有大毒,少用些微入药,则大有功力。”

四、见血封喉

又名毒箭木,剪刀树,国家保护的濒危植物,是世界上最毒的植物之一。其树汁乳白色,有剧毒性,汁液经伤口进入血液,就有生命危险,古人称之为“弩毒”,常把它涂在箭头上杀伤敌人,给伤者造成极大的痛苦。明代《御选明臣奏议》卷三十一有明代李颐的奏疏“条陈御倭事宜疏”云:“招募善射弩手,厚给安家路费,使人乐从。多则百名,少则数十名。各令广带弩药,盖弩药最毒,俗谓见血封喉,猛虎中之不数武而死。倭寇虽悍厉,未必人人如虎也。”而三国英雄关羽的“刮骨疗毒”有可能就是治疗这种毒箭木的毒,《晋志》卷九记曰:“关羽尝为流矢所中,贯其左臂,后创虽愈,每至阴雨骨常疼痛。医曰,矢镞有毒,毒入于骨,当破臂作创,刮骨去毒,然后此患乃除耳。”《广西通志》卷九十四“蒙光渐”条记载云:“救沿边多置强弩毒矢,以惧猺人。”可见见血封喉之毒性剧烈,杀伤力之大,所以才能使敌人闻风丧胆。这种树木至今仍然生长在云南西双版纳地区,属于桑科见血封喉属,其树型高大,枝叶四季常青,树汁树叶里都有剧毒,现代的化学分析显示,见血封喉树的毒液成分是见血封喉甙,具有强心,加速心律,增加心血输出量的作用,动物或人一般在中毒后20分钟至2小时内死亡。如果不小心将此树液

唐代帝王的降诞日礼俗考

□ 钟书林

降诞,是指皇帝或神佛的出生。本文所论的降诞专指皇帝。在中国封建社会,皇权至高无上,皇帝的诞辰自然举国庆贺。但这样的风俗,并非自古有之,而是起源于唐代玄宗时期,后来一直沿用到清朝。唐朝称皇帝诞辰的这一天为“诞节”,是举国欢庆的日子。宋代洪迈《容斋随笔》云:“古无降诞受贺之礼。诞节之制,起于明皇。”^[1]《旧唐书·玄宗本纪》记载:“开元十七年,上以降诞日,宴百僚于花萼楼下。百僚表请以每年八月五日为千秋节,王公已下献镜及承露囊,天下诸州咸令宴乐,休暇三日,仍编为令。从之。”自此后世相沿,寝成礼俗。

一

1.降诞日的时间、置节情况。唐朝帝王的降诞日,并不是任何一位都记载清晰。大体来说,以唐玄宗为分水岭,唐玄宗以前的几位帝王,降诞日时间不甚清晰,有些即使有所记载,也只能具体到年月;唐玄宗以后,大多能具体到月日。这归因于唐玄宗以后重视降诞节的结果。不过,尽管如此,古代学者对玄宗以后历代唐王的降诞日时间的记载也并非完备。王应麟《玉海》,从诞节角度,记载了九位帝王:肃宗、代宗、德宗、顺宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗、僖宗。《锦绣万花谷》也

记载了九位,不过与《玉海》稍异:少了懿宗,而多了哀宗。其实,从玄宗以后,至哀宗,一共是十五位帝王。今爬梳相关史料,将这十五位帝王的降诞日时间,依一年中时间的先后顺序加以排列,可以看到:

正月十二日(顺宗,圣寿节),二月十四日(宪宗,未设诞节),三月二十二日(昭宗,嘉会节),四月十九日(德宗,未设诞节),五月八日(僖宗,应天节),六月七日(敬宗,未设诞节),六月十二日(武宗,庆阳节),六月二十二日(宣宗,寿昌节),七月六日(穆宗,未设诞节),八月五日(玄宗,千秋节、天长节),九月三日(肃宗,地平天成节),九月三日(哀帝,乾和节),十月十日(文宗,庆成节),十月十三日(代宗,天兴节),十一月十四日(懿宗,延庆节)。

除十二月份外,从正月到十一月,每月都有帝王的降诞日,如果将每位帝王的诞日一直相延续的话,势必影响国家事务的日常管理。对此,德宗即位时,吏部尚书颜真卿奏

议说:“准《礼经》及历代帝王无降诞日,唯开元中始为之。复推本意:以为节者,喜圣寿无疆之庆,天下咸贺,故号节;若千秋万岁之后,尚存此日以为节假,恐乖本意。”^[2]颜真卿指出,帝王降诞日设节庆贺是可行的,但是在帝王去世之后,仍然保留他的诞节,恐怕是不合适的。这一奏议被德宗采纳。因此,从德宗朝开始,帝王的诞节不再延续,帝王去世,该帝王的诞节随之取消。这就大为减缓了国家每年庆祝诞节的压力,也巩固和加强了在位帝王的核心地位。

上述十五位帝王中,置诞节的占了一十一位之多,只有德宗、宪宗、穆宗、敬宗四朝不置诞节。到文宗朝以后,诞节庆祝活动渐趋完备。而且愈到唐朝末年,对降诞活动愈是讲究,对诞节的设置愈是热衷。唐玄宗先天元年(712)即位,开元十七年(729)才设诞节;文宗太和初年即位,太和七年才设诞节;德宗在位二十六年,未设诞节;宪宗在位年,也未设诞节。而相比之下,肃宗至德宗元年

溅进眼睛里,可以使眼睛顿时失明,甚至这种树在燃烧时,烟气入眼里,也会引起失明。

五、断肠草

又名钩吻、野葛、毒根、胡蔓草、除辛、黄藤、吻葛、甘尾、和堇等。《通志》卷七十五云:“钩吻曰除辛、曰毒根,折之青烟出者名固活,即野葛也。”据说神农当年采百草尝百草时,因尝过断肠草后腹痛不止死去,百姓心痛不已,故曰断肠草。《陕西通志》卷四十三云:“钩吻即胡蔓草,蔓生叶圆而光,春夏嫩苗毒甚,秋冬枯老稍缓。五六月开花数十朵做穗。吴普曰秦钩吻,一名除辛。”《诗经稗疏》卷三将其列为堇类之一,与乌头同类,云:“堇者其类不一也……似芹而叶有毛,误食杀人,一名断肠草。诸堇之中,乌头苗与和堇有大毒,入口即死。”《普济方》卷二百五十一有云:“二广山间有草曰胡蔓草,又名断肠草,若此药人,急水吞之急死,缓水吞之缓死。又取毒蛇杀之,以草覆上,以水洒之,数日菌生其上,取为末,酒调以毒入。始亦无患,再饮酒即毒发立死。”断肠草又名野葛,《旧唐书》列传第四十“袁恕己”传云:“(袁恕己)后为敬晖等累,遭贬黜流于环州,寻为周利贞所逼饮野葛汁数升,恕已常服黄金饵,毒发愤闷,以手掘地

取土而食,爪甲殆尽竟不死。乃击杀之。”可见断肠草毒发时的痛苦之状。因断肠草的毒性大,发作快,也常用做军事毒药来对付敌人,《资治通鉴》卷一百二十五记载了南北朝时刘宋与魏主之争,云:“又募人斋野葛酒置空村中,欲毒以魏人,竟不能伤,魏主凿步山为蟠道,于上为毡屋,魏主不饮河南水,以橐驼河北水自随。”正因为断肠草毒性大,所以它不仅常用以杀人,还被深知其毒性的草民百姓用以讹诈别人,《江西通志》卷七十八“杨渙”条云:“地产断肠草,顽民逞忿者取食之,以死诬人。”《宋史》列传六十一“王臻”传亦记下了野葛可毒杀人的史实:“福州闽人欲报仇或先食野葛,而后趋仇家求斗,即死其处以诬仇人”,此记载与上述杨渙传记中的记载相类似。所以古代的一些地方官员们下令让当地的百姓广泛采掘断肠草,深挖其根,想以此方法使断肠草不再生长,最后达到绝种。朝廷也曾制定过惩治以断肠草毒人的律条:“诏福建路有以野葛毒人者,徙其家岭北编管永不放还。”(《资治通鉴长编》卷一百二十)

现代植物学将断肠草归为罂粟科紫堇属,其有毒成分为胡蔓藤碱或次胡蔓藤碱,其根和叶毒性很大,尤其以嫩叶毒性最大,

人误食三、四片即会中毒而死,而猪羊食之适量却可以杀体内寄生虫,也可使毛色光滑。所以误食断肠草后可饮动物(羊、牛、鸽、鸡、鸭)的鲜血解其毒性,也可将土柚柑的果实捣碎,解其毒性。这与《广西通志》中的记载是一致的,《广西通志》卷三十一中记载:“断肠草一名苦蔓藤,即《周礼》所谓地黧是也。形似黄精,其花皎好似芙蓉,故太白诗云‘昔做芙蓉花,今为断肠草。’羊食其草而肥,故人中其毒者用羊血灌治。”断肠草也是中医常用的外用药物,可治毒蛇咬伤、化脓性中耳炎、牛皮癣等。

细读二十四史,会看到其中的许多真毒、毒杀、中毒的记录,但因为没写明其所使用的毒药种类,所以无法考证到底是哪种毒药。但可以证实的是,在中国古代,毒药是一种普遍使用,既可杀人伤人又有医药功能的药品,除了上述五种常用的毒药外,一定还有多种毒药存在着,因此,现代医学有对古代的毒药进一步深入研究的必要。

参考文献

- [1]朱棣.普济方[M].人民卫生出版社,1959.
- [2]司马光.资治通鉴[M].中华书局,1963.
- [3]谢启昆.广西通志[M].台北:文海出版社,1966.
- [4]邵晖.毒药本草[M].中国医药科技出版社,2004.

(作者单位:河南中医学院)