

Funcionales lineales:

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*



10 de noviembre de 2020

- 1 Funcionales lineales
- 2 Espacios vectoriales duales
- 3 Bases Duales
- 4 Transformaciones de Vectores y Covectores
- 5 Ejemplo: Cartensianas y Polares
- 6 Recapitulando

- Funcional lineal asocia un número complejo (o real) $\in \mathbf{K}$ a un vector $|v\rangle \in \mathbf{V}$ y cumple con:
 - $\forall |v\rangle \in \mathbf{V} \rightarrow \mathcal{F}[|v\rangle] \in \mathbb{C}$,
 - $\mathcal{F}[\alpha |v_1\rangle + \beta |v_2\rangle] \equiv \alpha \mathcal{F}[|v_1\rangle] + \beta \mathcal{F}[|v_2\rangle]$, $\forall |v_1\rangle, |v_2\rangle \in \mathbf{V}$ y $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{K}$.

- Funcional lineal asocia un número complejo (o real) $\in \mathbf{K}$ a un vector $|v\rangle \in \mathbf{V}$ y cumple con:
 - $\forall |v\rangle \in \mathbf{V} \rightarrow \mathcal{F}[|v\rangle] \in \mathbb{C}$,
 - $\mathcal{F}[\alpha |v_1\rangle + \beta |v_2\rangle] \equiv \alpha \mathcal{F}[|v_1\rangle] + \beta \mathcal{F}[|v_2\rangle]$, $\forall |v_1\rangle, |v_2\rangle \in \mathbf{V}$ y $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{K}$.
- Ejemplos de funcionales lineales
 - Un funcional lineal es la integral de Riemann $\mathcal{I}[f] = \int_a^b f(x)dx$
 - El producto interno constituye la expresión natural del funcional $\mathcal{F}_a[|v\rangle] \equiv \langle a | v \rangle \in \mathbb{C} \forall |v\rangle \in \mathbf{V}$.

- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^* . \mathbf{V} es el espacio directo y \mathbf{V}^* el espacio dual de \mathbf{V} . Si \mathbf{V} es de dimensión finita n , entonces $\dim \mathbf{V} = \dim \mathbf{V}^* = n$.

- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^* . \mathbf{V} es el espacio directo y \mathbf{V}^* el espacio dual de \mathbf{V} . Si \mathbf{V} es de dimensión finita n , entonces $\dim \mathbf{V} = \dim \mathbf{V}^* = n$.
- Aquellos espacios lineales con producto interno definido, el mismo producto interno constituye la expresión natural del funcional:
$$\mathcal{F}_a [|v\rangle] \equiv \langle a | v \rangle \quad \forall |v\rangle \in \mathbf{V} \quad \wedge \quad \forall \langle a | \in \mathbf{V}^*.$$

- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^* . \mathbf{V} es el espacio directo y \mathbf{V}^* el espacio dual de \mathbf{V} . Si \mathbf{V} es de dimensión finita n , entonces $\dim \mathbf{V} = \dim \mathbf{V}^* = n$.
- Aquellos espacios lineales con producto interno definido, el mismo producto interno constituye la expresión natural del funcional:
 $\mathcal{F}_a [|v\rangle] \equiv \langle a | v \rangle \quad \forall |v\rangle \in \mathbf{V} \quad \wedge \quad \forall \langle a| \in \mathbf{V}^*.$
- Se establece entonces una correspondencia 1 a 1 entre *kets* y *bras*, entre vectores y funcionales lineales (o formas diferenciales):
 $\lambda_1 |v_1\rangle + \lambda_2 |v_2\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_1^* \langle v_1| + \lambda_2^* \langle v_2|,$

- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^* . \mathbf{V} es el espacio directo y \mathbf{V}^* el espacio dual de \mathbf{V} . Si \mathbf{V} es de dimensión finita n , entonces $\dim \mathbf{V} = \dim \mathbf{V}^* = n$.
- Aquellos espacios lineales con producto interno definido, el mismo producto interno constituye la expresión natural del funcional:

$$\mathcal{F}_a[|v\rangle] \equiv \langle a | v \rangle \quad \forall |v\rangle \in \mathbf{V} \quad \wedge \quad \forall \langle a| \in \mathbf{V}^*.$$
- Se establece entonces una correspondencia 1 a 1 entre *kets* y *bras*, entre vectores y funcionales lineales (o formas diferenciales):

$$\lambda_1 |v_1\rangle + \lambda_2 |v_2\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_1^* \langle v_1| + \lambda_2^* \langle v_2|,$$
- Dada una base $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ para \mathbf{V} siempre es posible asociar una base ortonormal para \mathbf{V}^* de tal manera que:

$$|v\rangle = v^i |e_i\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \langle v| = v_i^* \langle e^i|, \quad \text{con } , \text{ entonces}$$

$$v^i \text{ son las } \mathbf{componentes contravariantes} \text{ de } |v\rangle \text{ y}$$

$$v_i \text{ son las } \mathbf{componentes covariantes} \text{ de } |v\rangle$$

- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^* . \mathbf{V} es el espacio directo y \mathbf{V}^* el espacio dual de \mathbf{V} . Si \mathbf{V} es de dimensión finita n , entonces $\dim \mathbf{V} = \dim \mathbf{V}^* = n$.
- Aquellos espacios lineales con producto interno definido, el mismo producto interno constituye la expresión natural del funcional:

$$\mathcal{F}_a[|v\rangle] \equiv \langle a | v \rangle \quad \forall |v\rangle \in \mathbf{V} \quad \wedge \quad \forall \langle a| \in \mathbf{V}^*.$$
- Se establece entonces una correspondencia 1 a 1 entre *kets* y *bras*, entre vectores y funcionales lineales (o formas diferenciales):

$$\lambda_1 |v_1\rangle + \lambda_2 |v_2\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_1^* \langle v_1| + \lambda_2^* \langle v_2|,$$
- Dada una base $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ para \mathbf{V} siempre es posible asociar una base ortonormal para \mathbf{V}^* de tal manera que:

$$|v\rangle = v^i |e_i\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \langle v| = v_i^* \langle e^i|, \quad \text{con } v^i \text{ y } v_i^* \text{ son las } \mathbf{componentes contravariantes} \text{ de } |v\rangle \text{ y } \langle v|$$

$$v_i \text{ son las } \mathbf{componentes covariantes} \text{ de } |v\rangle$$
- El producto interno es entre formas (covectores) y vectores

$$\langle a | b \rangle = \langle b | a \rangle^* = (b_i^* \langle e^i|) \cdot (a^j |e_j\rangle) = b_i^* a^j \delta_j^i = a^i b_i^* ;$$

- Dado un espacio vectorial $\mathbf{V} = \mathbb{C}^2$ con producto interno conectamos la base $\{|e_i\rangle\}$ de \mathbf{V} con la base $\{\langle e^j|\}$ de \mathbf{V}^* , con $\langle e^i | e_j \rangle = \delta_j^i$

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} \tilde{x}^1 + i\tilde{y}^1 \\ \tilde{x}^2 + i\tilde{y}^2 \end{pmatrix}; \text{ la base sería } |\tilde{w}_1\rangle = \begin{pmatrix} i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\tilde{w}_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}$$

Consideremos una definición de producto interno

$$\langle \tilde{a} | \tilde{b} \rangle = (a^1)^* b_1 + 2(a^2)^* b_2 \text{ la base dual será: } \langle \tilde{w}_1 | = (-i, 0) \text{ y } \langle \tilde{w}_2 | = (0, -i/2).$$

- Dado un espacio vectorial $\mathbf{V} = \mathbb{C}^2$ con producto interno conectamos la base $\{|e_i\rangle\}$ de \mathbf{V} con la base $\{\langle e^j|\}$ de \mathbf{V}^* , con $\langle e^i | e_j \rangle = \delta_j^i$

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} \tilde{x}^1 + i\tilde{y}^1 \\ \tilde{x}^2 + i\tilde{y}^2 \end{pmatrix}; \text{ la base sería } |\tilde{w}_1\rangle = \begin{pmatrix} i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\tilde{w}_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}$$

Consideremos una definición de producto interno

$$\langle \tilde{a} | \tilde{b} \rangle = (a^1)^* b_1 + 2(a^2)^* b_2 \text{ la base dual será: } \langle \tilde{w}_1| = (-i, 0) \text{ y } \langle \tilde{w}_2| = (0, -i/2).$$

- Consideremos un espacio vectorial complejo $\mathbf{V} = \mathbb{C}^3$, de la forma

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} x^1 + iy^1 \\ x^2 + iy^2 \\ x^3 + iy^3 \end{pmatrix} \text{ la base será}$$

$$|w_1\rangle = \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, |w_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}, |w_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ i \end{pmatrix}, \text{ y la base dual}$$

$$\langle w_1| = (-i, 0, 0), \langle w_2| = (0, -i, 0) \text{ y } \langle w_3| = (0, 0, -i).$$

- Los vectores con componentes contravariantes $\langle e^i | a \rangle = a^i$ serán representados como arreglos columnas

$$|a\rangle \Rightarrow a^i = \langle e^i | a \rangle \quad \text{con } i = 1, 2, 3, \dots, n \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^n \end{pmatrix}.$$

- Los vectores con componentes contravariantes $\langle e^i | a \rangle = a^i$ serán representados como arreglos columnas

$$|a\rangle \Rightarrow a^i = \langle e^i | a \rangle \quad \text{con } i = 1, 2, 3, \dots, n \quad \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^n \end{pmatrix}.$$

- Si existen otras bases $\{|\tilde{e}_j\rangle\}$ y $\{\langle \tilde{e}^i|\}$ en \mathbf{V} y \mathbf{V}^* , entonces las componentes de los vectores y formas, expresadas en esas bases, están relacionadas

$$\left. \begin{aligned} \langle e^i | a \rangle &= a^i \langle e^i | e_j \rangle = a^i \delta_j^i = \tilde{a}^j \langle e^i | \tilde{e}_j \rangle \\ \langle \tilde{e}^i | a \rangle &= \tilde{a}^i \langle \tilde{e}^i | \tilde{e}_j \rangle = \tilde{a}^i \delta_j^i = a^j \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} a^i = A_j^i \tilde{a}^j \\ \tilde{a}^i = \tilde{A}_j^i a^j, \end{cases}$$

$$\text{con } \langle e^i | \tilde{e}_j \rangle = A_j^i; \quad \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle = \tilde{A}_j^i \quad A_k^i \tilde{A}_j^k = \delta_j^i \Leftrightarrow \tilde{A}_j^i = \left(A_j^i\right)^{-1}.$$

- Los covectores o formas, con componentes *covariantes* $\langle b | e_i \rangle = b_i$, serán representadas como un arreglo tipo fila

$$\langle b | \Rightarrow b_i = \langle b | e_i \rangle \text{ con } i = 1, 2, 3, \dots, n \iff \left(\begin{array}{ccc} b_1 & \cdots & b_n \end{array} \right).$$

- Los covectores o formas, con componentes *covariantes* $\langle b | e_i \rangle = b_i$, serán representadas como un arreglo tipo fila

$$\langle b | \Rightarrow b_i = \langle b | e_i \rangle \text{ con } i = 1, 2, 3, \dots, n \iff \left(b_1 \quad \dots \quad b_n \right).$$

- Las componentes covariantes transforman de un sistema de referencia a otro mediante la siguiente ley de transformación:

$$\left. \begin{aligned} \langle b | e_j \rangle = b_i \langle e^i | e_j \rangle = b_i \delta_j^i = \tilde{b}_i \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle \\ \langle b | \tilde{e}_j \rangle = \tilde{b}_i \langle \tilde{e}^i | \tilde{e}_j \rangle = \tilde{b}_i \delta_j^i = b_i \langle e^i | \tilde{e}_j \rangle \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} b_j = \tilde{b}_i A_j^i \\ \tilde{b}_j = b_i \tilde{A}_j^i. \end{cases}$$

- Consideremos dos sistemas de coordenadas en el plano: Cartesianas $\{|i\rangle, |j\rangle\}$ y polares $\{|u_r\rangle, |u_\theta\rangle\}$. Entonces

$$|a\rangle = a_x |i\rangle + a_y |j\rangle = a_r |u_r\rangle + a_\theta |u_\theta\rangle ;$$

- Consideremos dos sistemas de coordenadas en el plano: Cartesianas $\{|i\rangle, |j\rangle\}$ y polares $\{|u_r\rangle, |u_\theta\rangle\}$. Entonces

$$|a\rangle = a_x |i\rangle + a_y |j\rangle = a_r |u_r\rangle + a_\theta |u_\theta\rangle ;$$

- Expresamos una base en términos de la otra como

$$|u_r\rangle = \cos(\theta) |i\rangle + \sin(\theta) |j\rangle \text{ y } |u_\theta\rangle = -\sin(\theta) |i\rangle + \cos(\theta) |j\rangle ,$$

- Consideremos dos sistemas de coordenadas en el plano: Cartesianas $\{|i\rangle, |j\rangle\}$ y polares $\{|u_r\rangle, |u_\theta\rangle\}$. Entonces

$$|a\rangle = a_x |i\rangle + a_y |j\rangle = a_r |u_r\rangle + a_\theta |u_\theta\rangle ;$$

- Expresamos una base en términos de la otra como

$$|u_r\rangle = \cos(\theta) |i\rangle + \sin(\theta) |j\rangle \text{ y } |u_\theta\rangle = -\sin(\theta) |i\rangle + \cos(\theta) |j\rangle ,$$

- Entonces $\langle \tilde{e}^i | e_j \rangle = \tilde{A}_j^i \Rightarrow$

$$\tilde{A}_j^i = \begin{pmatrix} \langle u_r | i \rangle & \langle u_r | j \rangle \\ \langle u_\theta | i \rangle & \langle u_\theta | j \rangle \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

y

$$\langle e^i | \tilde{e}_j \rangle = A_j^i = \begin{pmatrix} \langle i | u_r \rangle & \langle i | u_\theta \rangle \\ \langle j | u_r \rangle & \langle j | u_\theta \rangle \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Entonces, como

$$|a\rangle = a_r |u_r\rangle + a_\theta |u_\theta\rangle \equiv \tilde{a}^1 |\tilde{e}_1\rangle + \tilde{a}^2 |\tilde{e}_2\rangle = a_x |i\rangle + a_y |j\rangle \equiv a^1 |e_1\rangle + a^2 |e_2\rangle$$

$$\text{tendremos que } \tilde{a}^i = \tilde{A}_j^i a^j \iff$$

$$\begin{pmatrix} a_r \\ a_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x \cos(\theta) + a_y \sin(\theta) \\ -a_x \sin(\theta) + a_y \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

con lo cual

$$a_r = a_x \cos(\theta) + a_y \sin(\theta) \quad \text{y} \quad a_\theta = -a_x \sin(\theta) + a_y \cos(\theta).$$

$$\text{Del mismo modo } a^i = A_j^i \tilde{a}^j \iff$$

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_r \\ a_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_r \cos(\theta) - a_\theta \sin(\theta) \\ a_r \sin(\theta) + a_\theta \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

y

$$a_x = a_r \cos(\theta) - a_\theta \sin(\theta) \quad \text{y} \quad a_y = a_r \sin(\theta) + a_\theta \cos(\theta).$$

- Definición de funcional lineal $\mathcal{F}[|v\rangle] \in \mathbb{C}$ con
 $\mathcal{F}[\alpha |v_1\rangle + \beta |v_2\rangle] \equiv \alpha \mathcal{F}[|v_1\rangle] + \beta \mathcal{F}[|v_2\rangle]$

- Definición de funcional lineal $\mathcal{F}[|v\rangle] \in \mathbb{C}$ con
 $\mathcal{F}[\alpha |v_1\rangle + \beta |v_2\rangle] \equiv \alpha \mathcal{F}[|v_1\rangle] + \beta \mathcal{F}[|v_2\rangle]$
- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^*

- Definición de funcional lineal $\mathcal{F}[|v\rangle] \in \mathbb{C}$ con $\mathcal{F}[\alpha |v_1\rangle + \beta |v_2\rangle] \equiv \alpha \mathcal{F}[|v_1\rangle] + \beta \mathcal{F}[|v_2\rangle]$
- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^*
- Correspondencia entre *kets* y *bras*, entre vectores y funcionales lineales (o formas diferenciales): $\lambda_1 |v_1\rangle + \lambda_2 |v_2\rangle \quad \rightleftharpoons \quad \lambda_1^* \langle v_1| + \lambda_2^* \langle v_2|$,

- Definición de funcional lineal $\mathcal{F}[|v\rangle] \in \mathbb{C}$ con
 $\mathcal{F}[\alpha |v_1\rangle + \beta |v_2\rangle] \equiv \alpha \mathcal{F}[|v_1\rangle] + \beta \mathcal{F}[|v_2\rangle]$
- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^*
- Correspondencia entre *kets* y *bras*, entre vectores y funcionales lineales (o formas diferenciales): $\lambda_1 |v_1\rangle + \lambda_2 |v_2\rangle \iff \lambda_1^* \langle v_1| + \lambda_2^* \langle v_2|$,
- **El producto interno entre formas (covectores) y vectores**
 $\langle a | b \rangle = \langle b | a \rangle^* = (b_i^* \langle e^i |) \cdot (a^j | e_j \rangle) = b_i^* a^j \delta_j^i = a^i b_i^*$;

- Definición de funcional lineal $\mathcal{F}[|v\rangle] \in \mathbb{C}$ con
 $\mathcal{F}[\alpha |v_1\rangle + \beta |v_2\rangle] \equiv \alpha \mathcal{F}[|v_1\rangle] + \beta \mathcal{F}[|v_2\rangle]$
- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^*
- Correspondencia entre *kets* y *bras*, entre vectores y funcionales lineales (o formas diferenciales): $\lambda_1 |v_1\rangle + \lambda_2 |v_2\rangle \iff \lambda_1^* \langle v_1| + \lambda_2^* \langle v_2|$,
- **El producto interno entre formas (covectores) y vectores**
 $\langle a | b \rangle = \langle b | a \rangle^* = (b_i^* \langle e^i |) \cdot (a^j | e_j \rangle) = b_i^* a^j \delta_j^i = a^i b_i^*$;
- $\langle e^i | a \rangle = a^i$ las **componentes contravariantes** y
 $\langle b | e_i \rangle = b_i$, las **componentes covariantes**

- Definición de funcional lineal $\mathcal{F}[|v\rangle] \in \mathbb{C}$ con
 $\mathcal{F}[\alpha |v_1\rangle + \beta |v_2\rangle] \equiv \alpha \mathcal{F}[|v_1\rangle] + \beta \mathcal{F}[|v_2\rangle]$
- El $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n, \dots\}$ forman un espacio vectorial dual \mathbf{V}^*
- Correspondencia entre *kets* y *bras*, entre vectores y funcionales lineales (o formas diferenciales): $\lambda_1 |v_1\rangle + \lambda_2 |v_2\rangle \iff \lambda_1^* \langle v_1| + \lambda_2^* \langle v_2|$,
- El producto interno entre formas (covectores) y vectores**
 $\langle a | b \rangle = \langle b | a \rangle^* = (b_i^* \langle e^i |) \cdot (a^j | e_j \rangle) = b_i^* a^j \delta_j^i = a^i b_i^*$;
- $\langle e^i | a \rangle = a^i$ las **componentes contravariantes** y
 $\langle b | e_i \rangle = b_i$, las **componentes covariantes**
- Contravariantes transforman** $a^i = \tilde{a}^j \langle e^i | \tilde{e}_j \rangle = A_j^i \tilde{a}^j$ y
 $\tilde{a}^i = a^j \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle = \tilde{A}_j^i a^j$ con $\tilde{A}_j^i = (A_j^i)^{-1}$
- Covariantes transforman** $b_j = \tilde{b}_i \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle = \tilde{b}_i A_j^i$ y
 $\tilde{b}_j = b_i \langle e^i | \tilde{e}_j \rangle = b_i \tilde{A}_j^i$ y también $\tilde{A}_j^i = (A_j^i)^{-1}$