

# Tensores y coordenadas:

**Luis A. Núñez**

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,  
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*



13 de noviembre de 2020

- 1 Transformaciones, vectores y tensores
- 2 ¿Cuándo podemos transformar coordenadas?
- 3 Las componentes contravariantes de un vector transforman....
- 4 Las componentes covariantes de un vector transforman...
- 5 Las componentes de un tensor ....
- 6 Las componentes de contravariantes un tensor transforman ....
- 7 Las componentes de un tensor transforman..
- 8 Recapitulando

Consideremos un determinado punto,  $P$ , expresado en un sistema de coordenadas particular:  $(x^1, x^2, \dots, x^n)$  y las coordenadas de ese mismo punto  $P$ , expresado en otro sistema de coordenadas  $(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \dots, \tilde{x}^n)$ . Ambas representaciones coordenadas de  $P$  estarán relacionadas por:

$$\left. \begin{array}{l} \tilde{x}^1 = \tilde{x}^1(x^1, x^2, \dots, x^n) \\ \tilde{x}^2 = \tilde{x}^2(x^1, x^2, \dots, x^n) \\ \vdots \\ \tilde{x}^n = \tilde{x}^n(x^1, x^2, \dots, x^n) \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} x^1 = x^1(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \dots, \tilde{x}^n) \\ x^2 = x^2(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \dots, \tilde{x}^n) \\ \vdots \\ x^n = x^n(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2, \dots, \tilde{x}^n) \end{array} \right.$$

En una notación más compacta lo que tenemos es:

$$\tilde{x}^i = \tilde{x}^i(x^j) \iff x^i = x^i(\tilde{x}^j), \quad \text{con } i, j = 1, 2, 3, \dots, n. \quad (1)$$

# ¿Cuándo podemos transformar coordenadas?

- Las funciones  $x^i = x^i(\tilde{x}^m)$  y  $\tilde{x}^j = \tilde{x}^j(x^m)$  sean al menos  $\mathcal{C}^2$  (función y derivada continua)

# ¿Cuándo podemos transformar coordenadas?

- Las funciones  $x^i = x^i(\tilde{x}^m)$  y  $\tilde{x}^j = \tilde{x}^j(x^m)$  sean al menos  $\mathcal{C}^2$  (función y derivada continua)
- Que el determinante de la matriz jacobiana sean finito y distinto de cero, esto es

$$\det \left| \frac{\partial x^i(\tilde{x}^m)}{\partial \tilde{x}^j} \right| \neq 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial \tilde{x}^1} & \frac{\partial x^1}{\partial \tilde{x}^2} & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial \tilde{x}^n} \\ \frac{\partial x^2}{\partial \tilde{x}^1} & \frac{\partial x^2}{\partial \tilde{x}^2} & \cdots & \frac{\partial x^2}{\partial \tilde{x}^n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x^n}{\partial \tilde{x}^1} & \frac{\partial x^n}{\partial \tilde{x}^2} & \cdots & \frac{\partial x^n}{\partial \tilde{x}^n} \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow$$

$$x^i = x^i(\tilde{x}^m) \iff \tilde{x}^j = \tilde{x}^j(x^m).$$

Ahora bien, una vez más, derivando y utilizando la regla de la cadena:

$$x^i = x^i(\tilde{x}^j(x^m)) \Rightarrow \frac{\partial x^i}{\partial x^m} = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^j} \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^m} = \delta_m^i \Rightarrow dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^j} d\tilde{x}^j.$$

# Las componentes contravariantes de un vector transforman....

Un conjunto de cantidades  $\{a^1, a^2, \dots, a^n\}$  se denominarán componentes *contravariantes* de un vector  $|a\rangle \in \mathbf{V}$  en un punto  $P$  de coordenadas  $(x^1, x^2, \dots, x^n)$ , si:

- ① Dada dos bases ortonormales de vectores coordenados:  $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$  y  $\{|\tilde{e}_1\rangle, |\tilde{e}_2\rangle, \dots, |\tilde{e}_n\rangle\}$ , se cumple que:

$$|a\rangle = a^j |e_j\rangle = \tilde{a}^i |\tilde{e}_i\rangle \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \langle e^j | a \rangle = a^j \\ \langle \tilde{e}^i | a \rangle = \tilde{a}^i \end{array} \right\} \Rightarrow \tilde{a}^i = a^j \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle .$$

# Las componentes contravariantes de un vector transforman....

Un conjunto de cantidades  $\{a^1, a^2, \dots, a^n\}$  se denominarán componentes *contravariantes* de un vector  $|a\rangle \in \mathbf{V}$  en un punto  $P$  de coordenadas  $(x^1, x^2, \dots, x^n)$ , si:

- ① Dada dos bases ortonormales de vectores coordenados:  $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$  y  $\{|\tilde{e}_1\rangle, |\tilde{e}_2\rangle, \dots, |\tilde{e}_n\rangle\}$ , se cumple que:

$$|a\rangle = a^j |e_j\rangle = \tilde{a}^i |\tilde{e}_i\rangle \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \langle e^j | a \rangle = a^j \\ \langle \tilde{e}^i | a \rangle = \tilde{a}^i \end{array} \right\} \Rightarrow \tilde{a}^i = a^j \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle.$$

- ② o equivalentemente, bajo una transformación de coordenadas:  $x^i = x^i(\tilde{x}^j)$ , con  $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ , estas cantidades transforman como:

$$\tilde{a}^i = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k} a^k \iff a^j = \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^k} \tilde{a}^k, \quad \text{con: } \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} \frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^l} = \delta_l^i,$$

y donde las cantidades  $\frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}$  y  $\frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^k}$  deberán ser evaluadas en el punto  $P$ .

Un conjunto de cantidades  $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  se denominarán componentes *covariantes* de un vector  $\langle b | \in \mathbf{V}^*$  en un punto  $P$  de coordenadas  $(x^1, x^2, \dots, x^n)$ , si:

- ① Dada dos bases de formas:  $\{\langle e^1 |, \langle e^2 |, \dots, \langle e^n | \}$  y  $\{\langle \tilde{e}^1 |, \langle \tilde{e}^2 |, \dots, \langle \tilde{e}^n | \}$  se cumple que:

$$\langle b | = b_j \langle e^j | = \tilde{b}_i \langle \tilde{e}^i | \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \langle b | e_j \rangle = b_j \\ \langle b | \tilde{e}_i \rangle = \tilde{b}_i \end{array} \right\} \Rightarrow \tilde{b}_i = b_j \langle e^j | \tilde{e}_i \rangle .$$



Un conjunto de cantidades  $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  se denominarán componentes *covariantes* de un vector  $\langle b | \in \mathbf{V}^*$  en un punto  $P$  de coordenadas  $(x^1, x^2, \dots, x^n)$ , si:

- 1 Dada dos bases de formas:  $\{\langle e^1 |, \langle e^2 |, \dots, \langle e^n | \}$  y  $\{\langle \tilde{e}^1 |, \langle \tilde{e}^2 |, \dots, \langle \tilde{e}^n | \}$  se cumple que:

$$\langle b | = b_j \langle e^j | = \tilde{b}_i \langle \tilde{e}^i | \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \langle b | e_j \rangle = b_j \\ \langle b | \tilde{e}_i \rangle = \tilde{b}_i \end{array} \right\} \Rightarrow \tilde{b}_i = b_j \langle e^j | \tilde{e}_i \rangle .$$

- 2 o equivalentemente, bajo una transformación de coordenadas  $x^i = x^i(\tilde{x}^j)$  (con  $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ ) estas cantidades transforman como:

$$\tilde{b}_k = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} b_i \iff b_k = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k} \tilde{b}_i, \text{ con: } \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} \frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^l} = \delta_l^i, \quad (2)$$

y donde las cantidades:  $\frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}$  y  $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}$  deberán ser evaluadas en el punto  $P$ .

# Las componentes de un tensor ....

$$① \quad T^{ij} = \mathcal{T} \left[ \begin{array}{cc} \langle e^i(1) | & \langle e^j(2) | \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet & \bullet \end{array} \right] \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^{mn} |e_m(1)\rangle \otimes |e_n(2)\rangle$$

# Las componentes de un tensor ....

$$\textcircled{1} \quad T^{ij} = \mathcal{T} \left[ \begin{array}{cc} \langle e^i(1)| & \langle e^j(2)| \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet & \bullet \end{array} \right] \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^{mn} |e_m(1)\rangle \otimes |e_n(2)\rangle$$

$$\textcircled{2} \quad T_{ij} = \mathcal{T} \left[ \begin{array}{cc} |e_i(1)\rangle & |e_j(2)\rangle \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ & \circ \end{array} \right] \Leftrightarrow \mathcal{T} = T_{mn} \langle e^m(1)| \otimes \langle e^n(2)|$$

$$① \quad T^{ij} = \mathcal{T} \begin{bmatrix} \langle e^i(1) | & \langle e^j(2) | \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet & \bullet \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^{mn} |e_m(1)\rangle \otimes |e_n(2)\rangle$$

$$② \quad T_{ij} = \mathcal{T} \begin{bmatrix} |e_i(1)\rangle & |e_j(2)\rangle \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ & \circ \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T_{mn} \langle e^m(1) | \otimes \langle e^n(2) |$$

$$③ \quad T^i_j = \mathcal{T} \begin{bmatrix} |e_j(2)\rangle & \langle e^i(1) | \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ & \bullet \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^m_n \langle e^n(2) | \otimes |e_m(1)\rangle$$

$$1 \quad T^{ij} = \mathcal{T} \begin{bmatrix} \langle e^i(1) | & \langle e^j(2) | \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet & \bullet \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T^{mn} |e_m(1)\rangle \otimes |e_n(2)\rangle$$

$$2 \quad T_{ij} = \mathcal{T} \begin{bmatrix} |e_i(1)\rangle & |e_j(2)\rangle \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ & \circ \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T_{mn} \langle e^m(1) | \otimes \langle e^n(2) |$$

$$3 \quad T_j^i = \mathcal{T} \begin{bmatrix} |e_j(2)\rangle & \langle e^i(1) | \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ & \bullet \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T_n^m \langle e^n(2) | \otimes |e_m(1)\rangle$$

$$4 \quad T_i^j = \mathcal{T} \begin{bmatrix} |e_i(1)\rangle & \langle e^j(2) | \\ \downarrow & \downarrow \\ \circ & \bullet \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{T} = T_m^n \langle e^m(1) | \otimes |e_n(2)\rangle$$

Generalizamos los conceptos anteriores de la siguiente manera. Dado un conjunto bases para las formas diferenciales  $\{\langle x^m(1)|, \langle y^n(2)|\}$ , hemos definido las componentes *contravariantes* de un tensor:

$$T^{ij} = \mathcal{T} \left[ \begin{array}{c} \langle x^i(1)| \quad \langle y^j(2)| \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right] \iff \{T^{ij}\} \equiv \{T^{11}, T^{12}, \dots, T^{1n}; T^{21}, T^{22}, \dots, T^{2n}\}$$

en esta visión, las componentes contravariantes en un punto  $P$  de coordenadas  $(x^1, x^2, \dots, x^n) \Leftrightarrow x^i = x^i(\tilde{x}^j)$  (con  $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ ) transforman como:

$$\tilde{T}^{ij} = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k} \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^m} T^{km} \iff T^{ij} = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^m} \tilde{T}^{km}, \text{ con: } \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} \frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^l} = \delta_l^i,$$

donde  $\frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}$  y  $\frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k}$  deberán ser evaluadas en el punto  $P$ .

# Las componentes de un tensor transforman

Si  $\{|t_i(1)\rangle, \dots, |v_k(m)\rangle\}$  y  $\{\langle x^e(1)|, \dots, \langle z^g(n)|\}$  son bases para vectores y formas. Las componentes de un tensor:

$$T_{ijk}^{mn} = \mathcal{T} \left[ \begin{array}{ccccccc} |t_i(1)\rangle & |u_j(2)\rangle & & |v_k(m)\rangle & \langle x^e(1)| & \langle y^f(2)| & \langle z^g(n)| \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \circ & \circ & , \dots , & \circ & ; & \bullet & , \bullet , \dots , \bullet \end{array} \right] ,$$

serán un conjunto de cantidades:

$\{T_{1\dots 1}^{1\dots 1}, T_{1\dots 1}^{2\dots 1}, \dots, T_{1\dots 1}^{1\dots \tilde{n}}, T_{1\dots 1}^{\tilde{n}\dots 1}, T_{2\dots 1}^{\tilde{n}\dots 1}, \dots, T_{\tilde{m}\dots 1}^{1\dots 1}, \dots, T_{\tilde{m}\dots \tilde{m}}^{\tilde{n}\dots \tilde{n}}\}$  que *contravariantes* y *covariantes* respectivamente, de un tensor mixto en un punto  $P$  de coordenadas  $(x^1, \dots, x^n)$ .

Bajo una transformación de coordenadas  $x^i = x^i(\tilde{x}^j)$  con  $i, j = 1, \dots, n$  estas cantidades transforman como:

$$\tilde{T}_{e\dots g}^{i\dots k} = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^p} \dots \frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^a}{\partial \tilde{x}^e} \dots \frac{\partial x^d}{\partial \tilde{x}^g} T_{a\dots d}^{p\dots q}$$

$$T_{e\dots g}^{i\dots k} = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^p} \dots \frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^q} \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^e} \dots \frac{\partial \tilde{x}^d}{\partial x^g} T_{a\dots d}^{p\dots q} ,$$

- Coordenadas  $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i(x^j) \iff x^i = x^i(\tilde{x}^j)$



- Coordenadas  $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i(x^j) \iff x^i = x^i(\tilde{x}^j)$
- Vector: componentes **contravariantes**  
 $|a\rangle = a^i |e_i\rangle = \tilde{a}^i |\tilde{e}_i\rangle \Rightarrow \tilde{a}^i = a^j \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle \Leftrightarrow \tilde{a}^i = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k} a^k$

- Coordenadas  $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i(x^j) \iff x^i = x^i(\tilde{x}^j)$
- Vector: componentes **contravariantes**  
 $|a\rangle = a^i |e_i\rangle = \tilde{a}^i |\tilde{e}_i\rangle \Rightarrow \tilde{a}^i = a^j \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle \Leftrightarrow \tilde{a}^i = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k} a^k$
- Formas: componentes **covariantes**  
 $\langle b| = b_i \langle e^i| = \tilde{b}_i \langle \tilde{e}^i| \Rightarrow \tilde{b}_i = b_j \langle e^j | \tilde{e}_i \rangle \Leftrightarrow \tilde{b}_k = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} b_i$

- Coordenadas  $\tilde{x}^i = \tilde{x}^i(x^j) \iff x^i = x^i(\tilde{x}^j)$
- Vector: componentes **contravariantes**  
 $|a\rangle = a^i |e_i\rangle = \tilde{a}^i |\tilde{e}_i\rangle \Rightarrow \tilde{a}^i = a^j \langle \tilde{e}^i | e_j \rangle \Leftrightarrow \tilde{a}^i = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k} a^k$
- Formas: componentes **covariantes**  
 $\langle b| = b_i \langle e^i| = \tilde{b}_i \langle \tilde{e}^i| \Rightarrow \tilde{b}_i = b_j \langle e^j | \tilde{e}_i \rangle \Leftrightarrow \tilde{b}_k = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} b_i$
- Tensores  $\mathcal{T} = T^m_n \langle e^n(2)| \otimes |e_m(1)\rangle = \tilde{T}^k_l \langle \tilde{e}^k(2)| \otimes |\tilde{e}_l(1)\rangle$   
entonces  $\tilde{T}^i_j = \frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^m}{\partial \tilde{x}^j} T^k_m$