

Analysis I und Lineare Algebra für
Ingenieurwissenschaften
Hausaufgabe 03 - Al-Maweri 13

Daniel Geinets (453843), Christopher Neumann (409098), Dennis Schulze (458415)

1. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Aufgabe 1	2
a)	2
i)	2
ii)	2
b)	3
Aufgabe 2	4
a)	4
b)	4
c)	4
d)	4
Aufgabe 3	4
a)	4
b)	4
Aufgabe 4	4
a)	4
b)	4

Aufgabe 1

a)

i)

$$z^3 = -27i = 27e^{-\frac{\pi}{2}i}$$

Es gilt für den Betrag r und das Argument ϕ_n mit $n \in \{0, 1, 2\}$ von z

$$\begin{aligned} r &= \sqrt[3]{27} = 3 \\ \phi_n &= -\frac{\pi}{2 \cdot 3} + \frac{2n\pi}{3} \\ &= \frac{-\pi + 4n\pi}{6} = \frac{\pi(4n-1)}{6} \end{aligned}$$

Dann gilt

$$z = 3e^{\frac{\pi(4n-1)}{6}i} \text{ mit } n = 0, 1, 2$$

ii)

$$2z^4 + 4(\sqrt{12} - 2i)z^2 + 16 - 8\sqrt{12}i = 0$$

Es gilt für den ersten Koeffizienten mit $r, \phi \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{12 + (-2)^2} = 4 \\ \tan(\phi) &= \frac{-2}{\sqrt{12}} = \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \Leftrightarrow \phi &= \arctan\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

damit gilt

$$\sqrt{12} - 2i = 4e^{-\frac{\pi}{6}i}$$

analog gilt dann für den zweiten Koeffizienten

$$16 - 8\sqrt{12}i = 32e^{-\frac{\pi}{3}i}$$

dann gilt

$$\begin{aligned}
2z^4 + 4(\sqrt{12} - 2i)z^2 + 16 - 8\sqrt{12}i &= 0 \\
\Leftrightarrow 2z^4 + 16e^{-\frac{\pi}{6}i}z^2 + 32e^{-\frac{\pi}{3}i} &= 0 \\
\Leftrightarrow z^4 + 8e^{-\frac{\pi}{6}i}z^2 + 16e^{-\frac{\pi}{3}i} &= 0 \\
\Leftrightarrow (z^2 + 4e^{-\frac{\pi}{6}i})^2 &= 0
\end{aligned}$$

daraus folgt dann die Gleichung

$$z^2 = -4e^{-\frac{\pi}{6}i} = 4e^{\frac{5\pi}{6}i}$$

für z gilt dann mit $s, \phi_k \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
s &= \sqrt{4} = 2 \\
\phi_k &= \left(\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \right) \frac{1}{2} \text{ mit } k = 0, 1 \\
&= \left(\frac{5\pi}{6} + \frac{12k\pi}{6} \right) \frac{1}{2} = \left(\frac{\pi(5 + 12k)}{6} \right) \frac{1}{2} \\
&= \frac{\pi(5 + 12k)}{12}
\end{aligned}$$

damit gilt

$$z = 2e^{\frac{\pi(5+12k)}{12}i} \text{ mit } k = 0, 1$$

NOTE: In diesem Fall sind das beides doppelte Nullstellen.

b)

Es gilt

$$\begin{aligned}
ie^{\frac{5\pi}{12}i} &= ie^{\frac{2\pi+3\pi}{4 \cdot 3}i} \\
&= ie^{\frac{\pi}{4}i + \frac{\pi}{6}i} \\
&= i \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) \\
&= i \left(\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}}i + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) \\
&= \frac{-1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}i
\end{aligned}$$

Aufgabe 2

a)

$$p(i) = (i)^4 - 1 = 1 - 1 = 0$$

b)

c)

d)

Aufgabe 3

a)

Für den Nenner p gilt

$$\begin{aligned} p(x) &= x^2 - 2x + 5 \\ &= (x - 1)^2 + 4 \end{aligned}$$

b)

Aufgabe 4

a)

b)