

Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım: Hayat Kurtaran Temel Adımlar

Acil durumlarda panięi önleyecek,
güvenli ve doğru müdahale rehberi.



Bilinç Bozukluğu Nedir?



Bayılma ve Koma Arasındaki Farklar



Bayılma (Senkop)



Koma

- **Nedir?** Kısa süreli ve yüzeyseldir. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
- **Nedenler:** Korku, heyecan, sıcak, kapalı ortam, aniden ayağa kalkma.
- **Belirtiler:** Baş dönmesi, yüzde solgunluk, üşüme, terleme, hızlı/zayıf nabız.

- **Nedir?** Uzun sürelidir. Yutkunma/öksürük refleksleri ve uyarılara tepki kaybolur.
- **Nedenler:** Şiddetli darbe (kafa travması), zehirlenme, aşırı alkol/uyuşturucu, diyabet.
- **Belirtiler:** Sesli ve ağrılı uyarılara tepki yok, idrar ve gaita kaçırma.

Kiři Bařının Döneceęini Hissederse




- Sırt üstü yatırın, ayakları 30 cm kaldırın.
- Sıkkan giysileri gevşetin.
- İyi hissedinceye kadar dinlenmesini sağlayın.

Eęer Kiři Bayıldıysa



- Sırt üstü yatırıp ayakları 30 cm kaldırın.
- Solunum yolu açıklığını kontrol edin ve koruyun.
- ! - **Kusma varsa: Mutlaka yan pozisyonda tutun.**

Bilinç Kapalıysa Ne Yapmalı?



Step 1: ABC'yi Değerlendir

Hasta/yaralının yaşam bulgularını (Solunum ve Nabız) kontrol edin.

Step 2: Koma Pozisyonu

Hastaya yarı yüzükoyun-yan pozisyon verin.

Step 3: 112'yi Ara

Tıbbi yardım çağırın.

Step 4: Gözlemle

Yardım gelene kadar yanında bekleyin, sık sık solunum ve nabız kontrolü yapın.

Adım Adım Koma Pozisyonu



Step 1: Karşı taraf kolu, karşı omzun üzerine koyun. Karşı bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrın.



Step 2: Size yakın kolu baş hizasında omuzdan yukarı uzatın.



Step 3: Karşı taraf omuz ve kalçasından tutarak hastayı tek hamlede kendinize doğru çevirin.



Step 4: Üstteki bacağı öne, alttaki bacağı arkaya destek yapın. Başı uzatılan kolun üzerine, hafif öne eğik koyun.

Tıbbi yardım gelene kadar bu pozisyonda tutun.
3-5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edin.

Nörolojik Aciller: Havale Nedir?

Beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücutta kontrol edilemeyen kasılmalardır.



Ateş Nedeniyle Oluşan Havale

- Vücut sıcaklığının 38°C'nin üstüne çıkmasıyla oluşur.
- Genellikle 6 ay–6 yaş arası çocuklarda görülür.



Sara Krizi (Epilepsi)

- Kronik bir hastalıktır (beyin zedelenmesi kaynaklı).
- Açlık, uykusuzluk veya ilaçların kesilmesi ile tetiklenebilir.

Sara Krizi (Epilepsi) Belirtileri

Stage 1: Ön Haberci



Stage 1: Ön Haberci

Normalde olmayan kokuları alma, adale kasılmaları.

Stage 2: Kriz Anı



Stage 2: Kriz Anı

Ani bilinç kaybı ve yere yığılma. Yoğun kasılmalar, 10-20 saniye nefes kesilmesi, yüzde morarma.

Stage 3: Son Aşama



Stage 3: Son Aşama

Uyanma, şaşkınlık, uykulu hal, nerede olduğundan habersizlik.

Hafif Belirtiler



Hafif Belirtiler:

Bazen krizler hafiftir. Bir noktaya dalgın bakış, istemsiz dudak ısırma, anlamsız konuşma ve bellek yitimi görülebilir.

Havale ve Sara Krizinde Müdahale



Yapılması Gerekenler

- Güvenlik önlemi alın (Ör: Trafiği kesin, etraftaki tehlikeli eşyaları kaldırın). 
- Başını çarpmasını engellemek için başının altına yumuşak bir malzeme koyun. 
- Krizin kendi sürecini tamamlamasını bekleyin. 



ASLA Yapılmaması Gerekenler

- Hastayı bağlamaya veya hareketlerini durdurmaya **ÇALIŞMAYIN**. 
- Kilitlenmiş çeneyi açmaya **ÇALIŞMAYIN**. 
- Ağızına herhangi bir yiyecek/içecek **VERMEYİN**, bir şey koklatmayın. 



Ateşli Havale İçin: Çocuğu ıslak havlu/çarşafa sarın. Ateş düşmüyorsa oda sıcaklığında küvete sokun ve **112**'yi arayın.

Metabolik Aciller: Kan Şekeri Düşüklüğü

Vücutta glikoz eksildiğinde (uzun açlık, egzersiz veya diyabet tedavisi nedeniyle) ortaya çıkar.



Ani Düşüş Belirtileri (Hızlı)

- Korku ve aniden acıkma
- Terleme ve titreme
- Hızlı nabız ve yorgunluk



Yavaş Düşüş Belirtileri

- Baş ağrısı ve görme bozukluğu
- Konuşma güçlüğü ve kafa karışıklığı
- Sarsıntı ve şuur kaybı



Kan Şekeri Düşüklüğünde İlk Yardım Adımları

Hastanın bilinci yerinde mi
ve kusmuyor mu?

EVET

HAYIR



Ağızdan şeker veya şekerli
içecekler verin. (15-20 dk
geçmezse yardım çağırın).



Koma pozisyonu verin ve
derhal 112'yi arayın.

i Neden Şeker Verilmeli?

Belirtiler fazla şekerden kaynaklansa bile fazladan şeker vermek az zararlıdır.
Düşük kan şekeri beyinde ve hayati organlarda kalıcı zararlara neden olabilir!


Kardiyak Aciller: Kalp Spazmı ve Kalp Krizi

	 Kalp Spazmı	 Kalp Krizi
Ne Zaman Başlar?	Fiziksel zorlanma, heyecan veya fazla yemek yeme sonrası.	Herhangi bir anda (ciddi ölüm korkusu ile birlikte).
Süre ve Şiddet	Kısa sürelidir (5-10 dk), dinlenmekle geçer.	Daha şiddetli ve uzun sürelidir. Dinlenmekle geçmez.
Ağrı Tipi	Göğüs ortasından kollara, sırtta ve çeneye yayılır.	Kravat bölgesinde görülür. Hazımsızlık veya gaz sancısı ile karıştırılabilir!



Callout Note: Her iki durumda da nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez.

Göğüs Ağrısında İlk Yardım



Yaşamsal bulguları
(ABC) kontrol edin.

Hastayı hemen
dinlenmeye alın ve
sakinleştirin.

Yarı oturur pozisyon
verin (nefes almayı
kolaylaştırır).

Kullandığı ilaçları varsa
almasına yardım edin
ve vakit kaybetmeden
112'yi arayın.

İlk Yardımın Altın Kuralları



Rule 1: Önce ABC

Her durumda hastanın solunumunu ve nabzını kontrol edin.



Rule 2: Asla Yedirmeyin

Bilinci kapalı kişiye ASLA ağızdan yiyecek veya içecek vermeyin.



Rule 3: Zarar Vermeyin

Hastayı hareket ettirirken ikincil yaralanmalardan (baş çarpması vb.) koruyun.



Rule 4: Profesyonellere Bırakın

Müdahalenizi yaptıktan sonra veya şüphe duyduğunuz her an 112'yi arayın.

Acil Durum İletişimi



İlk yardım hayat kurtarır, ancak tıbbi müdahalenin yerini tutmaz. Sakin kalın, adımları uygulayın ve profesyonel destek isteyin.

Bu bir referans kılavuzudur. Her zaman ulusal acil durum hatlarına (112) başvurun.