

1 Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

1. Системы нормальной формы

Несколько дифференциальных уравнений образуют систему,

Пример 1.

$$\begin{cases} D^2x_1 + D^2x_2 = 1 & x_1(t) \\ D^2x_1 + D^2x_2 = 0 & x_2(t) \end{cases} \quad \text{-однако это не нормальная форма}$$

Если при этом выполняются следующие дополнительные условия:

1) Старшая производная каждой искомой функции входит только в одно уравнение

2) Каждое уравнение разрешимо относительно старших производных

то такая система имеет нормальную форму.

$$D^{m_1}x_1 = f_1(x_1, Dx_1, \dots, D^{m_1-1}x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$$

.....

$$D^{m_n}x_n = f_n(x_1, Dx_1, \dots, D^{m_1-1}x_1, x_2, \dots, x_n, Dx_n, \dots, D^{m_n-1}x_n)$$

Решением будет набор функций $x_1(t), \dots, x_n(t)$.

Система в нормальной форме с помощью соответственных замен переменных сводится к системе уравнений 1 порядка.

Пример 2.

$$\begin{cases} D^2x_1 = f_1(t, x_1[y_1], Dx_1[y_2], x_2[y_3], Dx_2[y_4], D^2x_2[y_5]) \\ D^3x_2 = f_2(t, x_1, Dx_1, x_2, Dx_2, D^2x_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Dy_1 = y_2 \\ Dy_2 = f_1(t, y_1, \dots) \\ Dy_3 = y_4 \\ Dy_4 = y_5 \\ Dy_5 = f_2(t, y_1, y_2, \dots, y_5) \end{cases}$$

Поэтому ограничимся изучением нормальных систем 1 порядка

2 Линейные системы в нормальной форме

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} Dx_1 = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = f_1, \\ Dx_2 = a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = f_2, \\ \\ Dx_n = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = f_n. \end{array} \right. \quad \text{где } a_{ij} = a_{ij}(t), f_i = f_i(t), x_i = x_i(t) \ i, j = \overline{1, n},$$

определены на $t \in I$

Определение 1. *Решением системы* называется семейство функций $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ непрерывно дифференцируемых на I , которые на этом интервале обращают каждое уравнение в тождество.

Можно так же рассматривать системы в комплекснозначной форме:

$$Dz_k = C_{k1}z_1 + \dots + C_{kn}z_n + h_k, \text{ где } k = \overline{1, n}, z_k = x_k + iy_k$$

Достаточно часто линейные системы записывают в векторной (матричной) форме:

$$Dx = Ax + f, \text{ где } x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, A = \{a_{ij}\}, f = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T$$

Производные и интегралы от векторов и матриц будем вычислять покомпонентно. Например, если $P(t)$ -матрица размера $n \times n$, то:

$$D^k P(t) = D^k(p_{ij}(t)) \text{ и } \int_s^t P(\tau) d\tau = \int_s^t p_{ij}(\tau) d\tau, \quad i, j = \overline{1, n}$$

В случае, когда берём функцию от матрицы (E^A, \sqrt{A}) - наши правила уже не будут работать.

Если все a_{ij} постоянны, то линейная однородная система называется постоянной (стационарной)

3 Решение линейных неоднородных систем

Рассмотрим следующую систему:

$$Dz = Cz(t) + h(t), \text{ где } C = \{C_{ij}\}, \quad h = (h_1, h_2, \dots, h_n)^T, \quad z_k|_{t=s} = \xi_k$$

Рассмотрим 4 случая для данной системы:

Случай 1 (диагональный)

$$C = diag(C_{11}, C_{22}, ..., C_{nn})$$

Отсюда $Dz_j = C_{jj}z_j + h_j$, $j = \overline{1, n} \Rightarrow z_j(t) = \xi_j e^{C_{jj}(t-s)} + \int_s^t e^{C_{jj}(t-\tau)} h_j(\tau) d\tau$

Случай 2 (нижнетреугольный)

Теорема 1. В нижнетреугольном случае начальная задача однозначно разрешима на интервале $I \forall s \in I, \forall \xi_k \in C$

Доказательство. Выпишем первые два уравнения системы:

$$\begin{cases} Dz_1 = C_{11}z_1 + h_1, \\ Dz_2 = C_{21}z_1 + C_{22}z_2 + h_2, \\ \dots\dots\dots \\ Dz_n = C_{n1}z_1 + \dots + C_{nn}z_n + h_n. \end{cases}$$

Будем решать по принципу ” сверху-вниз ” , тогда:

$$z_1 = \xi_1 e^{C_{11}(t-s)} + \int_s^t e^{C_{11}(t-\tau)} h_1(\tau) d\tau$$

$$Dz_2 = C_{21}z_1 + C_{22}z_2 + h_2$$

Обозначим $C_{21}z_1 + h_2 = \tilde{h}_2$, тогда:

$$Dz_2 = C_{22}z_2 + \tilde{h}_2$$

$$z_2 = \xi_2 e^{C_{22}(t-s)} + \int_s^t e^{C_{22}(t-\tau)} \tilde{h}_2(\tau) d\tau$$

При $n > 2$ продолжается этот процесс до того как не найдём решение системы.

Случай 3 (верхнетреугольный)

Теорема 2. В верхнетреугольном случае начальная задача однозначно разрешима на интервале $I \forall s \in I, \forall \xi_k \in C$

Доказательство. Выпишем последние два уравнения системы:

$$\begin{cases} Dz_1 = C_{11}z_1 + \dots + C_{1n}z_n + h_n, \\ \dots\dots\dots \\ Dz_{n-1} = C_{n-1n-1}z_{n-1} + C_{n-1n}z_n + h_{n-1} \\ Dz_n = C_{nn}z_n + h_n. \end{cases}$$

Будем решать по принципу "снизу-вверх", тогда:

$$z_n = \xi_n e^{C_{nn}(t-s)} + \int_s^t e^{C_{nn}(t-\tau)} h_n(\tau) d\tau$$

$$Dz_{n-1} = C_{n-1n}z_{n-1} + C_{nn}z_n + h_{n-1}$$

Обозначим $C_{nn}z_n + h_{n-1} = \tilde{h}_{n-1}$, тогда:

$$Dz_{n-1} = C_{n-1n}z_{n-1} + \tilde{h}_{n-1}$$

$$z_{n-1} = \xi_{n-1} e^{C_{n-1n}(t-s)} + \int_s^t e^{C_{n-1n}(t-\tau)} \tilde{h}_{n-1}(\tau) d\tau$$

При $n > 2$ идём далее, поднимаясь снизу-вверх, до того как не найдём решение системы. ■

Случай 4 (общий случай)

Теорема 3. В общем случае начальная задача однозначно разрешима на интервале I $\forall s \in I, \forall \xi_k \in C$

Доказательство.

$$Dz = Cz(t) + h(t), \text{ где } C = \{C_{ij}\}, h = (h_1, h_2, \dots, h_n)^T$$

Пусть J_C - Жорданова нормальная форма матрицы C :

$$J_C = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k), \text{ где } J_m = \begin{pmatrix} \lambda_m & 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda_m & 1 & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_m \end{pmatrix}, m = \overline{1, k}.$$

Отсюда следует, что для J_C - справедлив верхнетреугольный случай.

Рассмотрим S_C - трансформирующая матрица, т.е. $S_C^{-1}CS_C = J_C$ (Матрица S составлена из собственных и присоединенных векторов)

Введём замену переменных $W = S_C^{-1}z$, тогда $z = S_C W$, отсюда получим:

$$S_C DW = CS_C W + h, \quad W|_{t=s} = S_C^{-1}\xi$$

$$DW = S_C^{-1}CS_C W + S_C^{-1}h$$

$$DW = J_C W + \tilde{h}$$

$$z(t) = S_C \begin{pmatrix} W_1(t) \\ W_2(t) \\ \dots \\ W_n(t) \end{pmatrix}$$

Упражнение 1. Провести доказательство для случая нижнетреугольной формы Жордана ($J_H = J_B^T$). ■

При решении конкретных систем с помощью приведения к ЖНФ необходимо найти трансформирующую матрицу, привести ЖНФ, решить систему и вернуться к исходным переменным.

4 Сведение линейной системы к совокупности стационарных уравнений n-го порядка

Рассмотрим систему из двух уравнений:

$$\begin{cases} Dx_1 = ax_1 + bx_2 \\ Dx_2 = cx_1 + dx_2 \end{cases}$$

$b \neq 0$, так как если $b = 0$ то действует теорема из предыдущей главы о нижнетреугольной матрице.

$$b \neq 0 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{b}Dx_1 - \frac{a_1}{b_1}x_1$$

Кроме этого продифференцируем первое уравнение:

$$D^2x_1 = aDx_1 + bDx_2 = aDx_1 + b(cx_1 + dx_2) = aDx_1 + b(cx_1 + d(\frac{1}{b}Dx_1 - \frac{a_1}{b_1}x_1))$$

$$D^2x_1 - (a + d)Dx_1 + (bc - ad)x = 0 \Rightarrow \text{найдем } x_1(t), \text{ а зная его, найдем } x_2(t).$$

Таким образом мы доказали следующее утверждение: *при $b \neq 0$ обе системы эквивалентны.*

Подобным образом можно решать и неоднородные системы.

5 Экспоненциальное представление решений линейных стационарных систем

Возьмём пространство R^n и зададим норму вектора и некоторые свойства:

$$\|x\| = \max \sum_{k=1}^n |x_k|$$

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \neq 0, x \in R^n} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$1) \|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$$

$$2) \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

$$3) \|AB\| \leq \|A\|\|B\|$$

$$4) \|A^m\| \leq \|A\|^m$$

Рассмотрим матричный ряд $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$. Этот ряд сходится тогда и только тогда, когда

сходится ряд $\sum_{m=0}^{\infty} a_{ij}^m$. А тогда из сходимости главной мажоранты будет следовать сходимость матричного ряда.

Рассмотрим $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m$, видим, что ряд совпадает с рядом тейлора для экспоненты, тогда $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m = e^A$, откуда $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m t^m = e^{At}$.

Пример 3. Рассмотрим следующие матрицы и экспоненты в степени этих матриц:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E, \quad e^A = E + \frac{E}{1!} + \frac{E}{2!} + \dots = \begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots & 0 \\ 0 & 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^1 & 0 \\ 0 & e^1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e^A = E + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \dots = \begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В общем случае считать экспоненту матрицы гораздо сложнее. Покажем некоторые свойства:

Свойство 1 $D(e^{At}) = AD(e^{At})$

Доказательство.

$$D(e^{At}) = D\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m t^m\right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m m t^{m-1} = A \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m-1)!} A^{m-1} t^{m-1} = A e^{At}$$

■

Свойство 2 Если A и B коммутируют между собой, т.е. перестановочны ($AB = BA$)

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

В общем же случае $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

Свойство 3 $e^{A+B} = e^A + e^B$ тогда и только тогда, когда матрицы A и B перестановочны.

Доказательство.

$$\begin{aligned} e^{A+B} &= E + \frac{(A+B)}{1!} + \frac{(A+B)^2}{2!} + \dots = E + A + B + \frac{A^2}{2!} + \frac{B^2}{2!} + \frac{AB}{2!} + \frac{BA}{2!} = \\ &= (E + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \dots)(E + \frac{B}{1!} + \frac{B^2}{2!} + \dots) = e^A e^B \end{aligned}$$

■

Свойство 4 $(e^A)^{-1} = e^{-A}, (e^{At})^{-1} = e^{-At}$

6 Правило Коши решения линейных стационарных систем

Рассмотрим систему $Dx = Ax + f(x), t \in I, \vec{x}|_{t=s} = \vec{\xi}$

Теорема 1. Начальная задача однозначно разрешима на I , причём её решение находится по следующей формуле:

$$x = e^{A(t-s)}\xi + \int_s^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau$$

Доказательство. Предварительно заметим, что $e^{A(t-s)} = e^{At}e^{-As}$, так как $A(t-s) = (t-s)A$

Продифференцируем равенство $x = e^{A(t-s)}\xi + \int_s^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau$:

$$\begin{aligned} Dx &= Ae^{A(t-s)}\xi + D(e^{At} \int_s^t e^{-A\tau} f(\tau) d\tau) = Ae^{A(t-s)}\xi + Ae^{At} \int_s^t e^{-A\tau} f(\tau) d\tau + e^{At} e^{-At} f(t) = \\ &= Ae^{A(t-s)}\xi + A \int_s^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau + f(t) = A(e^{A(t-s)}\xi + \int_s^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau) + f(t) = Ax + f(t) \\ x|_{t=s} &= \xi + \int_s^s \dots = \xi \end{aligned}$$

■

Замечание 1. Если $\vec{\xi}$ заменить на \vec{C} , то получим общее решение.

Полученная формула представляет собой формулу Коши решения ЛС, при этом множитель $e^{A(t-s)}$ - матрица Коши.

Вычисление матричной экспоненты в общем случае представляет значительные трудности. Тем не менее в некоторых частных случаях можно получить удобные формулы. Рассмотрим их:

Формула 1 $\text{diag} A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$

$$\text{Тогда } e^A = E + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \dots = \begin{pmatrix} e^{a_{11}} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & e^{a_{nn}} \end{pmatrix} \text{ (см. предыдущий параграф)}$$

Формула 2 Жорданова нормальная форма

Рассуждения проведём для одной клетки Жордана размерности d :

$$J_d(\nu) = \begin{pmatrix} \nu & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \nu & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \nu \end{pmatrix} = E_d(\nu) + F_d = \begin{pmatrix} \nu & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \nu & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \nu \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Заметим, что матрицы E и F перестановочны. Рассмотрим F_3 :

$$F_3^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ясно, что матрицы будут нулевыми начиная с $n = d$. Отсюда:

$$e^{F_3 t} = E + \frac{F_3 t}{1!} + \frac{F_3^2 t^2}{2!} + 0 = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Аналогично

$$e^{F_d t} = \begin{pmatrix} 1 & t & \dots & \frac{t^{d-1}}{(d-1)!} \\ 0 & 1 & \dots & \frac{t^{d-2}}{(d-2)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Отсюда

$$e^{J_d t} = e^{E_d \nu t} e^{F_d t} = \begin{pmatrix} e^{\nu t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\nu t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\nu t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t & \dots & \frac{t^{d-1}}{(d-1)!} \\ 0 & 1 & \dots & \frac{t^{d-2}}{(d-2)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = e^{\nu t} e^{F_d t}$$

Теорема 2. Пусть $J_A = S^{-1} A S$, $J_A = \text{diag}[J_{d_1}(\nu_1), \dots, J_{d_m}(\nu_m)]$, тогда $e^{A t} = S e^{J_A t} S^{-1}$

Доказательство.

$$\begin{aligned} e^{A t} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m t^m = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} (S J_A S^{-1})^m t^m = [(S J_A S^{-1})^2 = S J_A^2 S^{-1}] = \\ &= S \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} J_A^m t^m \right) S^{-1} = S e^{J_A t} S^{-1}. \end{aligned}$$

■