

根据 Young 不等式可证明著名的 Hölder 不等式.

引理6.3 (Hölder 不等式). 对任意随机变量 X 和 Y 以及实数 $p > 0$ 和 $q > 0$ 满足 $1/p + 1/q = 1$, 有

$$E(|XY|) \leq (E(|X|^p))^{\frac{1}{p}} (E(|Y|^q))^{\frac{1}{q}}.$$

特别地, 当 $p = q = 2$ 时 Hölder 不等式变成 Cauchy-Schwartz 不等式.

Proof. 设 $c = (E(|X|^p))^{\frac{1}{p}}$ 和 $d = (E(|Y|^q))^{\frac{1}{q}}$, 根据 Young 不等式有

$$\frac{|XY|}{cd} = \frac{|X|}{c} \frac{|Y|}{d} \leq \frac{1}{p} \frac{|X|^p}{c^p} + \frac{1}{q} \frac{|Y|^q}{d^q}.$$

对上式两边同时取期望有

$$\frac{E(|XY|)}{cd} \leq \frac{1}{p} \frac{E(|X|^p)}{c^p} + \frac{1}{q} \frac{E(|Y|^q)}{d^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

从而完成证明. □

6.3 Chernoff 不等式

首先给出随机变量的矩生成函数 (Moment Generating Function) 的定义.

定义6.1. 定义随机变量 X 的矩生成函数为

$$M_X(t) = E[e^{tX}].$$

下面给出关于矩生成函数的一些性质:

定理6.3. 设随机变量 X 的矩生成函数为 $M_X(t)$, 对任意 $n \geq 1$ 有

$$E[X^n] = M_X^{(n)}(0),$$

这里 $M_X^{(n)}(t)$ 表示矩生成函数在 $t = 0$ 的 n 阶导数, 而 $E[X^n]$ 被称为随机变量 X 的 n 阶矩 (moment).

Proof. 由 Taylor 公式有

$$e^{tX} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(tX)^i}{i!}.$$

两边同时取期望有

$$E[e^{tX}] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i}{i!} E[X^i].$$

对上式两边分别对 t 求 n 阶导数并取 $t = 0$ 有 $M_X^{(n)}(t) = E[X^n]$. □

定理6.4. 对随机变量 X 和 Y , 如果存在常数 $\delta > 0$, 使得当 $t \in (-\delta, \delta)$ 时有 $M_X(t) = M_Y(t)$ 成立, 那么 X 与 Y 有相同的分布.

上述定理表明随机变量的矩生成函数可唯一确定随机变量的分布, 其证明超出了本书的范围. 若随机变量 X 与 Y 独立, 则有

$$M_{X+Y}(t) = E[e^{(X+Y)t}] = E[e^{tX} e^{tY}] = E[e^{tX}] \cdot E[e^{tY}] = M_X(t) M_Y(t).$$

于是得到

推论6.3. 对任意独立的随机变量 X 和 Y 有 $M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t)$.

下面将利用矩生成函数来证明一系列不等式. 给定任意随机变量 X 和任意 $t > 0$ 和 $\epsilon > 0$, 利用 Markov 不等式有

$$\Pr[X \geq \epsilon] = \Pr[e^{tX} \geq e^{t\epsilon}] \leq e^{-t\epsilon} E[e^{tX}].$$

特别地, 有

$$\Pr[X \geq \epsilon] \leq \min_{t>0} \{e^{-t\epsilon} E[e^{tX}]\}.$$

类似地, 对任意 $\epsilon > 0$ 和 $t < 0$ 有

$$\Pr[X \leq \epsilon] = \Pr[tX \geq t\epsilon] \leq e^{-t\epsilon} E[e^{tX}].$$

同理有

$$\Pr[X \leq \epsilon] \leq \min_{t<0} \{e^{-t\epsilon} E[e^{tX}]\}.$$

上述方法称为 ‘**Chernoff 方法**’, 是证明集中不等式一种最根本最重要的方法. 下面将针对特定的分布或特定的条件, 先求解矩生成函数 $E[e^{tX}]$, 然后求解最小值 t 的取值.

6.3.1 二值随机变量的 Chernoff 不等式

定理6.5. 设随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n 相互独立且满足 $X_i \sim \text{Ber}(p_i)$, 令 $\mu = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n p_i$. 对任意 $\epsilon > 0$ 有

$$\Pr \left[\sum_{i=1}^n X_i \geq (1 + \epsilon)\mu \right] \leq \left(\frac{e^\epsilon}{(1 + \epsilon)^{(1+\epsilon)}} \right)^\mu;$$

对任意 $\epsilon \in (0, 1)$ 有

$$\Pr \left[\sum_{i=1}^n X_i \geq (1 + \epsilon)\mu \right] \leq e^{-\mu\epsilon^2/3}.$$

上述第一个不等式给出了最紧的不等式上界, 第二个不等式是第一个不等式的适当放松.

Proof. 令 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i$. 对任意 $t > 0$, 根据 Chernoff 方法有

$$\Pr[\bar{X} \geq (1 + \epsilon)\mu] = \Pr[e^{t\bar{X}} \geq e^{t(1+\epsilon)\mu}] \leq e^{-t(1+\epsilon)\mu} E[e^{t\bar{X}}].$$

利用随机变量的独立性以及 $1+x \leq e^x$ 有

$$\begin{aligned} E[e^{t\bar{X}}] &= E[e^{\sum_{i=1}^n tX_i}] = \prod_{i=1}^n E[e^{tX_i}] \\ &= \prod_{i=1}^n [(1-p_i) + p_i e^t] = \prod_{i=1}^n [1 + p_i(e^t - 1)] \\ &\leq \exp\left(\sum_{i=1}^n p_i(e^t - 1)\right) = \exp(\mu(e^t - 1)). \end{aligned}$$

由此可得

$$\Pr[\bar{X} \geq (1+\epsilon)\mu] \leq \exp(-t(1+\epsilon)\mu + \mu(e^t - 1)).$$

对上式求最小值解得 $t_{\min} = \ln(1+\epsilon)$, 代入可得

$$\Pr[\bar{X} \geq (1+\epsilon)\mu] \leq \left(\frac{e^\epsilon}{(1+\epsilon)^{(1+\epsilon)}}\right)^\mu.$$

对第二个不等式, 只需证明当 $\epsilon \in (0, 1)$ 有

$$f(\epsilon) = \ln\left(\frac{e^\epsilon}{(1+\epsilon)^{(1+\epsilon)}}\right) + \frac{\epsilon^2}{3} = \epsilon - (1+\epsilon)\ln(1+\epsilon) + \frac{\epsilon^2}{3} \leq 0.$$

易知 $f(0) = 0$ 和 $f(1) < 0$. 当 $\epsilon \in (0, 1)$,

$$f'(\epsilon) = -\ln(1+\epsilon) + 2\epsilon/3, \quad f''(\epsilon) = -\frac{1}{1+\epsilon} + \frac{2}{3}.$$

于是得到 $f'(0) = 0$, $f'(1) = -0.0265 < 0$ 和 $f'(1/2) = -0.0721 < 0$, 由连续函数性质有 $f'(\epsilon) \leq 0$, 即函数 $f(\epsilon)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减. 当 $\epsilon \geq 0$ 时有 $f(\epsilon) \leq f(0) = 0$, 所以 $\exp(f(\epsilon)) \leq 1$. \square

下面的定理给出了 $\Pr[\sum_{i=1}^n X_i \geq (1-\epsilon)\mu]$ 的估计, 证明作为练习题留给大家完成.

定理6.6. 设随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n 相互独立且满足 $X_i \sim \text{Ber}(p_i)$, 令 $\mu = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n p_i$. 对任意 $\epsilon \in (0, 1)$ 有

$$\Pr\left[\sum_{i=1}^n X_i \geq (1-\epsilon)\mu\right] \leq \left(\frac{e^{-\epsilon}}{(1-\epsilon)^{(1-\epsilon)}}\right)^\mu \leq \exp(-\mu\epsilon^2/2).$$

定义6.2. 若随机变量 $X \in \{+1, -1\}$ 满足

$$\Pr(X = +1) = \Pr(X = -1) = 1/2,$$

则称 X 为 *Rademacher* 随机变量.

我们有如下定理:

定理6.7. 对 n 个独立的 *Rademacher* 随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n , 有

$$\Pr\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \geq \epsilon\right) \leq \exp(-n\epsilon^2/2) \quad \text{和} \quad \Pr\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \leq -\epsilon\right) \leq \exp(-n\epsilon^2/2).$$

Proof. 根据 Taylor 展开式有

$$\frac{1}{2} \exp(t) + \frac{1}{2} \exp(-t) = \sum_{i \geq 0} \frac{t^{2i}}{(2i)!} \leq \sum_{i \geq 0} \frac{(t^2/2)^i}{i!} = \exp(t^2/2).$$

若随机变量 $X \in \{+1, -1\}$ 且满足 $\Pr(X = 1) = \Pr(X = -1) = 1/2$, 则有

$$E[e^{tX}] = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} \leq \exp(t^2/2).$$

对任意 $t > 0$, 根据 Chernoff 方法有

$$\begin{aligned} \Pr\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \geq \epsilon\right) &\leq \exp(-nt\epsilon) E\left[\exp\left(\sum_{i=1}^n tX_i\right)\right] \\ &= \exp(-nt\epsilon) \prod_{i=1}^n E[\exp(tX_i)] \leq \exp(-nt\epsilon + nt^2/2). \end{aligned}$$

通过对上式右边求最小值得 $t = \epsilon$, 带入上式得到

$$\Pr\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \geq \epsilon\right) \leq \exp(-n\epsilon^2/2).$$

同理证明另一个不等式. □

推论6.4. 对独立同分布的随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n 满足 $P(X_1 = 0) = P(X_1 = 1) = 1/2$, 有

$$\Pr\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{2} \geq \epsilon\right) \leq \exp(-2n\epsilon^2) \quad \text{和} \quad \Pr\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{2} \leq -\epsilon\right) \leq \exp(-2n\epsilon^2).$$

6.3.2 有界随机变量的 Chernoff 不等式

本节研究有界的随机变量 $X_i \in [a, b]$ 的 Chernoff 不等式. 首先介绍著名的 Chernoff 引理.

引理6.4. 设随机变量 $X \in [0, 1]$ 的期望 $\mu = E[X]$. 对任意 $t > 0$ 有

$$E[e^{tX}] \leq \exp(t\mu + t^2/8).$$

Proof. 由凸函数的性质可知

$$e^{tX} = e^{tX+(1-X)0} \leq Xe^t + (1-X)e^0,$$

两边再同时取期望有

$$E(e^{tX}) \leq 1 - \mu + \mu e^t = \exp(\ln(1 - \mu + \mu e^t)).$$

令 $f(t) = \ln(1 - \mu + \mu e^t)$, 我们有 $f(0) = 0$ 以及

$$f'(t) = \frac{\mu e^t}{1 - \mu + \mu e^t} \Rightarrow f'(0) = \mu.$$

进一步有

$$f''(t) = \frac{\mu e^t}{1 - \mu + \mu e^t} - \frac{\mu^2 e^{2t}}{(1 - \mu + \mu e^t)^2} \leq 1/4.$$

根据泰勒中值定理有

$$f(t) = f(0) + tf'(0) + f''(\xi)t^2/2 \leq t\mu + t^2/8.$$

引理得证. □

由上面的 Chernoff 引理进一步推导出

推论6.5. 设随机变量 $X \in [a, b]$ 的期望 $\mu = E[x]$. 对任意 $t > 0$ 有

$$E(e^{tX}) \leq \exp(\mu t + t^2(b-a)^2/8).$$

根据上述推论, 我们得到有界随机变量的 Chernoff 不等式:

定理6.8. 假设 X_1, \dots, X_n 是 n 独立的随机变量且满足 $X_i \in [a, b]$. 对任意 $\epsilon > 0$ 有

$$\begin{aligned} \Pr \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \geq \epsilon \right] &\leq \exp(-2n\epsilon^2/(b-a)^2), \\ \Pr \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \leq -\epsilon \right] &\leq \exp(-2n\epsilon^2/(b-a)^2). \end{aligned}$$

Proof. 这里给出第一个不等式的证明, 第二个不等式证明作为习题. 对任意 $t > 0$, 根据 Chernoff 方法有

$$\begin{aligned} &\Pr \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \geq \epsilon \right] \\ &= \Pr \left[\sum_{i=1}^n t(X_i - E[X_i]) \geq nt\epsilon \right] \\ &\leq \exp(-nt\epsilon) E \left[\exp \left(\sum_{i=1}^n t(X_i - E[X_i]) \right) \right] \\ &= \exp(-nt\epsilon) \prod_{i=1}^n E [\exp(t(X_i - E[X_i]))]. \end{aligned}$$

根据 Chernoff 引理, 对任意 $X_i \in [a, b]$ 有

$$E [\exp(t(X_i - E[X_i]))] \leq \exp((b-a)^2 t^2/8).$$

由此得到

$$\Pr \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \geq \epsilon \right] \leq \exp(-nt\epsilon + nt^2(b-a)^2/8).$$

对上式右边取最小值求解 $t = 4\epsilon/(b-a)^2$, 然后带入上式可得:

$$\Pr \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \geq \epsilon \right] \leq \exp(-2n\epsilon^2/(b-a)^2).$$

从而完成证明. □